

الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر الدغارة مع مسح للطحالب الملتصقة بالطين /وسط العراق.

رائد كاظم عبد الأسدي فؤاد منحر علکم حيدر عبد الواحد الغانمي
قسم علوم الحياة /كلية التربية/جامعة القادسية.

Physico-Chemical Properties of Al-Daghara River with Survey of Epipellic Algae/Middle of Iraq.

Rai'd Kadhim Abed Alasady Fo'ad M. Alkam Haider Abdulwahid
Dept. of Biology / College of Education AlQadissiyah University

Abstract

The Physico-chemical properties and epipellic algae in Al-Daghara river were studied during the period from November 2007 to April 2008 .Three stations were selected , the water quality of the river was alkaline,very hard, oligohaline and well oxygenated . Carbon dioxide concentration were variable according to different sites. Among the of 117 species algal taxa were identified , the dominance was to Bacillariophyceae 74% followed by Chlorophyceae 14% then Cyanophyceae 12% . The highest algal total number of epipellic algae was in station (1) in March 2008 about 8.333×10^4 cell/cm². The lower algal number was in the same stationat in December 2.291×10^4 cell/cm² .The most dominant species were *Cocconies placentula* , *Fragilaria crotonensis* , *Nitzschia vermicularis* . *N. sigmoedia* .

الخلاصة

درست الخصائص الفيزيائية والكيميائية والطحالب الملتصقة بالطين في نهر الدغارة للفترة من تشرين الثاني ٢٠٠٧ لغاية نيسان ٢٠٠٨ باختيار ثلاثة مواقع للمياه ولعينات طحالب الطين. أظهرت النتائج ان مياه النهر كانت قاعدية وعسرة جداً وقليلة الملوحة وذات تهوية جيدة . في حين كانت تراكيز ثنائي اوكسيد الكربون المذاب متباينة بحسب الموقع . أما طحالب الطين

فقد تم تشخيص (١١٧) نوعاً كانت السيادة فيها للدايتومات بنسبة ٧٤% من العدد الكلي للطحالب ، جاءت بعدها الطحالب الخضر في عدد الانواع بنسبة ١٤% تلتها الطحالب الخضر المزرق بنسبة ١٢% . سجل اكبر عدد كلي من الطحالب الملتصقة بالطين في شهر اذار ٢٠٠٨ وبلغ $10^4 \times 8.333$ خلية /سم^٢ واقل عدد كان في نفس الموقع في شهر كانون الاول ٢٠٠٧ وبلغ $10^4 \times 2.291$ خلية /سم^٢ . سادت بعض الانواع في الدراسة الحالية مقارنة ببعض الطحالب الاخرى اذ وجدت بكثافة اعلى . وكانت جميعها من الدايتومات وهي

Cocconies placentula و *Fragilaria crotonensis* و *Nitzschia vermicularis* و *N. sigmoedia* .

المقدمة :

تعد الطحالب *Algae* من الكائنات ذات الأهمية الكبرى في النظم البيئية المائية وذلك لدورها في السلسلة الغذائية باعتبارها مصدراً غذائياً مهماً للهائمات الحيوانية والأسماك (١٢). وتشكل الطحالب الملتصقة *Benthic Algae* ومنها طحالب الطين (الملتصقة على الطين) *Epipellic Algae* حلقة أساسية ومهمة ضمن المنتجات الأولية إضافة إلى أنها غذاء مباشر وأساسي للعديد من الأحياء المائية (٢). وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات حول الطحالب الملتصقة بالطين على الصعيد العالمي والمحلي (١٨، ١٦، ٩، ٧). ألا أن صورة متكاملة عن الطحالب الملتصقة بالطين لم تتضح بشكل كامل في المسطحات المائية العراقية . يعد نهر الدغارة الذي يتفرع من نهر الحلة احد الفروع الرئيسية المهمة لنهر الفرات اذ يجري النهر من الشمال الى الجنوب من محافظة الديوانية مروراً بعدد من الاقضية والنواحي التي منها الدغارة وسومر وعفك لينتهي عند ناحية ال بدير جنوباً ويبلغ طوله حوالي ٧٠ كم ويتراوح عرضه بين ١٥ - ٢٠ متر (١) . هدفت الدراسة الحالية الى دراسة العوامل البيئية وتشخيص الطحالب الملتصقة بالطين في نهر الدغارة.

المواد وطرائق العمل:

جمعت نماذج المياه والطين شهرياً بدءاً من شهر تشرين الثاني ٢٠٠٧ لغاية شهر نيسان ٢٠٠٨ في قناني من البولي اثيلين بحجم ٥ لتار بعد غسلها وتعقيمها جيداً. حيث أخذت عينات الماء من عمق ٣٠ سم ومن وسط النهر ، أما عينات الطين فجمعت بقشط الطبقة السطحية من القاع الطيني للنهر وبعمر ٠.٥ - ١.٠ سم ونقلت إلى المختبر حيث غطيت بورق تنظيف العدسات من أجل جمع الطحالب الملتصقة بالطين كما في (10). حسبت خلايا الطحالب غير الدايتومية باستخدام شريحة *Haemocytometer* (٢٢). أما الدايتومات فحسبت بطريقة القطاع المستعرض (١٥). شخّصت بالأعتماد على عدد من المصادر (٢٣، ١١، ٤). أستخدم المحرار الزئبقي (٠.١) °م لقياس درجة الحرارة ، قيس دالة الحمضية (pH) بجهاز *pH meter* نوع *HANNA* بعد معايرته بالمحاليل القياسية ، وقيست التوصيلية الكهربائية للماء بجهاز قياس التوصيلية الكهربائية *E.C meter* نوع *Philips (DW9525)* ومنها تم حساب الملوحة بطريقة (٢٠). استخدمت طريقة *Golterman et.al* المحورة من قبل (١٥) لقياس غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب . أما الأوكسجين المذاب فتم قياسه بحسب طريقة تحويل الأزايد *Azide modification* لطريقة وينكلر *Winkler* (١٩). وقيست القاعدية الكلية طبقاً لما

The map illustrates the Diyala River basin, a significant water resource in northern Iraq. The river originates in the north, near the city of Tikrit, and flows southwards, eventually joining the Tigris River. Key features include:

- Major Tributaries:** The Tigris River, the Diyala River, and the Tammara River are prominent.
- Settlements:** Several towns and cities are marked, including Tikrit, Samarra, and the Diyala River basin.
- Geographical Features:** The map shows the river's course, its tributaries, and the surrounding landscape, including the Tigris River and the Diyala River basin.
- Scale and Orientation:** A scale bar indicates a distance of 100 km. An inset map of Iraq shows the location of the study area in the northern part of the country.

5

النتائج والمناقشة:

أظهرت النتائج المتعلقة بالخواص الفيزيائية والكيميائية وجود فروق معنوية بين المواقع الثلاثة في درجات حرارة الماء وذلك قد يعزى الى اختلاف وقت القياس جدول (١) في حين اشارت قيم الاس الهيدروجيني والقاعدية الكلية الى ان المياه تميل الى الجانب القاعدي إذ سجلت اقل قيمة ٧.٣ ملغم/لتر في الموقع الاول في شهر تشرين الثاني ٢٠٠٧ وسجلت أعلى قيمة للأس الهيدروجيني ٨.٥ ملغم/لتر في الموقعين الثاني والثالث للأشهر كانون الثاني وشباط واذار على التوالي جدول (١) . وهذا يتفق مع العديد من الدراسات في المياه العراقية التي تشير الى ان المياه العراقية تميل إلى الجانب القاعدي في طبيعتها (٢١ ، ٥ ، ٢) . ومن جانب اخر تراوحت قيم تركيز الأوكسجين المذاب من ٥.٥ - ١٢ و ٧.٢ - ١٣.٤ و ٨.٠٣ - ١١.٦ ملغم/لتر وبمعدلات لم تقل عن ٩.٠ ملغم/لتر ، وهي قيمة جيدة اذا ما قورنت بدراسات اخرى مماثلة (١) . وهذه المعدلات اعلى من القيمة الحرجة (٤.٠) ملغم/لتر وهذا يتفق مع ما ذكره (١٤) في كون المسطحات المائية العراقية تمتاز بوجود محتوى اوكسجيني كافٍ .

ومن الجدول (١) نلاحظ ان هناك تقارباً في قيم التوصيلية الكهربائية والملوحة في المواقع المدروسة اذ كانت بمعدلات ٨٨٧.٨ مايكروسمينز/سم والملوحة ٠.٥٦ ‰ للموقع الاول و ٩٠١ مايكروسمينز/سم ٠.٥٧ ‰ للموقع الثاني و ٩٨٢ مايكروسمينز/سم و ٠.٥٧ ‰ للموقع الثالث. وجاءت بنفس النمط قيم العسرة الكلية اذ بلغت معدلاتها ٣٨٤ و ٣٧٢ و ٣٦٢ ملغم/لتر للموقع الاول والثاني والثالث على التوالي وهذه القيم تدل على ان المياه عسرة جداً طبقاً لـ (٣). اما بالنسبة لقيم ايوني الكالسيوم والمغنسيوم فمن الملاحظ ان القيم كانت متقاربة في المواقع الثلاثة وبلغت معدلاتها بالنسبة للكالسيوم ٨٩.٦ و ٩٤ و ٩١.٥ ملغم/لتر للموقع الاول والثاني والثالث على التوالي وبلغت معدلات قيم تركيز ايون المغنسيوم ٣٨.٩ و ٣٣.٣ و ٣٢.٥ ملغم/لتر للموقع الاول والثاني والثالث على التوالي. واتضح وجود علاقة ارتباط موجبة بين الكالسيوم والتوصيلية الكهربائية وهذا قد يدل على ان الملوحة وزيادة التوصيلية الكهربائية متأتية من ايون الكالسيوم بالدرجة الاساس .

وكانت تراكيز غاز ثاني اوكسيد الكربون المذاب في الدراسة الحالية متباينة اذ بلغت المعدلات ٣.٨١ و ٣.٩٠ و ٣.٥٩ ملغم/لتر في المواقع الثلاثة الاول والثاني والثالث على التوالي وكانت اقل قيمة لغاز ثاني اوكسيد الكربون قد جمعت في الموقع الثالث في شهر تشرين الثاني ٢٠٠٧ وبلغت ١.٢٢ ملغم/لتر واعلى قيمة لغاز ثاني اوكسيد الكربون قد سجلت في الموقع الثاني في شهر نيسان ٢٠٠٨ وبلغت ٧.٠ ملغم/لتر ويلاحظ من النتائج ان اعلى قيم لثاني اوكسيد الكربون كانت في الموقع الثاني الذي يعود الى تحلل المواد العضوية التي تصرف الى النهر من مصادر مختلفة (١) .

وبشكل عام فانه لم تكن الفروق في الموصفات الكيميائية والفيزيائية لمياه المواقع الثلاثة لنهر الدغارة لافتة للنظر . اما فيما يتعلق بطحالب الطين فقد شخص ما مجموعه (١١٧) نوعاً (وحده تصنيفية) من الطحالب في المواقع الثلاثة خلال فترة الدراسة وكانت السيادة فيها للدائياتومات مكونة مانسبته (٧٤%) من العدد الكلي للطحالب وبلغ عدد الانواع (٨٧) نوعاً وكانت الغلبة الواضحة للدائياتومات الريشية Pennales بنسبة (٧٠.٩%) من العدد الكلي من الطحالب المشخصة. وجاءت الطحالب الخضر بالدرجة الثانية في عدد الانواع اذ شكلت

مانسبته (١٤ %) وبلغ عدد الانواع (١٦) نوعاً . وتلتها الطحالب الخضراء المزرقة بنسبة (١٢%) وبعدها من الانواع بلغ (١٤) نوعاً شكل (٢).

كما سجل اكبر عدد من الطحالب الملتصقة بالطين في شهر اذار ٢٠٠٨ وبلغ (١٠^٤ × ٢٠.٩٤٠) وبلغ (١٠^٤ × ١١.٥٣٨) خلية /سم^٢ و سجل اقل عدد كلي للطحالب في شهر كانون الثاني من نفس العام وبلغ (١٠^٤ × ١١.٥٣٨) خلية /سم^٢ وهذا يشير الى حصول الذروة الربيعية. كما سجل في العديد من الدراسات (٢٠١٨) . اما بالنسبة لاعداد الطحالب الملتصقة على الطين للمواقع المدروسة فقد لوحظ ان الموقع الاول سجل اعلى عدد كلي بالنسبة لوجود الطحالب في شهر اذار وبلغ (١٠^٤ × ٨.٣٣٣) خلية /سم^٢ و اقل عدد كلي من الطحالب الملتصقة بالطين في نفس الموقع في شهر كانون الاول ٢٠٠٧ وبلغ العدد الكلي (١٠^٤ × ٢.٢٩١) خلية /سم^٢ جدول (٣).

جاءت النتائج الحالية القائلة بسيادة الدايتومات على المجاميع الطحلبية الاخرى متوافقا مع اغلب الدراسات المحلية في جنوب ووسط العراق كما ذكر في (٢) كذلك لوحظت سيادة الدايتومات في طحالب الطين في اماكن مختلفة من العالم (٨ و ١٣). وهذا الامر قد يعزى الى احتواء المياه المحلية على تراكيز عالية من السليكا تفوق احتياج الدايتومات بكثير اضافة الى تحمل الدايتومات مدى واسعا من الظروف البيئية (١٧). ان الاختلاف في محتوى وكثافة الانواع المسجلة بين المواقع قد يعود الى اختلاف الظروف البيئية (٦). لوحظ في الدراسة الحالية سيادة بعض الانواع من الدايتومات اقرانها الاخرى من الطحالب فقد وجدت بكثافة اعلى من بقية الانواع وبلغت اعلى كثافة للدايتومات التالية *Cocconies placentula* و *Fragilaria crotonensis* و *Nitzchia vermicularis* و *N. sigmoedia* جدول (٢) .

ولوحظ ايضا تسجيل العديد من الطحالب مثل *Cyclotella* spp. و *Coscinodiscus* spp. و *Scendesmus* spp. وهي طحالب هائمة بالاصل وقد سجلت هذه الملاحظة من قبل باحثين اخرين (٢). وقد يعود الامر الى طريقة اخذ العينة حيث يمكن ان تلتصق هذه الطحالب بالطين اثناء مرور عينة الطين بعمود الماء. يتضح من النتائج وجود تغيرات واضحة في عدد الانواع والكثافة لطحالب الطين في المواقع المدروسة في نهر الدغارة .

جدول (١) الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواقع الثلاث على نهر الدغارة خلال فترة الدراسة .

الخصائص الأشهر	الموقع الأول						الموقع الثاني						الموقع الثالث					
	٢٠٠٨			٢٠٠٧			٢٠٠٨			٢٠٠٧			٢٠٠٨			٢٠٠٧		
	نيسان	أيار	شباط	كانون الثاني	كانون الأول	تشرين الثاني	نيسان	أيار	شباط	كانون الثاني	كانون الأول	تشرين الثاني	نيسان	أيار	شباط	كانون الثاني	كانون الأول	تشرين الثاني
المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)	المدى (المعدل)
درجة حرارة الهواء °م	٤٣-١٣ ٢٢,٦	٤٣	٢٧	١٣	١٥	١٨	٢٠	١٨	١٥	١٤	١٩	٢١	٢٤	٢٥	٤٤	٢٤,٥	٢١	٢٤,٥
درجة حرارة الماء °م	٢٣-٩,٥ ١٥,٥	٢٣	١٦,٦	١٠,٣	٩,٥	١٢	١٩,٥	١٣,٧	١٣	١٣	٢٠	٢٦	٢٠	١٣	١٣	١١,٥	١٠,٣	٢٠
الأس الهيدروجيني pH	٨,٤-٧,٣ ٨,٠١	٨,٠	٧,٩	٨,٤	٨,٣٥	٨,١٤	٧,٤	٨,٤٢	٨,٥	٨,٥	٨,١	٨,٣	٨,٥	٨,٥	٨,٥	٨,٥	٨,٥	٨,٥
الأوكسجين المنحل في الماء ملغم/لتر	١٢-٥,٥ ٩,٠	٥,٥	٨,٦	٩,٢	١٢	٩,٠	٩,٥	١٠,٤	١٣,٤	٨,٣	٧,٢	٧,٧	٩,٢	١٣,٤-٧,٢ ٩,٢	٨,١	٨,٩	١١,٦	٨,٠٣
التوصيلية الكهربائية لملغم/لتر	٩٤٠-٨١٥ ٨٧٧,٨	٩٤٠	٩٣٠	٨٢٥	٨٤٠	٨١٥	٩١٧	٩٨٧	٨٦٠	٨٩٠	٨٥٨	٩٩٩	٨٣٣	٩٩٩-٨٣٣ ٩٠١	٩٧٦	٨٨٧	٨٥٠	٨٤٥
المنطقة %	٠,٦٢-٠,٥٢ ٠,٥٧	٠,٦	٠,٥٩	٠,٥٢	٠,٥٣	٠,٥٢	٠,٥٨	٠,٦١	٠,٥٥	٠,٥٦	٠,٥٤	٠,٦٣	٠,٥٣	٠,٦٤-٠,٥٣ ٠,٥٧	٠,٦٢	٠,٥٧	٠,٥٤	٠,٥٤
نفاذية الأكسجين لكاربون منفصل/لتر	٦,٥-١,٣ ٣,٨١	٦,٥	٦,٢	٦,٠	١,٤١	١,٣٦	١,٤	١,٤	١,٤٥	٥,٨	٦,٤	٧,٠	١,٢٢	٧,٠-١,٤ ٣,٩٠	١,٢٢	١,٤٦	١,٤٨	٥,٥
القاعدة الكلية لملغم/لتر	٢٥-١١٩ ١٧١,٨	١٣٣	٢٥٠	١٩٣	١١٩	١٣٥	١٦١	١٢٥	١٢٢	١٣٦	١٣٨	١٣٢	١٣٢	١٦١-١٢٢ ١٣٥,٦	١٤٦	١٢٦	١٣٣	١٢٧
الصلابة الكلية لملغم/لتر	٤٩٦-٢٨٨ ٣٨٤	٢٨٨	٣٥٢	٣٥٢	٣٦٨	٤٩٦	٤٤٨	٤٦٨	٤٤٠	٣٥٦	٣٤٤	٣٠٠	٣٧٢	٤٦٨-٣٠٠ ٣٧٢	٤٦٤	٤٣٢	٣٦٠	٣٠٨
الكالسيوم لملغم/لتر	١٠٧,٤-٧٢,١ ٨٩,٦	٧٢,١	٨٩,٧	٨٤,٥	٩١,٣	١٠٧,٤	٩٢,٩	٨٨,١	٩٤,٥	٨٦,٥	٩١,٧	٧٨,٥	٩٤	١١٨,٦-٧٨,٥ ٩٤	٩٦,١	٨١,٧	٨٣,٢	٧٤,٧
المغنيسيوم لملغم/لتر	٥٥,٤-٢٦,١ ٣٨,٩	٢٦,١	٣٢,١	٣٣,٩	٣٣,٩	٥٥,٤	٥٢,٤	٦٠,٣	٣٥,٠	٢٩,١	٢٦,١	٢٤,٢	٢٥,٢	٦٠,٣-٢٤,٢ ٣٣,٣	٥٤,٤	٣٠,١	٣٧,٨	٢٤,٢

جدول (٢) الطحالب المشخصة لعينات الطين في المواقع الثلاث على نهر الدغارة خلال فترة الدراسة.


أشهر الدراسة والمدة الخصائص الشخصية	2007						2008											
	تشرين الثاني			كانون الأول			كانون الثاني			شباط			آذار			نيسان		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Cyanophyta																		
<i>Chroococcus dispersus</i>															+			+
<i>C. minor</i>															+			+
<i>C. turgidus</i>	+																	
<i>Gloeocapsa aeuropinosa</i>										+	+							+
<i>Gomphosphaeria aponina</i>						+												
<i>Lyngbya limnetica</i>										+				+			+	
<i>Merismopedia glauca</i>																	+	+
<i>Microcystis aeruginosa</i>										+					+	+		+
<i>Nostoc</i> spp.															+			+
<i>Oscillatoria formosa</i>	+	+	+		+	+	+		+		+			+			+	
<i>O. tenuis</i>														+			+	+
<i>Phormidium</i> spp.					+	+	+	+	+						+	+		+
<i>Spirulina minor</i>						+						+						
<i>S. laxa</i>						+									+			+
Chlorophyta																		
<i>Ankistrodesmus</i> spp.					+	+	+							+			+	
<i>Chlamydomonas</i> spp.					+	+								+			+	
<i>Chlorella vulgaris</i>		+			+		+	+	+			+			+			+
<i>Cladophora glomerata</i>					+									+				
<i>Closterium</i> spp.	+	+	+			+												
<i>Coelastrum reticulatum</i>								+	+	+			+			+	+	
<i>Odeogonium</i> spp.								+							+			+
<i>Pediastrum boryanum</i>					+		+	+	+			+		+	+			+
<i>P. duplex</i>				+	+									+			+	
<i>P. simplex</i>	+	+									+		+	+	+	+	+	+
<i>Scenedesmus acuminatum</i>					+								+					
<i>Spirogyra</i> spp.							+					+			+			
<i>Tetradron minimum</i>						+	+	+			+			+	+			
<i>Trachisia reticularis</i>		+					+				+		+					+
<i>Ulothrix</i> spp.	+			+		+		+		+			+			+	+	
<i>Zygnema</i> spp.				+										+				
Bacillariophyceae																		
Centrales																		
<i>Aulacosiera granulata</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	+	+	+	+	+		+	+	+		+							
<i>C. Kutzingiana</i>										+								
<i>Coscinodiscus</i> spp.											+							
Pennales																		
<i>Achnanthes</i> spp.	+	+	+		+													
<i>A. affinis</i>	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+							
<i>A. delicatula</i>			+															

<i>A. flexella</i>						+													
<i>A. Hungarica</i>					+														
<i>Amphora pediculus</i>								+	+										
<i>A. veneta</i>						+	+												
<i>Amphirora</i> spp.							+												
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i>								+			+								
<i>Asterionella Formosa</i>								+											
<i>Caloneis permagna</i>						+				+									
<i>Campylodiscus noricus</i>											+								
<i>Cocconeis pediculus</i>			+	+	+	+	+	+	+	+	+								
<i>C. placentula</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
<i>Cymatopleura solea</i>		+	+	+	+	+		+	+	+									
<i>Cymbella affinis</i>												+							
<i>C. cistula</i>									+		+								
<i>C. cymbiformis</i>								+	+	+									
<i>C. helevetica</i>	+		+					+		+									
<i>C. perpallida</i>	+			+			+	+	+	+									
<i>Diatoma elongatum</i>								+		+	+								
<i>D. hemall</i>		+		+				+	+	+					+				
<i>D. vulgare</i>											+				+				
<i>Denticula tenuis</i>															+			+	
<i>Epithemia zebra</i>												+	+			+	+	+	+
<i>E. turgida</i>																+	+		
<i>Eunotia pectinalis</i>											+	+	+						
<i>E. tenella</i>							+	+				+							+
<i>Fragilaria</i> spp.				+															
<i>F. capucina</i>											+	+		+	+	+	+	+	+
<i>F. crotonensis</i>								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>F. virescens</i>	+					+	+	+		+									
<i>Frustulia rhomboides</i>					+														
<i>Gomphonema angustatum</i>		+	+	+	+			+	+	+								+	
<i>G. constrictum</i>					+	+	+	+	+			+		+		+	+	+	+
<i>G. gracile</i>				+															
<i>G. intricatum</i>									+			+							
<i>G. lanceolatum</i>								+											
<i>G. tergestinum</i>	+			+															
<i>G. subtile</i>						+													
<i>Gomphoneis olivaceae</i>				+		+												+	+
<i>Gyrosigma</i> spp.					+	+													
<i>G. acuminatum</i>	+	+	+	+	+	+													+
<i>G. macrum</i>					+														
<i>G. spencerii</i>	+			+									+						
<i>Mastogloia smithii</i>									+			+							
<i>Navicula</i> spp.												+							+
<i>N. cuspidata</i>																		+	
<i>N. excelsa</i>						+													
<i>N. gregaria</i>						+												+	
<i>N. halophila</i>			+																

<i>N. lanceolata</i>																			+
<i>N. saxophila</i>					+														
<i>Nitzschia acicularis</i>										+		+							
<i>N. clausii</i>	+			+		+	+						+						
<i>N. dissipata</i>	+																	+	
<i>N. dubia</i>					+					+		+					+		+
<i>N. gracilis</i>			+	+															+
<i>N. hungarica</i>			+		+	+	+	+	+								+		
<i>N. hantzschiana</i>							+	+											
<i>N. intermedia</i>							+	+	+							+		+	
<i>N. linearis</i>			+	+	+	+	+		+										+
<i>N. longissima</i>			+													+			
<i>N. obtusa</i>	+	+			+	+		+					+						
<i>N. palea</i>		+	+	+	+		+	+	+										
<i>N. rostellata</i>					+											+			
<i>N. sigma</i>			+	+															
<i>N. sigmoedia</i>			+	+			+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	
<i>N. stagnarium</i>					+														
<i>N. tryblionella</i>	+	+						+		+									
<i>N. umbonata</i>		+		+	+														
<i>N. vermicularis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	
<i>Pinnularia appendiculata</i>															+		+		
<i>P. brebissonii</i>					+														
<i>Rhoicosphenia curvata</i>					+	+			+						+		+	+	
<i>Stauroneis parvula</i>		+			+		+			+									
<i>Surirella</i> spp.					+														
<i>S. ovata</i>	+	+	+	+	+	+	+												
<i>S. ovalis</i>					+														
<i>S. tenera</i>	+																		
<i>Syndra</i> spp.			+	+															
<i>S. acus</i>	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>S. ulna</i>						+	+			+			+				+		

جدول (٣) الاعداد الكلية للطحالب الملتصقة على الطين حسب المواقع طيلة فترة الدراسة .
 10^4 خلية /سم^٢

الموقع الاشهر	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Total
الموقع الاول	٥١٢٨.٢٠٥	٢٢٩١.٤٥٢	٥١٢٨.٢٠٥	٣٦٣٢.٤٧٨	٨٣٣٣.٣٣٣	٥١٢٨.٢٠٥	٣٠٣٤١.٨٧٩
الموقع الثاني	٤٢٧٣.٥٠٤	٤٩١٤.٥٢٩	٣٢٠٥.١٢٨	٥٣٤١.٨٨٠	٦٤١٠.٢٥٦	٤٢٧٣.٥٠٤	٢٨٤١٨.٨٠٢
الموقع الثالث	٥١٢٨.٢٠٥	٤٧٠٠.٨٥٤	٣٢٠٥.١٢٨	٥٥٥٥.٥٥٥	٦١٤٦.٥٨١	٥١٢٨.٢٠٥	٨٥٤٧.٠٠٨
Total	١٤٥٢٩.٩١٤	١٢٦٠٦.٨٣٧	١١٥٣٨.٤٦١	١٤٥٢٩.٩١٤	٢٠٩٤٠.١٧٠	١٤٥٢٩.٩١٤	



المصادر:

١. الناشيء، علي عبد الرحيم (٢٠٠٢). " الاثرء الغذائي في نهر الدغارة وانعكاساته على صلاحية استخدامات المياه في مدينة عفك، مجلة القادسية، ٧ (١): ٥٢ – ٥٨.
٢. **علكم** ، فؤاد منحرو قاسم ، ثائر ابراهيم و الجشعمي ،خلود جميل (٢٠٠٣). دراسة بيئية لطحالب الطين في نهر الديوانية، العراق . مجلة القادسية. ٣ (١) : ١٤ – ٢٨ ص .
3. **APHA**, American Public Health Association (1999) Standard methods of Water and Waste water examination .20th –ed. APHA. Inc Washington , D.C.
4. **Al-Handal**,A.Y. (1994). Contribution to the knowledge of diatoms of Sawa lake .Iraq. Novalledvigia.59:225-254.
5. **Al-Lami**,A.A.;Al-Saadi,H.A.;Kassim,T.I.and Muften,F.S.(1999). seasonal changes of epipellic algal communities in north part of Euphrates River. Iraq. J. Coll. Educ.for Women Univ.Baghdad . 10(2) : 236-247.
6. **Al-Saadi**,H.A.;Hadi,R.A.Al-Lami,A.A.(1989).Alimnological studies on some marshes area in southern Iraq . Limnologica 20(2).
7. **Anbar**,R.M.S.(1984). Studies on the algae of polluted River Kelvin. Ph.D.Thesis.Univ.glasgow.Uk.322pp.
8. **Antoine**,S.E.K.benson-Evans.(1986).The epipellic algal flora of the River Wye systems.Wales Uk.2 algal phyta and species population . Int.Rev. Ges. Hydrobiol. ,71,813-839.
9. **Aykulu**.G.(1982).The epipellic algal flora of the River Avon.Br.Phycol.17,27-38.
10. **Eaton**,J.W.Moss.B.(1966).The estimation of numbers and pigments contents in epipellic algal population Limno. Oceanogr. 4.584-595.
11. **Germain** , H. (1981) . Flora des Diatmees . Dratomphycees eoudonceset Saumatresdu . Masif Amoricioetdes contrees Votsinesde Eurpeocci dental Societe.Nonvelledes Editition Roubee- Paris .
12. **Graham** , L and Wilcox , C.W. (2000) . Algae Prentice Hall (UK).
13. **Greundling**,G.K.(1971).Ecology of the epipellic algae communities in Marin lake ,British. Colombia.J.Phycol.7:239-249.
14. **Hassan**,F.M.(1997).A limnological study on Hilla River. Al-Mustansiriy J. Sci. Vol. 8- N.-1.
15. **Hadi**,R.A.M.(1981). Algal studies at the river USK.ph.D. Thesis, Univ. collage Cardift U.K .364pp.
16. **Hadi**,R.A.and AL-Saboonchi,A.(1989). seasonal varation of phytoplankton , epiphytic and epipellic algae in Shatt Al- Arab river at Basrah. Iraq . mar . mesopotamica , 4.211- 232.

17. **Kssaim**,T.I. and .AL- lami , A.A. (2002). The eipellic algal flora of the River Tigris , Iraq. 1st National Sci.EnvIRON .pollut .and Means protect . Baghdad . Nov.5- 6 :133-141.
18. **Kassim**,T.I.and Al-Saadi, H.A.(1994). On the seasonal variation of the eipellic algae in marshes areas(Southern Iraq). Acta.Hydrobiol, 36(2).191-200.
19. **Lind**,O.T.(1979). Handbook of common methods in limnology C.V. Mosby,Co.St. Louis, 199pp.
20. **Mackereth** , J. H. ;Heron , J.and talling ,J. F.(1978). Water analysis. Some revised methods limnologists , Sci. Pub. Fresh water Biol. Ass.(England). 36:1 – 120 .
21. **Mauloud** ,B.K, Al-Saadi, H.A.and Hadi, R.A.M.(1993).A Limnological studies on Tigris , Euphrates and Shatt al – Arab,rivers,Iraq. Mutah J.Res.& stud . 8(3): 53-67.
22. **Martinez** , M.R.; Chakross , R. and Pandpanastico , J.P. (1975) Notes on phytoplankton Technique Using Haemocytometer.Ph:I: Agric. 59: 1-12.
23. **Prescott**, G.W. (1973). Algae of the western Great Lakes Area.William,C., Brow, Co. Publishers, Dubuque, Iowa., 977 pp.
24. **Wine** , R. L.(1979). Beginning Statistics Winthrop Publ. INC. Cobbridge, Masschustts.432pp.

(٢٠٠٩/٤/٢١)(تاريخ استلام البحث)
 (٢٠٠٩/١١/١١)(تاريخ قبول نشر البحث)