

استخدام ادلة التلوث المايكروبي لتقييم التلوث الناتج عن طرح مياه الصرف الصحي الى نهر الديوانية / العراق

ميسون مهدي الطائي
كلية العلوم/جامعة بابل

محمد كاظم القصير
كلية العلوم/جامعة القادسية

الخلاصة :

يؤدي تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة بشكل تام الى طرح العديد من الملوثات في المياه المستقبلية وخصوصاً الاحياء الدقيقة الممرضة التي تسبب العديد من الامراض للاحياء المائية والاشخاص المستخدمين لهذه المياه، لذا اجريت الدراسة الحالية لتحديد التلوث المايكروبي الناتج عن طرح مياه الصرف الصحي الى نهر الديوانية عن طريق قياس العدد الكلي للبكتريا TBC والعدد الاكثر احتمالاً لبكتريا القولون الكلية TC والقولون البرازية FC والمسبقيات البرازية FS.

جمعت العينات شهرياً لمدة سنة كاملة من اربعة محطات على النهر، الاولى تقع الى الشمال من موقع طرح فضلات الصرف الصحي واستخدمت لاغراض المقارنة وثلاثة محطات تقع جنوب موقع الطرح.

بينت النتائج ارتفاع اعداد جميع انواع البكتريا في المحطة الثانية والثالثة والرابعة نتيجة لطرح مياه الفضلات الى النهر مقارنة بالمحطة الاولى اذ تراوحت اعدادها بين $10^2 \times 17.33$ - $10^4 \times 310$ خلية/مل و $(10^2 \times 403.3 - 4.2)$ و $(10^2 \times 273.3 - 3)$ و $(10^2 \times 1100 - 29)$ خلية/100 مل لكل من بكتريا TBC و TC و FC و FS على التوالي.

كما بينت النتائج ان اعداد البكتريا الدالة على التلوث قد تجاوزت الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية للمياه المستخدمة لاغراض الشرب بل انها تجاوزت الحدود الموصى بها للمياه المستخدمة لاغراض السباحة والترفيه.

المقدمة:

من اهم الاخطار الصحية الشائعة والواسعة الانتشار تلك التي ترتبط بتلوث مياه الشرب ومصادرها بشكل مباشر او غير مباشر بمطروحات الانسان والحيوان وخصوصاً المواد البرازية faeces والتي تحمل احياء مجهرية ممرضة تكون مسؤولة عن العديد من الامراض المعدية [22]. وان طرح فضلات الانسان يعد المصدر الرئيس الذي عن طريقة تدخل المايكروبات الممرضة مثل البكتريا المرضية والطفيليات المعدية والمايكروبات الاخرى الى الماء [4] [18].

يعد الماء وسطاً ناقلاً للأحياء المجهرية الممرضة مثل *Salmonella typhi* و *Shigella* spp. والعديد من انواع الفايروسات والطفيليات التي تسبب العديد من الامراض للانسان مثل الهیضة والحمى والتهاب الكبد الفايروسي وشلل الاطفال اضافة الى الملاريا والبلهارزيا [7] [16]. اذ ان 80 % من الامراض المنتشرة في العالم تعزى الى طرح مياه الصرف الصحي غير الكاملة المعالجة والمياه الملوثة [9]. اذ تسبب المياه الملوثة بوفاة 25 الف شخص يومياً في العالم [2].

ان تقييم نوعية المياه باستخدام الادلة المايكروبية يعد ذا اهمية كبيرة وهو موضوع العديد من الدراسات التي حاولت تحديد الدليل الأكثر وثاقه الذي يشير الى وجود المسببات المرضية وتحديد مستوياتها التي ستضمن نوعية مياه مقبولة [19].

وادلة التلوث البرازي هي احياء مجهرية يدل وجودها على ان المياه ملوثة ببراز الانسان او الحيوانات ذات الدم الحار ولذلك ربما تكون حاوية على العديد من المسببات المرضية [20]. وهناك العديد من الخصائص التي يتصف بها الدليل البكتيري للتلوث البرازي منها: (1) ان يكون احد الافراد التي تتواجد طبيعياً في امعاء الحيوانات ذات الدم الحار (2) غير ممرض (3) يوجد عند تواجد المسببات المرضية ويختفي عند اختفائها (4) يوجد باعداد اكبر من عدد المسببات المرضية (5) غير قادر على التضاعف في البيئة (6) مقاوم على حد سواء على الاقل كالمسبب المرضي للعوامل البيئية والمطهرات في محطات معالجة المياه ومياه الفضلات (7) قابل للكشف بواسطة الوسائل السريعة والسهلة والرخيصة [15].

ويستخدم العدد الكلي لبكتريا القولون (TC) Total Coliforms والقولون البرازية Feacal coliforms (FC) كدليل على التلوث البرازي لان بكتريا القولون معترف بها دولياً في تقييم النوعية المايكروبية للمياه كما ان قياس بكتريا القولون البرازية FC ثبت انه المؤشر الأكثر وثوقاً للتلوث البرازي للماء [14]. كما تستخدم بكتريا المسببات البرازية (FS) Feacal streptococci كدليل على التلوث البرازي بسبب امكانية هذه المجموعة على البقاء في البيئة المائية أكثر من FC و TC لذا فهي تعطي اشارة الى ان التلوث البرازي ربما يكون بعيداً زمانياً او مكانياً [6]. وعليه تستخدم هذه المجموع الثلاث من البكتريا (FS, FC, TC) في الولايات المتحدة وبقية بلدان العالم في الادارة والسيطرة على نوعية وسلامة المياه المستخدمة للاغراض المختلفة [12] [10]. كما انها مهمة لتحديد نوعية المياه الخام ليس فقط من ناحية تقييم درجة التلوث لكن ايضاً لتحديد افضل موقع لمصادر المياه المستخدمة واختيار افضل شكل للمعالجة [22].

طرائق العمل:


تقع منطقة الدراسة الى الجنوب من مدينة الديوانية حيث تقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي القادمة من المدينة والتي تصرف مياه الفضلات مباشرة الى النهر.

جمعت عينات المياه لمدة 12 شهراً ابتداءً من كانون الاول 2010 لغاية تشرين الثاني 2011 باستخدام قناني زجاجية معقمة من اربع محطات، اذ تقع المحطة الاولى (S.1) الى الشمال من نقطة تصريف مياه الصرف الصحي الى النهر بحوالي 1 كم وتقع المحطة الثانية (S.2) بعد نقطة التصريف اما المحطة الثالثة (S.3) والمحطة الرابعة (S.4) فتقع الى الجنوب من نقطة التصريف بحوالي 1 و 2 كم على التوالي شكل (1).

اعتمدت الطرق الموضحة من قبل وكالة الصحة العامة الامريكية [11]. لتقدير العدد الكلي للبكتريا TBC باستخدام طريقة صب الاطباق pour plate والعدد الأكثر احتمالاً Most probable

number (MPN) لبيكتريا القولون الكلية (TC) والقولون البرازية (FC) والمسبقيات البرازية (FS) باستخدام تقنية الانابيب المتعددة Multiple-tube technique .

كما تم قياس درجة حرارة الماء والعكورة والاس الهيدروجيني pH والمتطلب البايوكيميائي للاوكسجين BOD₅ باستخدام تحويل الازايد Azide modification لطريقة ونكلر^[11].



شكل (1) منطقة الدراسة

النتائج والمناقشة:

ان طرح مياه الصرف الصحي الى النهر يؤدي بشكل عام الى زيادة في اعداد البكتيريا [11]. اذ تحتوي المياه الملوثة بفضلات الصرف الصحي عوامل مرضية كالبكتيريا والفايروسات والطفيليات المعوية والتي تنتقل مباشرة الى المستهلكين اثناء شرب الماء مما يؤدي الى حدوث العديد من الامراض [8]. كما ان السباحة في مثل هذه المياه تؤدي الى الاصابة بالعديد من الامراض المعوية وغير المعوية [17].

بينت نتائج الدراسة ان الاعداد الكلية للبكتيريا TBC قد تراوحت بين $10^2 \times 17.33$ - $10^4 \times 310$ خلية/مل جدول (1) وقد سجلت اقل القيم في المحطة 1 واقلها كانت في تشرين الاول اذ بلغت $10^2 \times 17.33$ خلية/مل شكل (2) في حين سجلت اعلى القيم في المحطة 2 خلال آذار اذ بلغت $10^4 \times 310$ خلية/مل شكل (2) ويعزى ذلك الى طرح مياه الصرف الصحي الحاوية على اعداد كبيرة من البكتيريا الى النهر والتي تكون غنية بالمواد العضوية التي توفر بيئة ملائمة لنمو وتكاثر البكتيريا [5]. وهذا ما يؤكد وجود علاقة ارتباط طردية ($r = 0.807$) مع قيم الـ BOD_5 والتي سجلت ارتفاعاً في المحطة 2 اذ تراوحت قيمها بين (16.1 - 68.6) ملغم/لتر جدول (2) بسبب طرح فضلات الصرف الصحي الى النهر.

كما بينت نتائج الدراسة ان الاعداد الكلية لبكتيريا القولون TC قد ارتفعت في المحطة 2 اذ تراوحت بين $10^2 \times 26.3$ - $10^2 \times 403.3$ خلية/مل جدول (1) مقارنةً بالمحطة 1 التي تراوحت فيها الاعداد الكلية لبكتيريا القولون TC بين (4.2 - 41.3) خلية/مل جدول (1). اذ سجلت اعلى قيمة لها $10^2 \times 403.3$ خلية/مل خلال تموز في المحطة 2 شكل (3) واقل قيمة (4.2) خلية/مل خلال تشرين الاول في المحطة 1 شكل (3) ولعل ذلك يعود الى ان الارتفاع في درجة الحرارة مع توفر المواد الغذائية يؤدي الى تكاثر البكتيريا وزيادة اعدادها [21]. وهذا ما يؤكد وجود علاقة ارتباط طردية مع كل من درجة الحرارة والـ BOD_5 جدول (2).

وبينت النتائج ان بكتيريا القولون البرازية FC سجلت اعلى القيم $10^2 \times 273.3$ خلية/100 مل في المحطة 2 خلال تموز شكل (4) واقلها (3) خلية/100 مل في المحطة (1) خلال تشرين الثاني شكل (4). وان وجود هذه البكتيريا في المياه يدل على احتمالية وجود احياء مجهرية تسبب امراض خطيرة للانسان [13].

كما بينت نتائج الدراسة ان اعداد بكتيريا المسببات البرازية FS تراوحت بين (29 - $10^2 \times 1100$) خلية/100 مل خلال مدة الدراسة جدول (1) وقد سجلت اعلى القيم $10^2 \times 1100$ خلية/100 مل في المحطة 2 خلال آذار وتموز وايلول وفي المحطة 3 خلال تموز شكل (5). واطهرت النتائج ارتفاع اعداد بكتيريا المسببات البرازية FS مقارنة ببكتيريا القولون TC والقولون البرازية FC ولعل ذلك يعود الى كونها اكثر مقاومة للظروف البيئية [22].

الاستنتاجات:

ان طرح مياه الصرف الصحي الى النهر ادى الى ارتفاع في اعداد البكتيريا الدالة على التلوث في مياه المحطات الواقعة جنوب نقطة التصريف وكانت المحطة 2 قد سجلت اعلى القيم فيما يخص البكتيريا الدالة على التلوث مقارنة بمحطة المقارنة (محطة 1) والذي يؤكد احتمالية وجود العديد من الاحياء الممرضة التي تسبب امراض مختلفة لمستخدمي هذه المياه.

وهذا ناتج عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي من الناحية المايكروبية قبل طرحها الى النهر.


اذ جاءت اعداد البكتيريا الدالة على التلوث خارج الحدود المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية للمياه المستخدمة لاغراض الشرب [22]. بل انها تجاوزت الحدود الموصى بها للمياه المستخدمة لاغراض السباحة والترفيه [23] [24].

كما ان طرح مياه الفضلات غير تامة المعالجة الى النهر ادى الى ارتفاع في قيم المتطلب البايوكيميائي للاوكسجين BOD_5 .


المصادر:

1. الناشي، علي عبد الرحيم (2002). الاثرء الغذائي في نهر الدغارة وانعكاساته على صلاحية استخدامات المياه في مدينة عفك. مجلة القادسية. 7(1): 52-63.
2. السعدي، حسين علي (2006). اساسيات علم البيئة والتلوث. دار اليازوري. عمان-الاردن.
3. صبري، انمار وهي؛ يونس، محمد حسن وسلطان، حسن هندي (2001). التلوث البكتيري في نهر الفرات. مجلة ابحاث البيئة والتنمية المستدامة. 4(1): 30-42.
4. عباوي، سعاد عبد وحسن، محمد سليمان (1990). الهندسة العملية للبيئة. فحوصات الماء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل.
5. العزاوي، اثير سايب ناجي (2008). دراسة بعض العوامل البيئية الملوثة لمياه نهر شط الحلة في محافظة بابل/ العراق. مجلة القادسية. 13(3): 1-9.
6. منظمة الصحة العالمية (1997). دليل تشغيل برنامج جيمس/ للمياه. المكتب الاقليمي لشرق المتوسط/ المركز الاقليمي لأنشطة صحة البيئة.
7. سرحان، عبد الرضا طه (2002). شحة الموارد المائية وانعكاساتها على نوعية المياه وتلوثها. مجلة القادسية. 7(4): 133-148.
8. نظام، عدنان علي وحمد، ابتسام (2001). المؤشرات الفيزيائية – الكيمائية والجرثومية الصحية لمياه نهر بردى. مجلة ابحاث البيئة والتنمية المستدامة. 4(1): 18-29.
9. **Abera, S.; Zeyinudin, A.; Kebede, B.; Deribew, A.; Ali, S. and Zemene, E. (2011).** Bacteriological analysis of drinking water sources. African J. of microbiology research, 5(18): 2638-2641.
10. **Anderson, K. L.; Whitlock, J. E. and Harwood, V. J. (2005).** Persistence and differential survival of fecal indicator bacteria in subtropical waters and sediments. Applied and environ. microbiology, 71(6): 3041-3048.
11. **APHA, American Public Health Association (2003).** Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th ed. Washington DC, USA.
12. **Barrell, R. A.; Hunter, P. R. and Nichols, G. (2000).** Microbiological standards for water and their relationship to health risk. Communicable disease and public health, 3 (1): 8-13.
13. **Brown, A. E.(2005).** Microbiological application. 9th ed. McGraw Hill, New York.
14. **Fernandez- Alvarez, R. M.; Carballo-Cuervo, S.; Rosa-Jorge, M. C. and Lecea, J. R. (1991).** The influence of agricultural run-off on bacterial populations in a river. J. of applied bacteriology, 70: 437-442.
15. **Goodwin, K. D.; Matragrano, L.; Wanless, D.; Sinigalliano, C. D. and LaGier, M. J. (2009).** A preliminary investigation of fecal indicator bacteria, human pathogens, and source tracking markers in beach water and sand. Environ. research J., 2(4): 395-417.
16. **Ibekwe, A. M. and Lyon, S. R. (2008).** Microbiological evaluation of fecal bacterial composition from surface water through aquifer sand material. J. of water and health. 6 (3): 411- 421.
17. **Marino, F. J.; Morinigo, M. A.; Manzanares, E. M. and Borrego, J. J. (1995).**Microbiological- epidemiological study of selected marinebeaches in Malaga (Spain). Water Science technology, 31(5):5-9.
18. **Mrello, J. A.; Mizer, H. E. and Granato, P. A.(2006).** Laboratory manual and workbook in microbiology. 8th ed. McGraw Hill, New York.
19. **Owili, M. A. (2003).** Assessment of impact of sewage effluents on coastal water quality in Hafnarfjardar, Iceland. UNU-Fisheries.training program.
20. **Vissman, W.; Hammer, M. J.; Perez, E. M. and Chadik, P. A. (2009).** Water supply and pollution control. 8th ed. Pearson Prentice hall, New Jersey.


21. **Wada, M. (1994).** Relationship between bacteria decomposing organic substances and water pollution in river water Nippon Eiseiqaku. Zasshi. 49 (4): 782-790.
22. **WHO, world health organization (1997).** Guidelines for drinking – water quality. Vol. 2. 2nd ed. Amman, Jordan.
23. **WHO, world health organization (2000).** Monitoring bathing waters – a practical guide to the design and implementation of assessment and monitoring programmes. TJ international Ltd. Great Britain.
24. **WHO, world health organization (2003).** Guideline for safe recreational water environments. Vol.1, costal and fresh waters. Geneva.




شكل (2) التغيرات في الاعداد الكلية للبكتريا TBC خلال مدة الدراسة



شكل (3) التغيرات في الاعداد الكلية لبكتريا القولون TC خلال مدة الدراسة



شكل (4) التغيرات في الاعداد الكلية لبكتريا القولون البرازية FC خلال مدة الدراسة



شكل(5) التغيرات في الاعداد الكلية لبكتريا المسبقيات البرازية FS خلال مدة الدراسة

جدول (1) اعداد البكتريا خلال مدة الدراسة

تشرين الثاني 2011	تشرين الاول 2011	ايلول 2011	آب 2011	تموز 2011	حزيران 2011	آيار 2011	نيسان 2011	آذار 2011	شباط 2011	كانون الثاني 2011	كانون الاول 2010	الشهر الاختبار	
25.66	17.33	93	22	40.66	83.33	89.33	42.33	214	32.33	45	49	$10^2 \times$ TBC خلية/مل	محطة 1
6.2	4.2	11	21.3	30	21.3	20	29.3	41.3	15.3	14.7	7.4	TC خلية/100مل	
3	4	7.8	11.3	20	20.7	14.7	20	34	11.3	7.6	6.5	FC خلية/100مل	
111.7	143.3	193.3	153.3	143.3	156.7	94.3	43.7	124.3	230	29	121	FS خلية/100مل	
95.66	150.33	199	77	110.33	106	107.33	175.66	310	169	152.33	92	$10^4 \times$ TBC خلية/مل	محطة 2
26.3	36.3	60.3	96.7	403.3	256.7	87.7	290	273.3	220	163.3	77.3	$10^2 \times$ TC خلية/100مل	
19.3	21.3	41.3	35.3	273.3	203.3	67	203.3	246.7	153.3	143.3	64	$10^2 \times$ FC خلية/100مل	
403.3	886.7	460	1100	1100	886.7	460	886.7	1100	886.7	220	673.3	$10^2 \times$ FS خلية/100مل	
88	46.33	171	21.33	86.33	110.66	34.33	112.66	224.66	36.33	49.33	104	$10^3 \times$ TBC خلية/مل	محطة 3
12.3	15	19.3	42.7	256.7	37	36.3	41.7	156.7	41.6	24	21.7	$10^2 \times$ TC خلية/100مل	
9.8	11.1	15.3	17	153.3	28.3	27.3	35.7	143.3	29.7	15.3	19.3	$10^2 \times$ FC خلية/100مل	
230	230	273.3	460	1100	673.3	273.3	673.3	886.7	290	77.3	403.3	$10^2 \times$ FS خلية/100مل	
41	34.33	91.33	11	75	40.33	30	71.33	51.66	31	15	52	$10^3 \times$ TBC خلية/مل	محطة 4
12	11.3	15	36.3	220	26.3	41.3	28.7	150	27.3	19.3	20	$10^2 \times$ TC خلية/100مل	
7.5	7.1	11.3	10.4	121.7	23.3	28	26	140	26.3	14.7	11.3	$10^2 \times$ FC خلية/100مل	
210	156.7	230	403.3	886.7	403.3	290	403.3	673.3	246.7	42.7	246.7	$10^2 \times$ FS خلية/100مل	

جدول (2) قيم بعض الخصائص الفيزيائية و الكيميائية المقاسة خلال مدة الدراسة

تشرين الثاني 2011	تشرين الاول 2011	ايلول 2011	أب 2011	تموز 2011	حزيران 2011	آيار 2011	نيسان 2011	آذار 2011	شباط 2011	كانون الثاني 2011	كانون الاول 2010	الشهر الاختبار	
13	15	26	30	32	29	29	24	22	17.5	15.5	13.5	Temperature °C	محطة 1
9.17	15.33	27.77	33.33	48	43.37	27.7	12.93	7.4	10.53	9.9	9.7	Turbidity NTU	
7.37	7.4	7.07	7.47	8.27	8.1	7.8	7.73	7.8	7.9	8.03	7.87	pH	
0.9	1.8	1	0.3	1.1	0.5	0.3	0.8	1.5	1.1	1.2	1.5	BOD ₅ mg/l	
13	15	26	30	32	29	29	24	22.5	17	15.5	13.5	Temperature °C	محطة 2
33.13	16.63	53.83	34.5	35.5	40.1	39.77	28.77	8.93	17.13	17.67	14.23	Turbidity NTU	
6.97	7.5	7.67	7.37	7.97	7.8	7.6	7.43	7.63	7.63	7.67	7.57	pH	
51	31	52	42	25	39	41	68.6	28.8	32	22.4	16.1	BOD ₅ mg/l	
13	15	26	30	32	29	29	24	22.5	17.5	15.5	13.5	Temperature °C	محطة 3
11.03	14.2	32.03	32.13	38.53	37.53	28.77	12.2	7.4	9.43	10.43	11.33	Turbidity NTU	
7	7.47	7.57	7.6	8.13	8.23	7.77	7.6	7.83	7.87	8	7.73	pH	
2.3	2.1	1.9	1.9	1.7	1.1	1.9	3.8	2	1.6	2.9	2.4	BOD ₅ mg/l	
13	15	26	30	32	29	29.5	24	23	17.5	15.5	13.5	Temperature °C	محطة 4
10.37	16.36	33.03	32.4	44.33	38.03	28.63	11.1	6.63	8.83	10.03	11.03	Turbidity NTU	
6.9	7.23	6.97	7.83	8.17	8.3	7.73	7.6	7.9	7.9	8	7.77	pH	
2.3	1.3	1.3	0.8	1.1	0.7	0.7	4.8	2.2	1.3	1.4	1.9	BOD ₅ mg/l	

Using microbial indicator to assessment the pollution that resulting from the discharge of domestic wastewater to Al-Diwaniya river / Iraq

Mysoon M. Al-Tae
Science collage/
Babylon university

Mohammed K. Al-Kasser
Science collage/
Al-Qadisiya university

Abstract:

The discharge of untreated or incomplete treated domestic wastewater to receiving water is result to addition of many pollutants particularly pathogenic microorganisms, which has causing various diseases to aquatic organisms and humans are using this water, so that this study is executed to evaluate the microbial pollution resulting from the discharge of domestic wastewater to Al-Diwaniya river by measuring the total bacterial count (TBC) and most probable number of coliforms (TC), fecal coliforms (FC) and fecal streptococcus (FS).

The samples are collected monthly for one year from four stations on the river, first located at the north of wastewater discharge point and it's used as controlled station, and three stations located at the south of discharge point.

The results are showed elevation in number of all bacterial types in station two, three and four comparison with the station one, and the numbers range are between $(17.33 \times 10^2 - 310 \times 10^4)$ cell/ml , $(4.2 - 403.3 \times 10^2)$, $(3 - 273.3 \times 10^2)$, $(29 - 1100 \times 10^2)$ cell/100ml for TBC, TC, FC and FS respectively.

The study results showed that the numbers of pollution indicating bacteria are outside the permissible limits of World Health Organization (WHO) for waters which are using for drinking, moreover it's exceeded permissible limits for swimming and recreational waters.