

بحث مستل تقدم به الطالب
أياد كاظم حسن

الاستهلاك المائي لمشروع (حرية – دغارة)

كلية الآداب جامعة القادسية

بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور
جميل عبد حمزة العمري

٢٠١٧ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ministry of Higher Education &
Scientific Research
College of Education For Girls
Journal Of Geographical Researches



جامعة الكوفة
كلية التربية للبنات
مجلة البحوث الجغرافية

العدد : ٣٢٦

التاريخ : ٢٠١٧ / ٣ / ٧

No:

Date :



الى // الاستاذ المساعد الدكتور جميل عبد الحمزة العمري / كلية الاداب / جامعة القادسية المحترم
الى // طالب الماجستير اياد كاظم حسن / كلية الاداب / جامعة القادسية المحترم

قد يكرم مجلة البحوث الجغرافية أطيب حياتها :

نود اعلامكم بأن بحثكم الموسوم ((الاستهلاك المائي لمشروع (حرية- داغرة))) قد تم
تقويمه و قبل للنشر في العدد القادم ... إن شاء الله.

الأستاذ الدكتور
سعدون شلال ظاهر

رئيس تحرير المجلة

المستخلص

تضمن البحث دراسة الأحتياجات المائية لمشروع (حرية – دغارة) الذي يعد احد اهم المشاريع الأروائية التنموية بشقيها الأقتصادية والأجتماعية ، كونه يمثل الجانب الزراعي في المنطقة ضمن منطقة السهل الفيضي ذات المناخ الصحراوي الجاف الذي لايمكن اعتماد الزراعة الديمية فيه بسبب قلة التساقط المطري وتذبذبهُ ، لذا يعد المشروع هو الأساس في قيام الزراعة لتلك المنطقة ، ومن هنا جاء البحث لمعرفة الأحتياجات المائية الكلية للمشروع وكفاءة الري والموازنة المائية الأجمالية بين الأيرادات الكلية والأحتياجات المائية الكلية للمشروع فتبين هناك عجز مائي لم يكفي لسد الأحتياجات المائية للمشروع . واعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسة وتحليل التباين المكاني للأحتياجات المائية في المشروع ، وايضاً استكمل بالمنهج الكمي (الأحصائي) في دراسة المعادلات والقوانين والبيانات الأحصائية التي تطلبها البحث. كما توصل البحث الى عدة استنتاجات ومن أهمها هو أن الخصائص الجغرافية (الطبيعية والبشرية) السائدة في المشروع هي العامل المؤثر بشكل رئيس في زيادة الاحتياجات المائية وتباينها في المشروع ، فضلاً عن أثر طرائق الري التقليدية التي تساعد في زيادة الهدر المائي بسبب عدم تحكمها بحجم الضائعات المائية في المشروع .

Abstract

The research includes the study of water needs for the project (Heraea - Daghara), which is one of the most important projects of irrigation and development ,that includes its both branches : social and economic the reason of the importanc of this project is owing to that it represent an agricultural side in region into flood plain which is dry desert climate . That climate can not be depended on rain-fed agriculture . In accordance with mentioned above , the project is a base of agriculturl flourishment for that region . The research interviews water needs for the project , in additio to irrigation efficiency. That means there is an overall water balance between water amount and wholly water needs . The research adopted on the analytical method for the study of spatial analysis of the water need in the project . on the other hand , it adopted on the quantitive approach method in the study of equations and laws and statistical data requested research. this study has founded out some impotent results ; the prevailing geographical charachteristics (natural and human) of the project are basic striking factor to increase or verify water needs , as well as the impact of traditional irrigation systems that help to increase water wastage due to nonability of controlling the amount of water losses in the project.


المقدمة

تعد الموارد المائية بمثابة قوام الحياة وحتى بأبسط صورها على وجه المعمورة بل أساسها الرئيسي في نشأتها والتي لا يمكن الاستغناء عنها كونها تدخل في جميع مفاصل الحياة المختلفة كالشرب والمنزلية والزراعة والنقل والصناعة والبيئة والسياحة والطاقة وغيرها . وتتجلى تلك الأهمية خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة ذات المناخ الصحراوي الجاف الذي يعد مشروع (حرية - دغارة) جزءاً منها ، الذي يتميز بمحدودية موارده المائية ، مقابل التزايد السكاني وزيادة ضغطه على المياه المتاحة بشكل غير عقلاني واستخدامه المفرط لطرائق الري البدائية وعدم الأقتصاد بالمياه ، مما أدى الى عجز المشروع عن تلبية احتياجاته المائية . لذا جاء هذا البحث لتحديد الاحتياجات المائية لغرض تعويض النقصان المائي الناتج عن زيادة الاستهلاك المائي في المشروع تمحورت مشكلة البحث في التساؤلات التالية :

- ١- هل تتباين الاحتياجات المائية زمانياً ومكانياً في المشروع؟ ولماذا؟
- ٢- هل يوجد فائض او عجز مائي عند الموازنة المائية بين الإيرادات الكلية وبين الاحتياجات المائية الكلية للمشروع؟ بينما جاءت فرضية البحث للأجابة على تلك التساؤلات وكمايلي :
- ١- هناك تباين زمني ومكاني للاحتياجات المائية في المشروع وذلك بسبب تباين الخصائص الجغرافية (الطبيعية والبشرية) في المشروع .
- ٢- نتيجة لشحة الموارد المائية المتاحة وعدم الاستثمار الأمثل للموجود منها في المشروع الأمر الذي جعل عجز مائي في الموازنة المائية بين الإيرادات المائية الكلية وبين الاحتياجات المائية الأجمالية في المشروع .
- في حين اعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسة التحليل المكاني للاحتياجات المائية في المشروع ، وايضاً استكمل بالمنهج الأسلوب الكمي (الأحصائي) في دراسة المعادلات والقوانين والبيانات الأحصائية التي تطلبها البحث.

واما حدود البحث المكانية يقع مشروع (حرية - دغارة) في محافظة القادسية ضمن منطقة السهل الفيضي ، اذ يمتد المشروع من اقصى الشمال الغربي للمحافظة والى جنوبها الشرقي ، وتتوزع اراضيه على جانبي شط الدغارة وفروعه وجدول الحرية الرئيسي وفرعيه (جدولي الحرية الجنوبي والشمالى) ، ويحده من الشمال جدول الظلمية ومشروع (حلة - ديوانية) ومن الغرب مشروع (حلة - شنافية) ومن الشرق اراضي صحراوية ومناطق كثبان رملية ، وتقع ضمنه الوحدات الأدارية والمتمثلة ببناحية (الدغارة وسومر ونفر ومركز قضاء عفك والبدير) . اما موقعه فلكياً فهو يقع بين خطي طول (٣١°٤٥" - ٣٢°١٥") شمالاً وبين دائرتي عرض (٤٥°٠" - ٤٥°٠" شرقاً) . وكما يلاحظ في خريطة (١) واما الحدود الزمانية فجاءت كواقع حال لسنة (٢٠١٥) لدراسة الاحتياجات المائية للمشروع . واما مساحة المشروع الكلية تبلغ (٧٥٠٠٠٠) دونم اما المساحة الصافية للمشروع تبلغ (٦٤٣٠٠٠) دونم (١) . في حين بلغت المساحة المرورية حسب تقدير الموازنة المائية للمشروع (٤٦٥٦٢٤) دونم (٢).

١ - الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، تقرير عن استصلاح اراضي مشروع (حرية - دغارة) في محافظة القادسية، ٢٠١٤، ص ١
٢- مديرية الموارد المائية ، محافظة القادسية ، شعبة التشغيل، بيانات غير منشورة، ٢٠١٦



اولاً - مفهوم الاحتياجات المائية.

يقصد بالاحتياجات المائية هي كمية المياه المطلوب اضافتها للمحاصيل الزراعية لتلبية الاستهلاك المائي عن طريق الري خلال مدة زمنية معينة، ويؤخذ بنظر الاعتبار كمية المطر الفعالة وطبيعة المحصول والظروف المناخية للمنطقة اثناء عملية الري، وتعتمد كمية المياه التي يمكن اضافتها للاراضي الزراعية على مقدار الضائعات المائية من التربة بواسطة الاستهلاك المائي للمحصول وكذلك جدولة الري المستخدمة في الارواء وطريقة الري.^(١) ولتصميم أي مشروع اروائي لابد من تحديد كمية المياه التي يحتاجها لغرض تأمين الاحتياجات المائية للانشطة الاقتصادية ولاسيما النشاط الزراعي، وعليه ان استثمار الاراضي زراعياً او ادخال اراضي جديدة في الزراعة ضمن المشروع يتطلب تحديد الاحتياجات المائية اللازمة لري المحاصيل الزراعية المختلفة ومقارنتها بالمصادر المائية المتوفرة خاصة في الظروف المناخية الجافة والشبه جافة والتي يتسم بها المشروع، والمتمثلة بتذبذب التساقط المطري وندرة مياه الري وعليه ان يكون هناك استثمار امثل للموارد المائية في المشروع.^(٢)

ثانياً: حساب الاحتياجات المائية للمشروع .

١- الاحتياجات الري الصافية (ملم):

يقصد بالاحتياجات الري الصافية بأنها كمية المياه اللازم اضافتها وخرزنها في المنطقة الجذور الفعالة كي يتمكن النبات من الاستفادة منها لغرض النمو، او انها كمية الماء المطلوبة لسد حاجات البخر / النتح المحاصيل بعد ان يطرح منها كمية الامطار الفعالة .^(٣) ويمكن حساب احتياجات الري الصافية للمحاصيل الزراعية في المشروع وفق المعادلة الآتية^(٤):

$$In = Etcrops - pe$$

حيث ان:

$In =$ احتياجات الري الصافية . $Etcrops =$ التبخر/النتح للمحاصيل . $Pe =$ كمية الأمطار الفعالة.

تم حساب الاحتياجات الري الصافية للمحاصيل الزراعية في المشروع من خلال تطبيق معادلة (In) وكما يلحظ في جدول (٥١) حيث بلغ مجموع احتياجات الري الصافية للمحاصيل الزراعية الشتوية في المشروع (١٨،١٨٦٢٨ ملم) اما على مستوى المحاصيل الزراعية فبلغ مجموع احتياجات الري الصافية للمحاصيل المنتجة كالقمح والشعير (٤٨٠،٠٢ و ٤٦٨،٧٢ ملم) حسب الترتيب . اما الاحتياجات الري الصافية للمحاصيل العلف كالجوت والبرسيم فبلغت (١٨٥٨،٠٣ و ٤٩٢،٢٩ ملم) حسب الترتيب ، اما محاصيل البقولية كالباقلاء الخضراء فيصل مجموع احتياجات الري الصافية له الى (٥٢٥،٩٨ ملم) اما محاصيل الخضر الشتوية والتي تشمل البصل

^١ - عصام خضير الحديثي واحمد مدلول الكبيسي وياس خضير الحديثي ، تقانات الري الحديثة ومواضيع اخرى في المسألة المائية ، ط١ ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الأنبار ، كلية الزراعة ، ٢٠١٠ ، ص٥٩-٦٠
^٢ - نبيل ابراهيم الطيف ، الري اساسياته وتطبيقاته، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، ١٩٨٨ ، ص٢٠٧
^٣ - رفاه مهنا محمد ، مشروع الخالص الأروائي - دراسة في جغرافية الموارد المائية ، رسالة ماجستير ، (غ - م) ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ٢٠٠٦ ، ص١٢٦
^٤ - زهراء مهدي صالح القره غولي ، مشروع التريمة الأروائي في محافظة القادسية ، رسالة ماجستير ، (غ - م) ، كلية الآداب ، جامعة القادسية ، ٢٠١٥ ، ص١٥٧

اليابس والبصل الاخضر والطماطة المغطاة والخيار المغطى والشلغم والشونذر والجزر فيصل مجموع احتياجات الري الصافية لكل نوع من هذه المحاصيل الى (٦٤٣,٦٨ و ٦٤٣,٦٨ و ٤٠٩,٩٧ و ٤٠٩,٩٧ و ٤٠٩,٩٧ و ٣٤٤,٤٤ و ٣٤٤,٤٤ و ٣٤٤,٤٤) حسب الترتيب . اما احتياجات الري الصافية لمحاصيل السيناغ والسلق فبلغت (٣٢٥,٢٣ و ٥٢١,٥) حسب الترتيب. اما محاصيل الخضروات والتي تشمل الخس والفجل والكرفس والكرات والرشاد فيصل مجموع الاحتياجات الري الصافية لكل محصول الى (٣٢٥,٢٣ و ٣٤٤,٤٤ و ٣٨٢,٠١ و ٣٨٢,٠١ و ٣٨٢,٠١) حسب الترتيب. اما المحاصيل الصيفية التي تزرع في المشروع فبلغ مجموع احتياجات الري الصافية لها (٢١٩٧٨,٧٢) ملم) اما على مستوى نوع المحاصيل ، حيث بلغت احتياجات الري الصافية للمحاصيل المنتجة مثل الذرة الصفراء والذرة البيضاء والماش (١١٤٨,٦٦ و ٨٨٠,٥٩ و ٨٧٩,٥٥) ملم) وحسب الترتيب . اما المحاصيل الصناعية مثل السمسم والدخن والقطن فبلغ مجموع احتياجات الري الصافية لكل محصول (٩٦٠,٧٨ و ١٠٥٩,٥ و ١٨٣٦,١٥) ملم) حسب الترتيب. اما محاصيل العلف كالجوت فيصل مجموع الاحتياجات الري الصافية له الى (١٠٥٩,٥) ملم. اما محاصيل الخضر الصيفية مثل الرقي والبطيخ وخيار الماء وخيار القثاء والطماطة والشجر والياميا والبادنجان واللوبياء والفلفل حيث بلغ مجموع الاحتياجات الري الصافية لكل محصول الى (٩٢٤,٩٩ و ٩٢٤,٩٩ و ١١٠٥,٨٣ و ٩٨١,٦٦ و ١٣٠٥,٨٣ و ١٠٧٣,٣٧ و ١٢٠٦,٧٤ و ١٢٤١,٩٧ و ١٠٠٤,٩٤ و ١١٠٠,٣٢) ملم) حسب الترتيب. اما الأشجار المعمرة (النخيل) فبلغ مجموع احتياجات الري الصافية لها (١٨٦٧,٠٩) ملم).

ويستنتج مما تقدم ان احتياجات الري الصافية للمحاصيل الصيفية أكبر مما عليه في المحاصيل الشتوية ويرجع السبب في ذلك الى ارتفاع درجات الحرارة وطول ساعات التشميس وزيادة عملية التبخر وانعدام الرطوبة في الجو والتساقط المطري ، الأمر الذي جعل المحاصيل الصيفية يزداد معدلها للاستهلاك المائي بسبب زيادة عملية التبخر/النتح ولغرض تعويض كمية الماء المستهلكة ازدادت احتياجات الري الصافية لهذه المحاصيل لسد حاجتها من الماء اللازم لإتمام عملية الري لهذه المحاصيل ، بينما المحاصيل الشتوية التي تنمو في ظروف مناخية قد تكون ملائمة لنمو النبات ، حيث ان انخفاض درجة حرارة الجو ووجود التساقط المطري وقصر النهار قد يقلل من الاستهلاك المائي وبالتالي تقل كمية الماء اللازمة لري النباتات مما أدى الى قلة احتياجات الري الصافية للمحاصيل الشتوية في المشروع.

المجموع	ك١	ت٢	ت١	ايلول	آب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	آذار	شباط	ك٢	الاشهر المحاصيل
٨٥,٥	١٥,٢٧	١١,٨	٤,٤٨	—	—	—	—	٤,٦٤	١٣,٥٤	٩,٢٢	١٠,٥٧	١٦,٥	كمية الامطار الفعالة
٤٨٠,٠٢	٢٩,٤١	٣٦	—	—	—	—	—	—	١٤١,٣	١٥٢,٤٩	٨٠,١	٤٠,٧٢	القمح
٤٦٨,	٤٩,٩٩	٣٢,٧	—	—	—	—	—	—	١٤٥,١٦	١٤٤,٢٧	٨٠,١	١٦,٥	الشعير
١٨٥٨,٣	٥٠,٨٨	٦٤,٥٤	١٣٧,٣٩	١٨٤,٥٣	٢٤٤,٨٨	٢٨٢,٩٧	٢٧٤,٦٩	٢٢١,٩١	١٦٤,٤٥	١١٩,٦	٦٧,٣٧	٤٥,٨٢	الجت
٤٩٢,	٣٨,١١	٤٠,٩	٧٤,١٠	—	—	—	—	—	١٥٨,٦٦	١١٦,٨٦	٧١,٣٥	-٧,٤٤	البرسيم
٥٢٥,	٣٥,٢١	٣٩,٣	٧٧,١٩	—	—	—	—	—	١٢٢,٥١	١١٤,١٢	٧٥,٣٣	٦٢,٨٢	البقلاء خضراء
٦٤٣,	٣٠,٥٧	٣٦,٨	٦٩,٦٢	—	—	—	—	١١٨,٦٤	١٥٢,٨٧	١٣٠,٥٧	٦٨,٩٧	٣٥,٦٢	ثوم
٦٤٣,	٣٠,٥٧	٣٦,٨	٦٩,٦٢	—	—	—	—	١١٨,٦٤	١٥٢,٨٧	١٣٠,٥٧	٦٨,٩٧	٣٥,٦٢	بصل يابس
٦٤٣,	٣٠,٥٧	٣٦,٨	٦٩,٦٢	—	—	—	—	١١٨,١٤	١٥٢,٨٧	١٣٠,٥٧	٦٨,٩٧	٣٥,٦٢	بصل اخضر
٤٠٩,	٤٠,٤٣	٤٠,١	٨٨,١٤	—	—	—	—	—	—	١١٤,١٢	٧٨,٥١	٤٨,٦٥	طماطة مغطاة
٤٠٩,	٤٠,٤٣	٤٠,١	٨٨,١٤	—	—	—	—	—	—	١١٤,١٢	٧٨,٥١	٤٨,٦٥	خيار مغطى
٣٢٥,	٤٠,٤٣	٥٢,٤	٨١,٩٧	٩٤,١٠	—	—	—	—	—	—	—	٤٦,٩٥	خس
٣٢٥,	٤٩,٧٢	٥٢,٤	٨١,٩٧	٩٤,١٠	—	—	—	—	—	—	—	٤٦,٩٥	سبيناغ
٣٤٤,	٤٩,٧٢	٤٠,٩	٦٩,٦٢	—	—	—	—	—	—	٧٥,٧٥	٧١,٣٥	٤٩,٢٢	شلفم
٣٤٤,	٣٧,٥٥	٤٠,٩	٦٩,٦٢	—	—	—	—	—	—	٧٥,٧٥	٧١,٣٥	٤٩,٢٢	شوندر
٣٤٤,	٣٧,٥٥	٤٠,٩	٦٩,٦٢	—	—	—	—	—	—	٧٥,٧٥	٧١,٣٥	٤٩,٢٢	جزر
٣٤٤,	٣٧,٥٥	٤٠,٩	٦٩,٦٢	—	—	—	—	—	—	٧٥,٧٥	٧١,٣٥	٤٩,٢٢	الفجل
٣٤٤,	٢٩,٩٩	٥٢,٤	٨١,٩٧	٩٤,١٠	—	—	—	—	—	—	٧٨,٥١	٤٦,٩٥	كرفس
٣٤٤,	٢٩,٩٩	٥٢,٤	٨١,٩٧	٩٤,١٠	—	—	—	—	—	—	٧٨,٥١	٤٦,٩٥	كراث
٣٤٤,	٢٩,٩٩	٥٢,٤	٨١,٩٧	٩٤,١٠	—	—	—	—	—	—	٧٨,٥١	٤٦,٩٥	رشاد
٥٢١,	٣٥,٢١	٣٩,٣	٧٢,٧١	—	—	—	—	—	١٢٢,٢١	١١٤,١٢	٧٥,٣٣	٦٢,٨٢	سلق

المجموع	ك	٢	١	اليول	آب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	شباط	آذار	ك	الإشهر المحاصيل
١١٤٨,٦٦	—	—	—	١٣٣,٨٤	٢٣٧,٠٢	٢٩٩,٢٧	٢٣٧,٢٣	١٤٨,٢٣	٩٣,٠٧	—	—	—	الذرة الصفراء
٨٨٠,٥٩	—	—	—	—	—	١٤٩,٦٣	٢٤٣,٤٧	٢٦٦,٥٨	١٤٥,١٦	—	٧٥,٧٥	—	الذرة البيضاء
٨٧٩,٥٥	—	—	—	—	—	١٧٩,٥٦	٣٠٢,٧٨	٢٠٤,٩٤	١٢٢,٠١	—	٧٠,٢٦	—	ماش
٩٦٠,٧٨	—	—	—	٩٤,١٠	٢٠٨,٧١	٣١٥,٩٠	٢١٨,٥٠	١٢٣,٥٧	—	—	—	—	سمسم
١٧٧١,٩٥	—	—	—	٢٠٩,١٣	٢٧٨,٢٨	٣٦٥,٧٨	٣٤٣,٣٦	٢٦٧,٦٨	١٧٩,٨٩	—	١٢٧,٨٣	—	جت
١٠٥٩,٥	—	—	—	—	١٦٦,٩٦	١٦٦,٢٦	٣١٨,٣٩	٢١٤,٨	١٢٠,٠٨	—	٧٣,٠١	—	دخن
١٨٣٦,١٥	—	—	—	٢٠٩,١٣	٣٣٣,٩٣	٣٩٩,٠٣	٣٧٤,٥٨	٢٦٦,٥٨	١٧٩,٨٩	—	٧٣,٠١	—	قطن
٩٢٤,٩٩	—	—	—	—	١٩٤,٧٩	٢٠٩,٢٥	٢٥٩,٠٨	١٦٣,٠٢	٩٨,٨٥	—	—	—	رقى
٩٢٤,٩٩	—	—	—	—	١٩٤,٧٩	٢٠٩,٢٥	٢٥٩,٠٨	١٦٣,٠٢	٩٨,٨٥	—	—	—	بطيخ
١١٠٥,٨٣	—	—	—	—	١٧٥,٢٤	٣٤٥,٨٣	٢٨٧,١٧	١٨٥,٢١	١١٢,٣٦	—	—	—	خيار ماء
٩٨١,٦٦	—	—	—	—	١٥٠,٢٧	٢٩٩,٢٧	٢٦٥,٣٢	١٦٧,٩٥	٩٨,٨٥	—	—	—	خيار قثاء
١٣٠٥,٨٣	—	—	—	٩٦,١٩	٢١١,٤٩	٣١٩,٢٢	٢٩٣,٤٢	١٩٢,٦١	١٢٠,٠٨	—	٧٣,٠١	—	طماطة
١٠٧٣,٣٧	—	—	—	—	١٦٤,١٨	٣٢٩,١٨	٢٨٠,٩٣	١٨٠,٢٨	١٠٨,٥	—	—	—	شجر
١٢٠٦,٧٤	—	—	—	٩٦,١٩	٢١١,٤٩	٣١٩,٢٢	٢٩٣,٤٢	١٩٢,٦١	١٢٠,٠٨	—	٧٣,٠١	—	باميا
١٢٤١,٩٧	—	—	—	٩٤,١٠	٢١١,٤٩	٣٠٥,٩٢	٢٨٠,٩٣	١٥٧,٥٦	١١٦,٢٢	—	٧٥,٧٥	—	بادنجان
١٠٠٤,٩٤	—	—	—	—	١٥٠,٢٧	٣٢٢,٥٥	٢٦٥,٣٢	١٦٧,٩٥	٩٨,٨٥	—	—	—	لوبياء
١١٠٠,٣٢	—	—	—	—	٣٣٣,٩٣	٣٤٥,٨٣	٢٨٧,١٧	١٨٥,٢١	١١٢,٣٦	—	—	—	فلفل
١٨٦٧,٠٩	٣٤,٠٥	٥٨,٢٦	١١٩,٠٢	١٦٧,٣٠	٢٣٦,٥٣	٢٨٥,٦٥	٢٩٦,٥٤	٢٢٩,٦	١٨٩,٥٣	٧٢,٩٤	١٣٤,٦٨	٤٢,٩٩	البساتين

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على: (١) جدول (٣٩) و(٤٤) و(٤٥) و(٤٦). (٢) تطبيق معادلة Etcrops -pe

٢ - احتياجات الري الكلية (ملم):

يقصد بالاحتياجات الري الكلية أنها عبارة عن كمية المياه الكلية اللازم إضافتها للحقل الزراعي لغرض أمداد النبات بالمياه وتشتمل احتياجات الري الكلية على احتياجات الري زائداً الضائعات المائية الحقلية سواء المتبخرة الى الجو او المترشحة الى باطن الأرض أي حاجات الري الصافية بعد تضمينها الفواقد المائية على مستوى الحقل. وتقاس بوحدة ملم لكل رية او ملم/مدة وقد تم حساب الاحتياجات الري الكلية اعتماداً على المعادلة الآتية^(١) .

$$I_g = \frac{I_n}{E_a}$$

حيث ان I_g = احتياجات الري الكلية . I_n = احتياجات الري الصافية. E_a = الكفاءة الحقلية بموجب دراسة الموازنة المائية في العراق تساوي (٧٣%) للموسم الشتوي (تشرين الثاني - نيسان) و(٧٠%) للموسم الصيفي (مايس - تشرين الاول).

ووفقاً لتطبيق معادلة احتياجات الري الكلية (I_g) تم حساب احتياجات المائية الكلية للمحاصيل الزراعية في المشروع وكما مبين في جدول (٥٢) حيث بلغ مجموع احتياجات المائية الكلية للمحاصيل الشتوية (١٣١٩٤,٣٤ ملم) اما على مستوى نوع المحاصيل فبلغ مجموع الاحتياج الكلي للماء لغرض أتمام عملية ري المحاصيل المنتجة كالقمح والشعير (٦٥٧,٥٤ و ٦٤٢,٠٥ ملم) حسب الترتيب. اما مجموع الاحتياجات الري الكلية لمحاصيل العلف كالجوت والبرسيم فبلغ (٢٥٤٥,١٨ و ٦٧٤,٧٥ ملم). اما مجموع احتياجات الري الكلية للمحاصيل البقولية كالباقلاء الخضراء فبلغ (٧٢٠,٤٨ ملم). اما محاصيل الخضر الشتوية التي تشمل البصل اليباس والبصل الاخضر والطماطة المغطاة والخيار المغطى والخس والشلغم والشونذر والجزر فبلغ مجموع احتياجات الري الكلية ولكل محصول (٨٨١,٧١ و ٨٨١,٧١ و ٥٦١,٥٦ و ٥٦١,٥٦ و ٤٧١,٧٩ و ٤٧١,٧٩ و ٤٧١,٧٩ ملم) حسب الترتيب. اما محاصيل السبيناغ والسلق فبلغ مجموع احتياجات الري الكلية لكل محصول فبلغ (٤٤٥,٤٩ و ٧١٤,٦٣ ملم) حسب الترتيب. اما محاصيل الخضروات كالخس والفجل والكرفس والرشاد فبلغ مجموع الاحتياجات الري الكلية لكل محصول (٤٤٥,٤٩ و ٤٧١,٧٩ و ٥٢٥,٠١ و ٥٢٥,٠١ و ٥٢٥,٠١ ملم) حسب الترتيب. اما المحاصيل الصيفية فبلغ مجموع احتياجات الري الكلية لها (٣٠٥٤٧,٦٣ ملم) اما على مستوى المحاصيل فيصل مجموع احتياجات الري الكلية للمحاصيل المنتجة كالذرة الصفراء والذرة البيضاء والماش الى (١٦٤٠,٩٢ و ١٢٥٧,٩٦ و ١٢٥٦,٤٩ ملم) حسب الترتيب. اما احتياجات الري الكلية للمحاصيل الصناعية مثل السمسم والقطن والدخن فبلغ مجموعها لكل محصول واحد (١٣٧٢,٥١ و ٢٥٣١,٥٥ و ١٥١٣,٠٤ ملم) وحسب الترتيب. اما محاصيل الخضر الصيفية التي تشمل الرقي والبطيخ وخيار الماء وخيار القثاء والطماطة والشجر والياميا والبادنجان واللوبياء والفلفل فيصل مجموع احتياجات الري الكلية الى (١٣٢١,٨٢ و ١٣٢١,٨٢ و ١٥٧٩,٧١ و ١٤٠٢,٣٢ و ١٨٦٥,٧١ و ١٦٥٣,٧٩ و ١٨٦٤,٩٩ و ١٧٧٤,١٩ و ١٤٣٥,٦ و ١٨٤٠,٧٤ ملم) ولكل محصول حسب الترتيب. اما المحاصيل المعمرة (النخيل) فبلغ مجموع احتياجات الري الكلية لها (٢٦٦٧,٩١ ملم) .

^١ - زهراء مهدي صالح القره غولي ، مصدر سابق ، ص ١٥٨.

جدول (٥٢) احتياجات الري الكلية(لم) للمحاصيل المزروعة في مشروع (حرية - دغارة)

المجموع	لك	٢	١	ايلول	آب	تموز	مايس	حزيران	نيسان	آذار	شباط	٢ لك	الاشهر المحاصيل
٦٥٧,٥٤	٤٠,٢٨	٤٩,٣١	—	—	—	—	—	—	١٩٣,٥٦	٢٠٨,٨٩	١٠٩,٧٢	٥٥,٧٨	القمح
٦٤٢,٥٥	٦٨,٤٧	٤٤,٧٩	—	—	—	—	—	—	١٩٨,٨٨	١٩٧,٦٣	١٠٩,٧٢	٢٢,٦٠	الشعير
٢٥٤٥,١٨	٦٩,٦٩	٨٧,٧٢	١٨٨,٢٠	٢٥٢,٥٩	٣٣٥,٤٥	٣٨٧,٦٣	٢٠٣,٩٨	٣٧٦,٢	٢٢٥,٢	١٦٣,٨٣	٩٢,٢٨	٦٢,٧٦	الجت
٦٧٤,٧٥	٥٢,٢٠	٥٦,٠٩	١٠١,٥٠	—	—	—	—	—	٢١٧,٣	١٦٠,٠٨	٩٧,٧٣	-١٠,١٩	البرسيم
٧٢٠,٤٨	٤٨,٢٣	٥٣,٨٣	١٠٥,٧٣	—	—	—	—	—	١٦٧,١٣	١٥٦,٣٢	١٠٣,١٩	٨٦,٥٥	البقلاء الخضراء
٨٨١,٧١	٤١,٨٧	٥٠,٤٣	٩٥,٣٦	—	—	—	١٦٢,٥٢	—	٢٠٩,٤	١٧٨,٨٦	٩٤,٤٧	٤٨,٧٩	ثوم
٨٨١,٧١	٤١,٨٧	٥٠,٤٣	٩٥,٣٦	—	—	—	١٦٢,٥٢	—	٢٠٩,٤	١٧٨,٨٦	٩٤,٤٧	٤٨,٧٩	بصل يابس
٨٨١,٧١	٤١,٨٧	٥٠,٤٣	٩٥,٣٦	—	—	—	—	—	٢٠٩,٤	١٧٨,٨٦	٩٤,٤٧	٤٨,٧٩	بصل اخضر
٥٦١,٥٦	٥٥,٣٨	٥٤,٩٥	١٢٠,٧٣	—	—	—	—	—	—	١٥٦,٣٢	١٠٧,٥٤	٦٦,٦٤	طماطة مغطاة
٥٦١,٥٦	٥٥,٣٨	٥٤,٩٥	١٢٠,٧٣	—	—	—	—	—	—	١٥٦,٣٢	١٠٧,٥٤	٦٦,٦٤	خيار مغلي
٤٤٥,٤٩	٦٨,١٠	٧١,٩٠	١١٢,٢٨	١٢٨,٩٠	—	—	—	—	—	—	—	٦٤,٣١	خس
٤٤٥,٤٩	٦٨,١٠	٧١,٩٠	١١٢,٢٨	١٢٨,٩٠	—	—	—	—	—	—	—	٦٤,٣١	سبيناغ
٤٧١,٧٩	٥١,٤٣	٥٦,٠٩	٩٥,٣٦	—	—	—	—	—	—	١٠٣,٧٦	٩٧,٧٣	٦٧,٤٢	شلغم
٤٧١,٧٩	٥١,٤٣	٥٦,٠٩	٩٥,٣٦	—	—	—	—	—	—	١٠٣,٧٦	٩٧,٧٣	٦٧,٤٢	شونذر
٤٧١,٧٩	٥١,٤٣	٥٦,٠٩	٩٥,٣٦	—	—	—	—	—	—	١٠٣,٧٦	٩٧,٧٣	٦٧,٤٢	جزر
٤٧١,٧٩	٥١,٤٣	٥٦,٠٩	٩٥,٣٦	—	—	—	—	—	—	١٠٣,٧٦	٩٧,٧٣	٦٧,٤٢	الفجل
٥٢٥,٠١	٤١,٠٨	٧١,٩٠	١١٢,٢٨	١٢٨,٩٠	—	—	—	—	—	—	٨٦,٠٥	٦٣,٣١	كرفس
٥٢٥,٠١	٤١,٠٨	٧١,٩٠	١١٢,٢٨	١٢٨,٩٠	—	—	—	—	—	—	١٠٧,٥٤	٦٣,٣١	كراث
٥٢٥,٠١	٤١,٠٨	٧١,٩٠	١١٢,٢٨	١٢٨,٩٠	—	—	—	—	—	—	١٠٧,٥٤	٦١,٣١	رشاد
٧١٤,٦٣	٤٨,٢٣	٥٣,٨٣	٩٩,٦٠	—	—	—	—	—	١٦٧,٤	١٥٦,٣٢	٨٦,٠٥	٨٦,٠٥	سلق

المجموع	ك١	ث٢	ث١	اليول	آب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	آذار	شباط	ك٢	الإشهر/ المحاصيل
١٦٤٠,٩٢	—	—	—	١٩١,٢	٣٣٨,٦	٤٢٧,٥٢	٣٣٨,٩	٢١١,٧٥	١٣٢,٩٥	—	—	—	الذرة الصفراء
١٢٥٧,٩٦	—	—	—	—	—	٢١٣,٧٥	٣٤٧,٨١	٣٨٠,٨٢	٢٠٧,٣٧	١٠٨,٢١	—	—	الذرة البيضاء
١٢٥٦,٤٩	—	—	—	—	—	٢٥٦,٥١	٤٣٢,٥٤	٢٩٢,٧٧	١٧٤,٣	١٠٠,٣٧	—	—	ماش
١٣٧٢,٥١	—	—	—	١٣٤,٤٢	٢٩٨,١٥	٤٥١,٢٨	٣١٢,١٤	١٧٦,٥٢	—	—	—	—	سمسم
٢٥٣١,٣٣	—	—	—	٢٩٨,٧٥	٣٩٧,٥٤	٥٢٢,٥٤	٤٩٠,٥١	٣٨٢,٤	٢٥٦,٩٨	١٨٢,٦١	—	—	جت
١٥١٣,٥٥	—	—	—	—	٣٢٨,٥١	٢٣٧,٥١	٤٥٤,٨٤	٣٠٦,٨٥	١٧١,٥٤	١٠٤,٣	—	—	دخن
٢٦٢٣,٠٤	—	—	—	٢٩٨,٧٥	٤٧٧,٠٤	٥٧٠,٠٤	٥٣٥,١١	٣٨٠,٨٢	٢٥٦,٩٨	١٠٤,٣	—	—	قطن
١٣٢١,٨٢	—	—	—	—	٢٧٨,٢٧	٢٩٨,٩٢	٣٧٠,١١	٢٣٢,٨٨	١٤١,٢١	—	—	—	رفي
١٣٢١,٨٢	—	—	—	—	٢٧٨,٢٧	٢٩٨,٩٢	٣٧٠,١١	٢٣٢,٨٨	١٤١,٢١	—	—	—	بطيخ
١٥٧٩,٧١	—	—	—	—	٢٥٠,٣٤	٤٩٤,٠٤	٤١٠,٢٤	٢٦٤,٥٨	١٦٠,٥١	—	—	—	خيار ماء
١٤٠٢,٣٢	—	—	—	—	٢١٤,٦٧	٤٢٧,٥٢	٣٧٩,٠٢	٢٣٩,٩٢	١٤١,٢١	—	—	—	خيار قشاة
١٨٦٥,٧١	—	—	—	١٣٧,٤١	٣٠٢,١٢	٤٥٦,٠٢	٤١٩,١٧	٢٧٥,١٥	١٧١,٥٤	١٠٤,٣	—	—	طماطة
١٦٥٣,٧٩	—	—	—	—	٢٣٤,٥٤	٤٨٤,٥٤	٤٠١,٣٢	٢٧٥,٥٤	٢٥٧,٨٥	—	—	—	شجر
١٨٦٤,٩٩	—	—	—	١٣٧,٤١	٣٠٢,١٢	٤٥٦,٠٢	٤١٩,١٧	٢٧٥,١٥	١٧١,٥٤	١٠٣,٤	—	—	ياميا
١٧٧٤,١٩	—	—	—	١٣٤,٤٢	٣٠٢,١٢	٤٣٧,٠٢	٤٠١,٣٢	٢٢٥,٠٨	١٦٦,٠٢	١٠٨,٢١	—	—	باننجان
١٤٣٥,٦	—	—	—	—	٢١٤,٦٧	٤٦٠,٧٨	٣٧٩,٠٢	٢٣٩,٩٢	١٤١,٢١	—	—	—	لوبياء
١٨٤٠,٧٤	—	—	—	—	٢٤٢,٥	٤٩٤,٠٤	٤١٠,٢٤	٢٦٤,٥٨	١٦٠,٥١	—	—	—	فلفل
٢٦٦٧,٩١	٤٨,٦٤	٨٣,٢٢	١٧٠,٠٢	٢٣٩	٣٣٧,٩	٤٠٨,٠٧	٤٢٣,٦٢	٣٢٨	٢٧٠,٧٥	١٩٢,٤	١٠٤,٢	٦١,٤١	البساتين

المصدر: ١- من عمل الباحث اعتماداً على: (١) جدول (٥١). (٢) تطبيق معادلة الآتية: $Ig = \frac{In}{Ea}$

٣- الاحتياجات المائية الكلية للتركيب المحصولي المنتخب (ملم):

يقصد بها احتياجات الري الكلية للمحاصيل الداخلة ضمن الدورة الزراعية المتبعة في المشروع التي تعتمد أساساً على كفاءة التصريف التصميمي لشبكات الري الموزعة على أراضي المشروع ، وعلى مدى توفير الحصة المائية الاجمالية المخصصة لسطح الدغارة وجدول الحرية الرئيسي . والغرض من التركيب المحصولي المنتخب (Cp) هو تأمين الاحتياجات المائية الكلية لهذه المحاصيل المحددة بخطة زراعية متبعة في المشروع^(١). وقد تم حساب الاحتياجات الكلية للتركيب المحصولي المنتخب اعتماداً على الاحتياجات الري الكلية للمحاصيل في كل شهر ونسبة كل محصول من المساحة المرورية وفق المعادلة الآتية^(٢).

$$Cp = Ig \times Ci$$

حيث ان :

$Cp =$ الاحتياجات الكلية للتركيب المحصولي المنتخب. $Ig =$ احتياجات الري الكلية.

$Ci =$ النسبة المؤوية للمحاصيل المزروعة خلال موسم معين الى المساحة الاجمالية المزروعة .

وكما يلحظ من جدول (٥٣) أن النسبة المئوية للمحاصيل الزراعية في المشروع بلغت (١٠٠%) ، منها محاصيل شتوية التي تشمل (القمح والشعير والجبث والبرسيم والباقلان والبصل اليابس والبصل الاخضر والطماطة المغطاة والخيار المغطى والخس والسبيناغ والشلغم والشونذر والسلق والفجل والكرفس والكراث) فبلغت نسب هذه المحاصيل (٤٠ و ٣٠ و ٢ و ٢ و ٠,٧٤ و ٠,٢٤ و ٠,٤٨ و ٠,٠٥ و ٠,٠٢ و ٠,٠٧ و ٠,٠٧ و ٠,٠٦ و ٠,٠٢ و ٠,٠٣ و ٠,٨١ و ٠,٦٠ و ٠,٦٠ و ٠,٦٠%) حسب الترتيب. اما المحاصيل الصيفية التي تشمل (الذرة الصفراء والذرة البيضاء والسوسم والدخن والجبث والقطن والماش واللوبياء والفلفل والرقمي والبطيخ وخيار الماء وخيار القثاء والطماطة والشجر والماميا والبادنجان) حيث بلغت نسب هذه المحاصيل (٣ و ٤ و ١ و ٣ و ٢ و ٠,١٢ و ٠,٣٤ و ٠,٣٨ و ٠,٠٢ و ٢ و ٢ و ٠,٤٥ و ٠,٢٩ و ٠,١٣ و ٠,٠٢ و ٠,٣٣ و ٠,٧١%) حسب الترتيب. اما المحاصيل المعمرة فبلغت نسبتها (٢%) من المساحة المزروعة. وكما يلحظ من الجدول (٥٣) ان الاحتياجات الري الكلية الشهرية للتركيب المحصولي المنتخب لكل من المحاصيل الشتوية و الصيفية والمعمرة (النخيل) بلغ مجموعها السنوي (٦١٩٩,٩١ ملم) ، حيث يتراوح مجموع الاحتياجات الري الشهرية لهذه المحاصيل ما بين اعلى قيمة لتصل الى (٩٥٨,٥٦ ملم) في شهر (تموز) وبين اقل قيمة تصل الى (٢١٩,٤٨ ملم) في شهر (تشرين الثاني) . إذ إن الاحتياجات الري الكلية الشهرية للمحاصيل المزروعة في المشروع ترتفع بدءاً من شهر (كانون الأول وكانون الثاني و شباط وآذار ونيسان و مايس و حزيران وتموز وحتى آب) فبلغت (٢٢٩,٤٤ و ٣٠٥,٤٦ و ٤٤١,٠٩ و ٥٩٦,٥٤ و ٧٢٨,٨٢ و ٨٦٠,٨ و ٦٠٣,١٢ و ٩٥٨,٥٦ و ٥٥٧,٣٧ ملم) وحسب الترتيب. بينما تنخفض الاحتياجات الري الكلية الشهرية بدءاً من شهر (ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني) فبلغت (٣٠٢,٥٩ و ٣٩٥,٨٣ و ٢١٩,٤٨ ملم) حسب الترتيب.

^١ - رفاه مهنا محمد ، مشروع الخالص الأروائي ، مصدر سابق ، ص ١٣٥.

^٢ - محمد جعفر السامرائي ، مشاريع الري والبزل الحديثة في محافظات ميسان وذي قار والبصرة، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ١٩٩٩ ، ص ٢٨١

٤- الاحتياجات المائية اليومية (ملم):

يقصد بالاحتياجات المائية اليومية أنها كمية الماء الواجب إضافتها باليوم للمحاصيل المزروعة في المشروع . وتحسب من خلال قسمة مجموع الاحتياجات المائية الشهرية ولكل شهر معين على عدد أيام ذلك الشهر . واعتماداً على المعادلة الآتية^(١).

الاحتياجات الشهرية المائية لشهر معين

الاحتياجات المائية اليومية =

عدد ايام الشهر نفسه

ووفقاً لتطبيق المعادلة السابقة تم حساب الاحتياجات المائية اليومية وكما مبين في جدول (٥٣) أن مجموع الاحتياجات المائية اليومية للمحاصيل الشتوية والصيفية والمعمرة (البساتين) يتراوح بين (٧,٣١ و ٣٠,٩٢ ملم) في شهري (تشرين الثاني وتموز) إذ يبلغ مجموع الاحتياج المائي اليومي لهذه المحاصيل لكل شهر (٩,٨٥ و ١٥,٧٥ و ١٩,٢٤ و ٢٤,٢٩ و ١٩,٤٥ و ٢٨,٦٩ و ٣٠,٩٢ و ١٧,٩٧ و ١٠,٠٨ و ١٢,٧٦ و ٧,٣١ و ٧,٤٠ ملم) للأشهر التالية (كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان ومايس وحزيران وتموز وآب وإيلول وتشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول) حسب الترتيب .

٥- المقنن المائي عند المنفذ الحقلي (المقنن المائي الحقلي) (لتر/ثا/هكتار):

يقصد به كمية الماء الواجب إضافتها لري المحاصيل الزراعية في وحدة مساحية من الحقل محسوبة كتصرف في اليوم الواحد ، بحيث يجب أن تكون هذه الكمية المضافة من الماء مساوية للاستهلاك المائي زائداً الضائعات المائية الحقلية، ويعتمد المقنن المائي الحقلي بالدرجة الأساسية على الدورة الزراعية المتبعة وأنظمة تجهيز المياه^(٢). فضلاً عن نوع النبات ومرحلة نموه ونوع التربة ومحتواها الرطوبي ومعدل درجة الحرارة^(٣). ويمكن حساب المقنن المائي الحقلي وفق المعادلة الآتية^(٤).

$$\text{المقنن المائي عند المنفذ الحقلي لشهر معين (لتر/ثا/هكتار)} = \frac{\text{مجموع الاحتياجات الشهرية ملم}}{\text{عدد ايام الشهر}} \times 0,11074$$

ووفقاً لتطبيق المعادلة أعلاه توصلت الى نتائج وكما مبينة في جدول (٥٣) تشير الى أن المقنن المائي عند المنفذ الحقلي للمشروع يتراوح بين أقل مقدار في شهر (تشرين الثاني) إذ بلغت (٠,٨٤ لتر/ثا /هكتار) وبين أعلى مقدار لها في شهر (تموز) إذ بلغت (٣,٥٧ لتر/ثا/هكتار). إذ إن مقدار الاحتياجات المائية عند المنفذ الحقلي للمشروع تزداد في الأشهر التي ترتفع فيها درجات الحرارة بدءاً من شهر (آذار و نيسان و مايس و حزيران و تموز و آب) لتصل الاحتياجات المائية في هذه الأشهر الى (٢,٢٢ و ٢,٨١ و ٢,٢٥ و ٣,٣٢ و ٣,٥٧

١ - رفاه مهنا محمد ، مشروع الخالص الاروائي ، مصدر سابق ، ص ١٣٦ .

٢ - نبيل ابراهيم الطيف ، وعصام خضير الحديثي ، مصدر سابق ، ص ٢١٠ .

٣- مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية المستدامة ، دليل السقي باستخدام المعطيات المناخية ، مصدر سابق ، ص ٨.

٤ - محمد ابراهيم حمادي ، مشاريع الري والبزل على نهري السبل والعطشان في محافظة المثنى ، رسالة ماجستير ، (غ . م) ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ٢٠٠٦ ، ص ١١٨

و٢,٠٧ لتر/ثا/هكتار)، حسب الترتيب . وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الرطوبة الجوية وانقطاع التساقط المطري مما يؤدي الى زيادة معدلات الاستهلاك المائي والضائعات المائية الحقلية وبالتالي تزداد الاحتياجات المائية لغرض تعويض كمية الماء اللازمة لإرواء المحاصيل الزراعية في المشروع. بينما تنخفض الاحتياجات المائية عند المنفذ الحقلي تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة بدءاً من شهر (أيلول وتشيرين الأول وتشيرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني وحتى شباط) إذ بلغت (١,١٦ و ١,٤٧ و ٠,٨٤ و ٠,٨٥ و ١,١٤ و ١,٨٢ لتر/ثا/هكتار) حسب الترتيب، ويرجع سبب ذلك الى انخفاض درجات الحرارة وتوفير الرطوبة والتساقط المطري مما يقلل من الاستهلاك المائي ومن ثم تقل الضائعات المائية وبالتالي تقل الاحتياجات المائية (المقنن المائي) عند المنفذ الحقلي.

جدول (٥٣) الاحتياجات المائية الكلية (ملم) للتركيب المحصولي المنتخب عند المنفذ الحقلّي وصدر القناة الرئيسية عند المنفذ الحقلّي في مشروع (حرية - دغارة)

المجموع	ك١	ت٢	ت١	البول	آب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	آذار	شباط	ك٢	الاشهر	
													النسبة %	المحاصيل
٢٦٢,٩٩	١٦,١١	١٩,٧٢	—	—	—	—	—	—	٧٧,٤٢	٨٣,٥٥	٤٣,٨٨	٢٢,٣١	٤٠	القمح
١٩٢,٥٨	٢٠,٥٤	١٣,٤٣	—	—	—	—	—	—	٥٩,٦٥	٥٩,٢٨	٣٢,٩	٦,٧٨	٣٠	الشعير
٤٧,٧٤	١,٣	١,٧٥	٣,٧٦	٥,٠٤	٦,٧٠	٧,٧٥	٦,٥٢	٤,٠٧	٤,٥٠	٣,٢٧	١,٨٤	١,٢٥	٢	الجت
٣٢,١٥	١,٠	١,١٢	٢,٠٣	—	—	—	—	—	٤,٣٤	٣,٢٠	١,٩٥	٠,٢٠	٢	البرسيم
٥٣٣,١٣	٣٥,٠	٣٩,٨	٧٨,٢٤	—	—	—	—	—	١٢٣,٦	١١٥,٦	٧٦,٣٦١	٦٣,٦٧	٠,٧٤	الباقلاء
٢١١,٥٦	١,٠	١,٢١	٢٢,٨٧	—	—	—	—	٣٩,٠٠	٥٠,٢٥	٤٢,٩٢	٢٢,٦٧	١١,٧٠	٠,٢٤	بصل يابس
٣٤٢,١٧	٢٠,٠	٢٤,٢	٤٢,٧٧	—	—	—	—	—	١٠٠,٥	٨٥,٨٥	٤٥,٣٤	٢٣,٤١	٠,٤٨	بصل اخضر
٢٨,٠٤	٢,٧	٢,٧٤	٦,٠٣	—	—	—	—	—	—	٧,٨١	٥,٣٧	٣,٣٣	٠,٠٥	طماطة
١١,٢	١,١	١,٠٩	٢,٤١	—	—	—	—	—	—	٣,١٢	٢,١٥	١,٣٣	٠,٠٢	خيار مغط
١٣,٣٣	٢,٠	٢,١٥	٣,٣٦	٣,٨٦	—	—	—	—	—	—	—	١,٩٢	٠,٠٣	خس
٢٨,٢٨	٣,٠	٣,٣٦	٥,٧٢	—	—	—	—	—	—	٦,٢٢	٥,٨٦	٤,٠٤	٠,٠٦	شلغم
٩,٤	١,٠	١,١٢	١,٩٠	—	—	—	—	—	—	٢,٠٧	١,٩٥	١,٣٤	٠,٠٢	شوننر
٢٠,٧٦	١,٤	١,٦١	٢,٩٨	—	—	—	—	—	٥,٠٢	٤,٦٨	٢,٥٨	٢,٥٨	٠,٠٣	سلق
٢٤,٢٣	٤,٧	٥,٠٣	٧,٨٥	٩,٠٢	—	—	—	—	—	—	—	٤,٥٠	٠,٠٧	سبيناغ
٣٨٢,١٣	٤١,٠	٤٥,٤	٧٧,٢٤	—	—	—	—	—	—	٨٤,٠٤	٧٩,١٦	٥٤,٦١	٠,٨١	فجل
٣٠,٣١١	٢٤,٠	٤٣,١	٦٧,٣٦	٧٧,٢	—	—	—	—	—	—	٥٢,٧٦	٣٧,٩٨	٠,٦٠	كرفس
٢٩٢,٢٣	٤١,٠٨	٤٣,١	٦٧,٣٦	٧٧,٣	—	—	—	—	—	—	٦٤,٢٤	٦٣,٣١	٠,٦٠	كراث
				٤	—	—	—	—	—	—	—	—	%	

المجموع	ك	ت	١	ايلول	آب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	آذار	شباط	٢	الاشهر	
													النسبة %	المحاصيل
٤٩,١٩	—	—	—	٥,٧٣	١٠,١٥	١٢,٨٢	١٠,١٦	٦,٣٥	٣,٩٨	—	—	—	٣	الثرة الصفراء
٥٠,٣	—	—	—	—	—	٨,٥٥	١٣,٩١	١٥,٢٣	٨,٢٩	٤,٣٢	—	—	٤	الثرة البيضاء
١٣,٧٨	—	—	—	١,٣٤	٢,٩٨	٤,٥١	٣,١٢	١,٧٦	—	—	—	—	١	السسم
٤٥,٣٧	—	—	—	—	٧,١٥	٧,١٢	١٣,٦٤	٩,٢٠	٥,١٤	٣,١٢	—	—	٣	الدخن
٥٠,٦	—	—	—	٥,٩٧	٧,٩٥	١٠,٤٥	٩,٨١	٧,٦٤	٥,١٣	٣,٦٥	—	—	٢	الجت
٣١٤,٧٣	—	—	—	٣٥,٨٥	٥٧,٢٤	٦٨,٤٠	٦٤,٢١	٤٥,٦٩	٣٠,٨٣	١٢,٥١	—	—	٠,١٢	القطن
١٢,٥٤	—	—	—	—	—	٢,٥٦	٤,٣٢	٢,٩٢	١,٧٤	١	—	—	١,٣٤	الماش
٤٩١,٨٤	—	—	—	—	٨١,٥٧	١٧٥,٠٩	١٤٤,٠٢	٩١,١٦	٥٣,٦٥	—	—	—	٠,٣٨	اللوبياء
٣١,٤٣	—	—	—	—	٤,٨٥	٩,٨٨	٨,٢٠	٥,٢٩	٣,٢١	—	—	—	٠,٠٢	الفلفل
٢٦,٤	—	—	—	—	٥,٥٦	٥,٩٧	٧,٤٠	٤,٦٥	٢,٨٢	—	—	—	٢	الرقى
٢٦,٤	—	—	—	—	٥,٥٦	٥,٩٧	٧,٤٠	٤,٦٥	٢,٨٢	—	—	—	٢	البطيخ
٦٥١,٨٤	—	—	—	—	١٠٣,٦	٢٢٢,٣١	١٨٤,٦٠	١١٩,٠٦	٧٢,٢٢	—	—	—	٠,٤٥	خيار الماء
٤٠٦,٦٦	—	—	—	—	٦٢,٢٥	١٢٣,٩٨	١٠٩,٩١	٦٩,٥٧	٤٠,٩٥	—	—	—	٠,٢٩	خيار القثاء
٢٤٢,٨١	—	—	—	١٧,٧٦	٣٩,٢٧	٥٩,٥٨	٥٤,٤٩	٣٥,٧٦	٢٢,٣٠	١٣,٥٥	—	—	٠,١٣	الطماطة
٣٣,٠٦	—	—	—	—	٤,٦٩	٩,٦٩	٨,٠٢	٥,٥١	٥,١٥	—	—	—	٠,٠٢	الشجر
٦١٥,٤	—	—	—	٤٥,٣٤	٩٩,٦٩	١٥٠,٤٨	١٣٨,٣٨	٩٠,٧٩	٥٦,٦٠	٣٤,١٢	—	—	٠,٣٣	الباميا
٣٠١,٥٩	—	—	—	٢٢,٨٥	٥١,٣٦	٧٤,٢٩	٦٨,٢٢	٣٨,٢٦	٢٨,٢٢	١٨,٣٩	—	—	٠,١٧	الباذنجان
٤٩,٣	٠,٩	١,٦٦	٣,٤	٤,٧٨	٦,٧٥	٨,١٦	٤,٤٧	٦,٥٦	٥,٤١	٣,٨٤	٢,٠	١,٢	٢	اليساتين
٦١٩٩,٩	٢٢٩,٤٤	٢١٩,٤٨	٣٩٥,٨٣	٣٠٢,٥٩	٥٥٧,٣٧	٩٥٨,٥٦	٨٦٠,٨	٦٠٣,١٢	٧٢٨,٨٢	٥٩٦,٥٤	٤٤١,٠٩	٣٠٥,٤٦	%١٠٠	مجموع الاحتياجات الشهرية (ملم)

٧,٤٠	٧,٣١	١٢,٧٦	١٠,٠٨	١٧,٩٧	٣٠,٩٢	٢٨,٦٩	١٩,٤٥	٢٤,٢٩	١٩,٢٤	١٥,٧٥	٩,٨٥	مجموع الاحتياجات المائية اليومية (ملم)
٠,٨٥	٠,٨٤	١,٤٧	١,١٦	٢,٠٧	٣,٥٧	٣,٣٢	٢,٢٥	٢,٨١	٢,٢٢	١,٨٢	١,١٤٠	المقنن المائي عند المنفذ الحقيقي (لتر/ثا/هكتار)
١,١١	١,٠٩	١,٩١	١,٥٠	٢,٦٨	٤,٦٣	٤,٣١	٢,٩٢	٣,٦٤	٢,٨٨	٢,٣٦	١,٤٨	المقنن المائي في صدر القناة الرئيسية (لتر/ثا/هكتار) وكفاءة نقل (٧٧)%
٠,٩٥	٠,٩٤	١,٦٤	١,٢٨	٢,٢٣	٣,٩٦	٣,٦٨	٢,٥	٣,١٢	٢,٤٦	٢,٠٢	١,٢٦	المقنن المائي في صدر القناة الرئيسية (لتر/ثا/هكتار) وكفاءة نقل (٩٠)%

المصدر: ١- من عمل الباحث اعتماداً على: (١) ملحق (٥). (٢) جدول (٥٢). (٣) تطبيق المعادلة الآتية: $CP = Ig \times Ci$ (٣) تطبيق معادلة الاحتياجات المائية اليومية: (٤) تطبيق معادلة المقنن المائي عند المنفذ الحقيقي. (٥) تطبيق معادلة المقنن المائي في صدر القناة الرئيسية.

٦- المقنن المائي في صدر القناة الرئيسية (المقنن المائي العام) (لتر/ثا/هكتار):

ويقصد به كمية المقنن المائي الحقلي أي الاحتياج المائي الأروائي زائداً ضائعات النقل التي تحصل أثناء نقل الماء من المصدر الرئيسي الى الحقل الزراعي^(١). ولأسخراج المقنن المائي لا بد من تحديد كفاءة النقل التي يقصد بها قياس كفاءة أنظمة النقل المائي في شبكة الجداول والقنوات الأروائية لغرض تحديد الفواقد المائية أثناء عملية النقل الى المزرعة وتقدر كفاءة النقل للمشروع (٧٧%) بالنسبة للقنوات الأروائية الترابية غير المبطنة و(٩٠%) بالنسبة للقنوات الأروائية المبطنة ، ويتم حساب المقنن المائي في صدر القناة الرئيسية وفق المعادلة الآتية^(٢):

المقنن المائي عند المنفذ الحقلي

$$\frac{\text{المقنن المائي في صدر القناة الرئيسية}}{\text{كفاءة النقل}} =$$

ووفقاً لتطبيق المعادلة أعلاه تشير النتائج وكما مبين في جدول (٥٣) حيث بلغ أعلى معدل للاحتياجات المائية في صدر القناة الرئيسية غير المبطنة (٤,٦٣ لتر/ثا/هكتار)، في شهر (تموز) وأقل قيمة لها بلغت (١,٠٩ لتر/ثا/هكتار) في شهر (تشرين الثاني) وكفاءة نقل (٧٧%). في حين يصل أعلى معدل للاحتياجات المائية في صدر القناة الرئيسية (المبطنة) الى (٣,٩٦ لتر/ثا/هكتار) ، في شهر (تموز) وأقل معدل بلغ (٠,٩٤ لتر/ثا/هكتار) في شهر (تشرين الثاني) وكفاءة نقل (٩٠%).

٧- كمية المياه المطلوبة من صدر القناة الرئيسية (م٣/ثا) و(مليون م٣):

يقصد بكمية المياه المطلوبة في صدر القناة الرئيسية هو الاحتياج المائي الكلي اللازم لغرض اتمام عملية أرواء المساحة الصافية للمشروع ، البالغة (٦٤٣٠٠٠) دونم^(٣). ويمكن حساب كمية المياه المطلوبة في صدر القناة الرئيسية من خلال العلاقتين الآتيتين^(٤).

مساحة المشروع (هكتار)

$$\frac{\text{العلاقة الاولى} = \text{المقنن المائي في صدر القناة لشهر معين} \times 1000}{4}$$

ووفقاً لتطبيق العلاقة الأولى تشير النتائج وكما مبين في جدول (٥٤) أن معدل كمية المياه المطلوبة في صدر القناة الرئيسية لغرض أرواء المساحة الصافية للمشروع يبلغ (٤٠,٢٢ م٣/ثا) وهذا المعدل يتراوح خلال أشهر السنة بين أقل وأعلى معدل في شهري (تشرين الثاني وتموز) إذ بلغ (١٧,٥٢ و ٧٢,٣٣ م٣/ثا) حسب الترتيب ، وكفاءة نقل (٧٧%). بينما في كفاءة النقل (٩٠%) بلغ معدل كمية المياه المطلوبة في صدر القناة الرئيسية

١- ابراهيم لطيف خليل وعصام خضير الحديثي ، مصدر سابق ، ص ١٦٢.

٢- رفاة مهنا محمد ، مشروع الخالص الأروائي ، مصدر سابق ، ص ١٣٨.

٣- جمهورية العراق ، الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح ، مصدر سابق ، ص ١

٤- زهراء مهدي صالح القره غولي ، مصدر سابق ، ص ١٦٤

(٣٣,٩١ م٣/ثا) ، ويتراوح هذا المعدل بين (١٥,١١ و ٦١,٨٨ م٣/ثا) لشهري (تشرين الثاني وتموز) حسب الترتيب.

$$٦٠ \times ٦٠ \times ٢٤ \times \text{عدد ايام الشهر}$$

$$\frac{\text{العلاقة الثانية كمية المياه لكل شهر (مليون م٣)} = \text{التصريف الشهري (م٣/ثا)} \times (١٠)^2$$

ووفقاً لتطبيق العلاقة الثانية تشير النتائج وكما مبين في جدول (٥٤) أن معدل كمية الاحتياجات المائية المطلوبة لغرض أرواء الأراضي الصافية المشروع تصل الى (٦,٤٣ مليون م٣)، وهذه الكمية تتراوح بين أقل وأعلى معدل (٢,٨٢ و ١٢,١٩ مليون م٣) لشهري (تشرين الثاني وتموز) وبكفاءة نقل (٧٧%). واما بكفاءة النقل (٩٠%) بلغ معدل الكمية المطلوبة (٥,٦٢ مليون م٣) ، وأيضاً يتراوح بين أقل وأعلى معدل (٢,٤٣ و ١٠,٣٠ مليون م٣) ، في شهري (تشرين الثاني وتموز) وحسب الترتيب . ويستنتج مما تقدم أن كمية الاحتياجات المائية المطلوبة في صدر القناة الرئيسية التي تم تحديدها من خلال تطبيق العلاقتين (الأولى والثانية) أنها تصبح أقل كمية إذا كانت كفاءة النقل (٩٠%) حيث بلغ فيها معدل الاحتياجات المائية المطلوبة (٣٣,٩١ م٣/ثا) بالنسبة للعلاقة الاولى و (٥,٦٢ مليون م٣) بالنسبة للعلاقة الثانية، وعليه يظهر لكفاءة النقل الاروائية دور كبير في تقليل الاحتياجات المائية المطلوبة إذ أنها تصبح أقل عند كفاءة نقل (٩٠%) بالنسبة لشبكات الري المبطنة وذلك لقلة الضائعات المائية أثناء النقل بسبب قلة الرش المائي وبالتالي إمكانية هذه القنوات على تلبية كمية المياه اللازمة لإرواء المحاصيل الزراعية . وعلى العكس من ذلك بالنسبة للقنوات غير المبطنة وذات كفاءة نقل (٧٧%) التي تزداد فيها الاحتياجات المائية لغرض أرواء أراضي المشروع وذلك لارتفاع الضائعات المائية بسبب الرش المائي الى باطن التربة.

جدول (٥٤) كمية المياه المطلوبة بالطريقتين (م/ثا و المليون م^٣) في صدر القناة الرئيسية لإرواء أراضي مشروع (حرية – دغارة)

المعدل	ك١	ت٢	ت١	أيلول	آب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	آذار	اشباط	ك٢	الاشهر / التفاصيل
٤٠,٢٢	١٧,٨٤	١٧,٥٢	٣٠,٧٠	٢٤,٤٣	٤١,٩٥	٧٢,٣٣	٦٧,١٩	٤٥,٤٩	٥٧,٧٠	٤٥,٨١	٣٧,٩٣	٢٣,٧٩	كمية المياه المطلوبة (م/ثا) بكفاءة نقل % (٧٧)
٦,٤٣	٢,٩٧	٢,٨٢	٥,١١	٣,٩٣	٦,٩٩	١٢,١٩	٩,٥٨	٧,٥٧	٩,٣٠	٧,٦٣	٥,٧٠	٣,٩٦	كمية المياه المطلوبة (مليون م ^٣) بكفاءة نقل % (٧٧)
٣٣,٩١	١٥,٢٧	١٥,١١	٢٦,٣٦	٢٠,٨٩	٣٥,٨٤	٦١,٨٨	٥٧,٣٨	٣٨,٩٠	٤٩,٣٥	٣٣,٢٢	٣٢,٤٧	٢٠,٢٥	كمية المياه المطلوبة (م/ثا) بكفاءة نقل % (٩٠)
٥,٦٢	٢,٥٤	٢,٤٣	٤,٣٩	٣,٣٦	٥,٩٧	١٠,٣١	٩,٢٥	٦,٤٨	٧,٩٥	٦,٥٣	٤,٨٨	٣,٣٧	كمية المياه المطلوبة (مليون م ^٣) بكفاءة نقل % (٩٠)

المصدر من عمل الباحث اعتمادا على : (١) جدول (٥٣)

مساحة المشروع (هكتار)

(٢) تطبيق معادلة : المقنن المائي في صدر القناة لشهر معين X _____ X ١٠٠٠

٢٠ X ٦٠ X ٢٤ X عدد ايام الشهر

(٣) تطبيق معادلة : حجم المياه الشهري = التصريف الشهري (م/ثا) X _____^١ (١٠)

٨- الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية (م٣/سنة):

تعد مسألة الاحتياجات المائية ضرورية ومهمة جداً في حياة الانسان وخدماته المنزلية ، كون الماء حاجة أساسية للإنسان واستخداماته ، ونتيجة لزيادة وتعدد هذه الاستخدامات التي تشمل مياه الشرب والطبخ والاستحمام والغسيل ووسائل التبريد وكذلك المياه المستهلكة في البناء...والخ. ولغرض تعويض المياه المستهلكة لهذه الاستخدامات فتزداد الاحتياجات المائية للسكان ، إذ أن الاحتياجات المائية تزداد مع زيادة عدد السكان وتطورهم الحضاري وارتفاع مستواهم المعاشي وتعدد استخداماتهم المنزلية. ويلحظ من خلال جدول (٥٥) أن هناك علاقة طردية بين الاحتياجات المائية وزيادة عدد السكان في المشروع ، إذ كلما زاد عدد السكان في المشروع تزداد حاجتهم للمياه . فعندما بلغ عددهم السكاني (٩٧٣٨٧ نسمة) عام ١٩٨٧ فكان مجموع احتياجاتهم المائية (٦٧٧٦٨٩٥ م٣/سنة)، وهذه الكمية المائية تقسم على سكان الحضر فبلغت حصتهم منها (٥١٠٢٤٠٨ م٣/سنة) والقسم الآخر لسكان الريف فبلغت حصتهم (١٦٧٤٤٨٧ م٣ / سنة) ثم ازدادت الاحتياجات المائية لسكان المشروع عندما بلغ عددهم (١١٩٣٦٥ نسمة) في عام ١٩٩٧ فبلغت الاحتياجات المائية لاستخداماتهم المنزلية (٩٨٨٤١٢٥ م٣ / سنة) ، منها (٦٧٠٣٨٨٢ م٣ / سنة) لسكان الحضر و (٣١٨٠٢٤٣ م٣/سنة) لسكان الريف. أما في عام (٢٠١٥) أزداد عدد سكان المشروع الى (٢٠٨٢٥٣ نسمة) وعليه أزدادت احتياجاتهم المائية الى (١٦٩٠٧٨٧٩ م٣/ سنة) ، منها (١٢٩٦٦٢٦٠ م٣/ سنة) لسكان الحضر و (٣٩٤١٦١٩ م٣/سنة) لسكان الريف. ومن المتوقع المستقبلي لحجم سكان المشروع يصل الى (٤٣٧٥٩٣ نسمة) في سنة ٢٠٢٥، وفي المقابل أن الاحتياجات المائية المستقبلية تزداد لتصل الى (٢٢٠١١٠٤٧ م٣/ سنة) ، ومنها (٩٦٦٩٤٧٦ م٣/سنة) لسكان الحضر و(١٢٣٤١٥٧١ م٣/سنة) لسكان الريف. ولغرض تأمين الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية في المستقبل لابد من وضع خطط تنموية تهدف الى الاستثمار الأمثل للمياه وذلك من خلال توعية وتنقيف سكان المشروع للعمل على ترشيد استخدام المياه في خدماتهم المنزلية لغرض تقليل الاستهلاك المائي ومن ثم تقليل الاحتياجات المائية في المستقبل بما يتناسب مع حجم الإيراد المائي للمشروع.

جدول (٥٥) الاحتياجات المائية (م^٣/سنة) للاستخدامات المنزلية في مشروع (حرية – دغارة) للأعوام ١٩٨٧ و ١٩٩٧ و ٢٠١٥ والمتوقع لسنة (٢٠٢٥)

الوحدة الإدارية	السكان حسب البيئة		الاحتياجات المائية م ^٣ /سنة لعام ١٩٨٧		الاحتياجات المائية م ^٣ /سنة لعام ١٩٩٧		الاحتياجات المائية م ^٣ /سنة لعام ٢٠١٥		الاحتياجات المائية م ^٣ /سنة لعام المتوقعة لسنة ٢٠٢٥	
	حضر	ريف	الحجم السكاني (نسمة)	الاحتياجات المائية م ^٣ /سنة	الحجم السكاني (نسمة)	الاحتياجات المائية م ^٣ /سنة	الحجم السكاني (نسمة)	الاحتياجات المائية م ^٣ /سنة	الحجم السكاني (نسمة)	الاحتياجات المائية م ^٣ /سنة
ناحية الدغارة	حضر	٦٤٦٦	٩٤٤٠٣٦	١٣٨٠٨٦٨	١٩٩٤٩	٢٩١٢٥٥٤	٢٦٨٧٣٧٣	٣٩٢٢٤٥٨	٢٦٨٧٣٧٣	٢٦٨٧٣٧٣
	ريف	١٨٣٧٩	٦٠٦٥٠٧	٢٥٤٧٠	٨٤٠٥١٠	٣٠٢٢٨	٩٩٧٥٢٤	٦٣٢١٧	٦٣٢١٧	٦٣٢١٧
م.ق. عك	حضر	١٥٥٢٦	٢٢٦٦٧٩٦	٢٠٢٤١	٢٩٥٥١٨٦	٣٤٥٣٠	٥٠٤١٣٨٠	٤١٥٢٩	٤١٥٢٩	٤١٥٢٩
	ريف	١٥٨٤٥	٥٢٢٨٨٥	٢٣٩٥٨	٧٩٠٦١٤	١٢٨٠٢	٤٢٢٤٦٦	٧٥٨١٣	٧٥٨١٣	٧٥٨١٣
ناحية نفر ^(١)	حضر	—	—	—	—	٤٠٩٧	٥٩٨١٦٢	٤٩٤٧	٤٩٤٧	٤٩٤٧
	ريف	—	—	—	—	١٨٩٠٩	٦٢٣٩٩٧	٢٣٦٨٣	٢٣٦٨٣	٢٣٦٨٣
ناحية ال بدير	حضر	٦٨٧٤	١٠٠٣٦٠٤	٩٠٤٣	١٣٢٠٢٧٨	١٩٢٩٢	٢٨١٦٦٣٢	١٩٠٦٧	١٩٠٦٧	١٩٠٦٧
	ريف	١٥٢٣٢	٥٠٢٦٥٦	٢٨٤١٣	٩٣٧٦٢٩	٢٩١٢٥	٩٦١١٢٥	١٦١٣٩٢	١٦١٣٩٢	١٦١٣٩٢
ناحية سومر	حضر	٦٠٨٢	٨٨٧٩٧٢	٧١٧٥	١٠٤٧٥٥٠	١٠٩٤٢	١٥٩٧٥٣٢	١١١٩٠	١١١٩٠	١١١٩٠
	ريف	١٢٩٨٣	٤٢٤٣٩	١٨٥٣٠	٦١١٤٩٠	٢٨٣٧٩	٩٣٦٥٠٧	٤٩٨٨٢	٤٩٨٨٢	٤٩٨٨٢
مجموع الحضر		٣٤٩٤٨	٥١٠٢٤٠٨	٤٥٩١٧	٦٧٠٣٨٨٢	٨٨٨١٠	١٢٩٦٦٢٦٠	٢٧٦٤١٠٦	٢٧٦٤١٠٦	٢٧٦٤١٠٦
		٦٢٤٣٩	١٦٧٤٤٨٧	٩٦٣٧١	٣١٨٠٢٤٣	١١٩٤٤٣	٣٩٤١٦١٩	٣٧٣٩٨٧	٣٧٣٩٨٧	٣٧٣٩٨٧
مجموع الكلي		٩٧٣٨٧	٦٧٧٦٨٩٥	١١٩٣٦	٩٨٨٤١٢٥	٢٠٨٢٥٣	١٦٩٠٧٨٧٩	٤٣٧٥٩٣	٤٣٧٥٩٣	٤٣٧٥٩٣

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على: جمهورية العراق ، هيئة التخطيط ، الجهاز المركزي للأحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لعام (١٩٨٧ و ١٩٩٧ و ٢٠١٥) لمحافظه القادسية، بيانات غير منشورة ، ٢٠١٦ .

(١) ناحية نفر لم تدخل ضمن تعدادي عام ١٩٨٧ و ١٩٩٧ لذا تم الاعتماد على تقديرات عام ٢٠١٢ و ٢٠١٥ في حساب التوقع المستقبلي لحجم سكانها.
 (٢) تم حساب التوقع المستقبلي لحجم السكان لسنة ٢٠٢٥ بالاعتماد على المعادلة الآتية : $P_n = P_0(r+1)^n$
 حيث أن: $P_n =$ عدد السكان في آخر تعداد و $P_0 =$ عدد السكان في آخر تعداد و $r =$ معدل النمو و $n =$ عدد السنوات بين آخر تعداد والسنة المستقبلية.

المصدر : عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، ج ١، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، ١٩٩٧ ، ص ٣٠٤.
 (٣) تم تقدير الاستهلاك المائي للسكان اعتماداً على الدراسات التي قدرت الحصص المائية للفرد والتي بلغت (١٤٦) م^٣/سنة للفرد الحضري و (٣٣) م^٣/سنة للفرد الريفي ، وعليه تم ضرب المائية لكل فرد سواء كانت للحضر أو الريف بحجم سكانهم .

المصدر: مدته عبد الله محسن الجبوري ، التشكيل المائي لنهر دجلة ما بين مصب الزبيرين في العراق (دراسة في الجغرافية الطبيعية)، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، ١٩٩٨ ، ص ١٥٩

٩- الاحتياجات المائية للثروة الحيوانية (م٣/سنة) :

تعد تربية الحيوانات أساساً مهماً في العملية الزراعية أن لم تكملها بشكل مباشر ، فهي جزء إضافي لها ، إذ لا يخلو أي مشروع أروائي من تربية الحيوانات ، إذ أنها تعتمد على مدى توفر الأراضي الزراعية والمراعي ومصادر المياه والأبدي العاملة وملائمة المناخ^(١). ونتيجة لتوفر هذه العوامل في المشروع فضلاً عن ان معظم سكانه هم زراعيون ويغلب عليهم الجانب الريفي الأمر الذي جعلهم يهتمون بالنشاط الحيواني الى جانب نشاطهم الزراعي وذلك لتكامل النشاط الاقتصادي ، إذ يعد النشاط الحيواني ثاني أهم الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها سكان المشروع بعد نشاطهم الزراعي . لذلك لابد من معرفة كمية المياه التي تستهلك من قبل تربية الحيوانات لغرض تحديد الاحتياجات المائية لها علماً أن كمية المياه التي تستهلك من قبل الرأس الواحد للأبقار تبلغ (٨ م٣/سنة) و(٨ م٣/سنة) للجاموس و (٢ م٣/سنة) للأغنام و(٢,٥ م٣/سنة) للماعز و(١١ م٣/سنة) للأبل. وكما مبين في جدول (٥٦) ونتيجة لتباين أعداد الحيوانات وأنواعها في المشروع ضمن وحداته الإدارية لذلك تتباين الاحتياجات المائية في المشروع ، حيث بلغ مجموع الاحتياجات المائية للحيوانات في المشروع (٧٣١٣٠١ م٣/سنة) ، إذ احتلت منها ناحية البدير المرتبة الأولى في احتياجاتها المائية والتي بلغت (٢٠٩٠٤٥,٥ م٣/سنة) وتليها بالمرتبة الثانية ناحية سومر لتصل احتياجاتها المائية الى (١٦٩٧٧٤ م٣/سنة) ثم تليها ناحية الدغارة بالمرتبة الثالثة في احتياجاتها المائية لتصل الى (١٤٤١٢٠,٢ م٣/سنة) ثم يليها مركز قضاء عفك في المرتبة الرابعة لتصل احتياجاته المائية الى (١٣٣٢٣١ م٣/سنة) ثم تليه ناحية نفر بالمرتبة الاخيرة في احتياجاتها المائية التي بلغت (٨٥٥٦٨ م٣/سنة) . ويرجع سبب ذلك الى صغر مساحتها وقلة عدد حيواناتها التي تربي فيها.

١ - صلاح حميد الجنابي وسعدي علي غالب ، جغرافية العرق الاقليمية ، جامعة الموصل ، الموصل ، ١٩٩٢ ، ص١٣٩

جدول (٥٦) الاحتياجات المائية م٣/سنة للثروة الحيوانية في مشروع (حرية - دغارة) لعام ٢٠١٥

الاحتياجات المائية م٣/سنة	معدل الاستهلاك المائي للرأس الواحد م٣/سنة	أعداد الحيوانات	نوع الحيوانات	الوحدة الادارية
٨٣٤٤٨	٨	١٠٤٣١	الأبقار	الدغارة
٣١٨٤	٨	٣٩٨	الجاموس	
٤٦٨٧٦	٢	٢٣٤٣٨	الأغنام	
١٠١٧٢,٥	٢,٥	٤٠٦٩	الماعز	
٤٤٠	١١	٤٠	الأبل	
١٤٤١٢٠,٥		٣٨٣٧٦		المجموع
٥٦١٣٦	٨	٧٠١٧	الأبقار	م.ق.عفك
٩٣٢٨	٨	١١٦٦	الجاموس	
٤٩٤١٠	٢	٢٤٧٠٥	الأغنام	
١٤٢٦٥	٢,٥	٥٧٠٦	الماعز	
٤٠٩٢	١١	٣٧٢	الأبل	
١٣٣٢٣١		٣٨٩٦٦		المجموع
٣٢٨٢٤	٨	٤١٠٣	الأبقار	نفر
١١٦٨	٨	١٤٦	الجاموس	
٥٢٩٢	٢	٢٦٤٦	الأغنام	
٢٥١١٠	٢,٥	١٠٠٤٤	الماعز	
١٠٧٣٦	١١	٩٧٦	الأبل	
٧٥١٣٠		١٧٩١٥		المجموع
٨٥٥٦٨	٨	١٠٦٩٦	الأبقار	ال بدير
٤٤٠	٨	٥٥	الجاموس	
٩٣٨٤٦	٢	٤٦٩٢٣	الأغنام	
٢٢٧١٢,٥	٢,٥	٩٠٨٥	الماعز	
٦٤٧٩	١١	٥٨٩	الأبل	
٢٠٩٠٤٥,٥		٦٧٣٤٨		المجموع
٦٦٢٤٨	٨	٨٢٨١	الأبقار	سومر
٢٣٢٠	٨	٢٩٠	الجاموس	
٧٣٩٢٦	٢	٣٦٩٦٣	الأغنام	
٢٧٢٨٠	٢,٥	١٠٩١٢	الماعز	
—	—	—	الأبل	
١٦٩٧٧٤		٥٦٤٤٦		المجموع
٧٣١٣٠١		٢١٩٠٥١		المجموع الكلي

المصدر: (١) جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية الزراعة في محافظة القادسية ، غرفة عمليات الترقيم ، بيانات غير منشورة ، ٢٠١٥. (٢) مهدي الصحاف ، الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٦ ، ص١٥٥.

ثالثاً - كفاءة الري في المشروع :

يعد الاستخدام الأمثل للموارد المائية السطحية من الأمور المهمة خاصة في المناطق الجافة والشبه الجافة التي تعاني من شحة المياه ، فزيادة كفاءة الري أثناء نقل وتوزيع الماء الى المحاصيل الزراعية يؤدي الى

التخفيض من كلفة العمليات الزراعية^(١). إذ تعتمد كفاءة ري أي مشروع أروائي على عدة عوامل منها نظام توزيع المياه وجدولتها وطبيعة القنوات الاروائية (مبطنة او غير مبطنة) ودرجة تحضير التربة وتسويتها وخصائصها وتوفير المياه ونوع المحصول والمناخ. والهدف من تقدير كفاءة الري لأي مشروع أروائي هو توضيح أين يمكن عمل تحسينات ترمي الى زيادة فاعلية نظام توزيع مياه الري وكفائتها لغرض تقليل الهدر المائي واستثمار الفائض في توسيع الرقعة الزراعية في المشروع.^(١) ويمكن تعريف كفاءة الري بأنها نسبة الماء المستهلك من قبل المحاصيل الزراعية الى كمية المياه المنقولة من مصدر المائي الى الحقل الزراعي وهذه النسبة منخفضة في الري السطحي وغالباً ما تكون في حدود (٤٠ - ٦٠) % نتيجة لارتفاع نسبة الضائعات المائية التي ترافق هذا الأسلوب . وتم حساب كفاءة الري في المشروع من خلال تطبيق المعادلة الآتية^(٢).

$$\text{كفاءة الري} = \frac{\text{المياه الكلية المستخدمة} - \text{الضائعات المائية}}{100 \times \text{المياه الكلية المستخدمة}}$$

ووفقاً لتطبيق المعادلة أعلاه تم حساب كفاءة الري في المشروع وكما مبين في جدول (٥٧) واعتماداً على كمية المياه المستخدمة والبالغة (٥٢٥٤٦٠٠٦٢٩ م^٣) التي تدخل بضمنها كمية الاستهلاك المائي للمحاصيل الشتوية والصيفية والمعمرة التي بلغت (٨٦٤٤٧٦٩٧٠٩ و ٢٥٧٨٩٤٩٢٧٨ و ٨٦٤٥٥٠٨٨٦٤ م^٣) حسب الترتيب . وكذلك بضمنها كمية الاستهلاك المائي لمتطلبات الغسل والبالغة (٩٧٨٤٧٦٧٦٤,٥ و ١٩٥٠٧٨٢٢٦٩ و ٣٢٠٧٧٩٦٣٠,٨ م^٣) لنفس المحاصيل حسب الترتيب . وكذلك أيضاً بضمنها كمية الاستهلاك المائي لتربية الحيوانات التي تصل الى (٧٣١٣٠١ م^٣) وكذلك كمية الاستهلاك المائي للاستخدامات المنزلية التي بلغت (١٦٩٠٧٨٧٩ م^٣) . وعندما تم حساب الضائعات المائية للمحاصيل الزراعية الشتوية البالغة (١٥٧٥٣٩٨٠١٩ م^٣) وصلت كفاءة ري المشروع الى (٧٠,٠١ %) خلال الموسم الشتوي ، بسبب شحة الموارد المائية وزيادة المساحة المزروعة فضلاً عن زيادة الضائعات المائية في المشروع .اما في الموسم الصيفي بلغت الضائعات المائية للمحاصيل الصيفية (١٣١٠٤٤٤٤٨١ م^٣) وكفاءة أروائية بلغت (٧٥,٠٦ %) ، وأن ارتفاع الكفاءة خلال هذا الموسم لا يعني تحسن الكفاءة الاروائية وانما بسبب تقلص المساحة المزروعة في المشروع خلال هذا الموسم نتيجة لشحة الموارد المائية فضلاً عن زيادة معدلات التصريف المائي لمحطتي مؤخر (شط الدغارة وجدول الحرية الرئيسي) لغرض تلبية الاحتياجات المائية للمشروع. اما بالنسبة للأشجار المعمرة (النخيل) فبلغت ضائعاتها المائية (١١٨٢٤١٠٩٢٦ م^٣) وبلغت الكفاءة الاروائية للمشروع (٧٧,٤٩ %) على مدار أشهر السنة. اما بالنسبة لضائعات التبخر في المشروع البالغة (١٢٩٠٣٧٠٩,١ م^٣) كانت الكفاءة الاروائية (٩٩,٧٥ %).

١ - محمد شطاوي وآخرون ، نماذج تقدير الاستهلاك المائي للمحاصيل الزراعية في الأردن، نشرة فنية متخصصة رقم ٢١ مركز البحوث والدراسات المائية والبيئية ، الجامعة الأردنية ، ١٩٩٨ ، ص ٨٧
 ١ - نبيل ابراهيم الطيف وعصام خضير الحديثي ، مصدر سابق ، ص ١٥٥
 ٢ - عماد راتب كتاب ، اثر المناخ في كفاءة ري مشروع الجربوعية في محافظة بابل ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة القادسية، ٢٠١٦ ، ص ١٥٩.

جدول (٥٧) حساب كفاءة الري في مشروع (حربة - دغارة) لعام ٢٠١٥

كفاءة الري (%)	الضائعات المائية (م٣) التفاصيل	مجموع الاستهلاك المائي (م٣)	الاستهلاك المائي للثروة الحيوانية (م٣/سنة)	لاستهلاك المائي للاستخدامات المنزلية (م٣/سنة)	الاستهلاك المائي لمتطلبات الغسل (م٣)	الاستهلاك المائي للمحاصيل (م٣)	المحاصيل
٧٠,٠١	الحقلية والنقل	٥٢٥٤٦٠,٦٢٩	٧٣١٣٠,١	١٦٩,٧٨٧٩	٩٧٨٤٦٦٦٤,٥	٨٦٤٤٦٦٩٧,٠٩	الشتوية
٧٥,٠٦	الحقلية والنقل				١٩٥,٧٨٢٢٦٩	٢٥٧٨٩٤٩٢٧٨	الصفيفية
٧٧,٤٩	الحقلية والنقل				٣٢,٧٧٩٦٣,٨	٨٦٤٥٥,٨٨٦٤	المعمرة
٩٩,٧٥	التبخر	٥٢٥٤٦٠,٦٢٩	٧٣١٣٠,١	١٦٩,٧٨٧٩	٣٢٥,٠٣٨٦٦٤	١٩٨٦٩٢٢٧٨٥	المجموع

المصدر : من عمل الباحث على : (١) جدول (٤٧ و ٤٩ و ٥٠ و ٥٥ و ٥٦). (٢) ملحق (٧)

المياه الكلية المستخدمة - الضائعات المائية

$$100 \times \frac{\text{المياه الكلية المستخدمة}}{\text{تطبيق معادلة كفاءة الري}} =$$

رابعاً - الموازنة المائية الاجمالية بين الإيراد المائي الكلي والاحتياجات المائية الكلية للمشروع لعام ٢٠١٥ :

من الضروري جداً لابد من إجراء موازنة مائية أجمالية بين الإيراد المائي الكلي وبين الاحتياجات المائية الكلية للمشروع ، لغرض معرفة مدى التوازن الهيدروليكي مع الاحتياجات المائية المختلفة ومن ثم تحديد الفائض او العجز المائي في المشروع ووضع خطط لازمة تهدف الى الاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة في المشروع لغرض تأمين الاحتياجات المائية الكلية اللازمة له . وقد تم حساب الموازنة المائية الاجمالية للمشروع من خلال المقارنة بين كمية المياه الكلية المستخدمة وبين كمية الإيراد المائي الكلي وكما يلاحظ في جدول (٥٨) وأظهرت الموازنة المائية أن المشروع يشهد عجزاً مائياً بلغ مجموعه' (٨٠٢٩٦٧٥١٧٧-٣م) ما يعادل (٨,٠٢٩٦ مليار ٣م) نتيجة للفارق بين مجموع الاحتياجات المائية الكلية البالغة (٨٠٣٠٥٠٥٧٦٢ ٣م) والتي تعادل (٨,٠٣٠٥ مليار ٣م) وبين مجموع الإيراد المائي الكلي البالغ (١٦٦١٦,٨٣ ٣م) أي ما يعادل (٠,٠٠٠١ مليار ٣م) . أما على مستوى نوع الاحتياجات المائية فقد أظهرت الموازنة المائية من خلال المقارنة بين مجموع الاستهلاك المائي للمحاصيل الشتوية والصيفية والمعمرة البالغ (١٩٨٦٩٢٢٧٨٥ ٣م) أي ما يعادل (١,٩٨٦٩ مليار ٣م) ونسبة تبلغ (٢٤%) ، وبين مجموع الإيراد المائي الكلي فظهر عجز مائي بلغ (١٩٨٦٧٥٦٦٦٨-٣م) ما يعادل (١,٩٨٦٧ مليار ٣م). اما مجموع الاحتياجات المائية لمتطلبات الغسل ولنفس المحاصيل السابقة وبالغلة (٣٢٥٠٠٣٨٦٦٤ ٣م) ما يعادل (٣,٢٥٠٠ مليار ٣م) ونسبة (٤٠,٤%) ومن خلال الفرق بينها وبين مجموع الإيراد المائي الكلي ظهر عجز مائي بلغ (٣٢٤٩٨٧٢٥٤٧-٣م) ما يعادل (٣,٢٤٩٨ مليار ٣م). اما الاحتياجات المائية الكلية لري المحاصيل السابقة ، بلغت (٢٧٧٥٩٠٥١٣٣ ٣م) أي ما يعادل (٢,٧٧٥٩ مليار ٣م) ونسبة (٣٤,٥%) ، ومن خلال مقارنتها بمجموع الإيراد المائي الكلي ظهر عجز مائي بلغ (٢٧٧٥٧٣٩٠١٦-٣م) ما يعادل (٢,٧٧٥٧ مليار ٣م) . اما الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية التي تبلغ (١٦٩٠٧٨٧٩ ٣م) أي ما يعادل (٠,٠١٦٩ مليار ٣م) ونسبة تبلغ (٠,٢%) ، وعند المقارنة بمجموع الإيراد المائي الكلي بلغ مقدار العجز المائي (١٦٧٤١٧٦٢,١٧-٣م) ما يعادل (٠,٠٠١٦ مليار ٣م). وأما الاحتياجات المائية لتربية الحيوانات والتي بلغت (٧٣١٣٠١ ٣م) أي ما يعادل (٠,٠٠٠٧ مليار ٣م) ونسبة (٠,٩%) وعند المقارنة بينها وبين مجموع الإيراد المائي الكلي للمشروع ظهر عجز مائي بلغ (٥٦٥١٨٤,١٧-٣م) ما يعادل (٠,٠٠٠٥ مليار ٣م). ويتضح مما تقدم أن المشروع يعاني من عجز مائي كبير نتيجةً لزيادة الضائعات المائية والاستغلال غير الأمثل للموارد المائية المتاحة فيه فضلاً عن النقصان المائي للمشروع بسبب الشحة المائية لأنهار العراق الرئيسية ولاسيما نهر الفرات الذي يعد الممول الرئيسي للمشروع. الأمر الذي جعل عجزاً مائياً كبيراً في المشروع مما انعكس على قلة كفاءة الري في تلبية الاحتياجات المائية الإجمالية للمشروع وبالتالي أدى الى تدني مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني . فضلاً عن ترك بعض أراضي المشروع وتصحرها بسبب عدم إروائها. وعليه لابد من التوجه الى التخطيط الملائم للاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة في المشروع عن طريق ترشيد الاستهلاك المائي وتقليل الضائعات المائية من خلال اتباع تقانات الري الحديثة فضلاً عن اتباع جدولة الري لغرض تنظيم توزيع المياه على مستوى المشروع بحسب حاجة المحاصيل الزراعية المعتمدة عليه ، وكما سيتم توضيح ذلك في الفصل الرابع . وجل هذه الأمور تهدف الى التقليل من الهدر المائي في المشروع واستثماره في اتساع المساحة الزراعية وزيادة الأنتاج الزراعي وبالتالي تحسن الإنتاج الاقتصادي لسكان المشروع ومن ثم اقتصاد الدولة.

جدول (٥٨) حساب الموازنة المائية الاجمالية بين مجموع الايراد المائي الكلي (٣م) وبين الاحتياجات المائية الكلية (٣م) لمشروع (حرية - دغارة)

نوع الاحتياجات المائية	مقدار الاحتياجات المائية		النسبة المئوية %	مجموع الإيراد المائي		مقدار الفائض او العجز المائي
	مليار م ٣	(٣م)		مليار م ٣	(٣م)	
الاحتياجات المائية للأستهلاك المائي للمحاصيل الشتوية والصبيفية والمعمرة	١,٩٨٦٩	١٩٨٦٩٢٢٧٨٥	٢٤	١٢٦١١٦,٨٣	-١٩٨٦٧٥٢٦٦٨	١,٩٨٦٧
الاحتياجات المائية لمتطلبات الغسل للمحاصيل الشتوية والصبيفية والمعمرة	٣,٢٥٠٠	٣٢٥٠٠٣٨٦٦٤	٤٠,٤		-٣٢٤٩٨٨٧٢٥٤٧	٣,٢٤٩٨
الاحتياجات المائية الكلية لري المحاصيل الشتوية والصبيفية والمعمرة	٢,٧٧٥٩	٢٧٧٥٩٠٥١٣٣	٣٤,٥		-٢٧٧٥٧٣٩٠١٦	٢,٧٧٥٧
الاحتياجات المائية للأستخدامات المنزلية	٠,٠١٦٩	١٦٩٠٧٨٧٩	٠,٢		-١٦٧٤١٧٦٢,١٧	٠,٠٠١٦
الاحتياجات المائية لتربية الحيوانات	٠,٠٠٠٧	٧٣١٣٠١	٠,٩		-٥٦٥١٨٤,١٧	٠,٠٠٠٥
مجموع الاحتياجات المائية الأجمالية للمشروع	٨,٣٠٥	٨٠٣٠٥٠٥٧٦٢	%١٠٠	١٢٦١١٦,٨٣	-٨٠٢٩٦٧٥١٧٧	٨,٢٩٦

المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول (٤٧) و (٤٩) و (٥٢) و (٥٦) وملحق (٨).

- ١- استنتج البحث ان الأحتياجات المائية لمشروع (حرية - دغارة) تتباين مكانياً وزمانياً ويعزى ذلك الى التباين في الخصائص الجغرافية (الطبيعية والبشرية) التي يتصف بها المشروع .
- ٢- اظهر البحث ان الأحتياجات المائية الصافية للمحاصيل الشتوية اقل من المحاصيل الصيفية ، وذلك بسبب زيادة الأستهلاك المائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر وقلة الرطوبة في فصل الصيف .
- ٣- من خلال نتائج البحث بلغ معدل الاحتياجات المائية المطلوبة في صدر القناة الرئيسية واللازمة لإرواء المساحة الصافية للمشروع البالغة (٦٤٣٠٠٠) دونم هو (٤٠,٢٢) م^٣/ثا عند كفاءة نقل (٧٧%) واما في كفاءة نقل (٩٠%) بلغ معدل الاحتياجات المائية المطلوبة هو (٣٣,٩١) م^٣/ثا.
- ٤- بين البحث ان مجموع الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية لسنة (٢٠١٥) بلغت (١٦٩٠٧٨٧٩) م^٣/سنة وبسبب استخدامهم المفرط للمياه ادى الى زيادة الاستهلاك المائي ومن ثم زيادة الأحتياجات المائية.
- ٥- بين البحث ان عدد كبير من الحيوانات التي تربي في المشروع والمتمثلة بالأبقار والجاموس والأغنام والماعز والأبل ، فكان لها اثر في زيادة الاستهلاك المائي في المشروع .
- ٦- بين البحث ان الكفاءة الاروائية في المشروع متباينة زمانياً ، وايضاً منخفضة بسبب الشحة المائية وزيادة الضائعات المائية نتيجة طرائق الري التقليدية التي تزيد من الهدر المائي ، وبالتالي ازدادت الاحتياجات المائية لغرض سد النقصان المائي في المشروع .
- ٧- توصل البحث الى اجراء موازنة مائية أجمالية بين الإيرادات المائية الكلية وبين الاحتياجات المائية الكلية للمشروع ، وأظهرت تلك الموازنة عجزاً مائياً كبيراً في المشروع الذي بلغ مجموعه ' (٨٠٢٩٦٧٥١٧٧) - م^٣ المقترحات :
- ١- فتح دورات وندوات علمية مكثفة من قبل المختصين بدراسات الموارد المائية وامكانية تنميتها ، وادخال الفلاح فيها لغرض تطويره وتوعيته من خلال ترشيد الأستهلاك المائي واستعماله لتقانات الري الحديثة (طرائق الري بالرش والتنقيط) التي تتحكم بتقنين المياه وحثه للأخذ والعمل بها.
- ٢- تزويد دوائر الري في المشروع بالبحوث والدراسات المائية ولاسيما المختصة بموضوع الاستهلاك المائي والاحتياجات المائية لغرض ان يضطلعوا على الاحتياج المائي لكل محصول ومن ثم اختيار المحاصيل التي تتناسب احتياجاتها المائية مع كمية المياه المتاحة في المشروع .
- ٣- العمل على استعمال الري المغلق واستكمال تبطين الجداول الأروائية في المشروع لغرض الحد من حجم الضائعات المائية بسبب التسرب والرشح المائي الى جوف الارض .
- ٤- ينبغي على الجهات المعنية بتجهيز المشروع بالمياه حسب احتياجاته المائية اللازمة لأرواء مساحته الصافية فضلاً عن اختيار نوع المحاصيل التي يمكن للمشروع تلبية احتياجاتها المائية .
- ٥- تكثيف استعمال البيوت الأبلستيكية لزراعة المحاصيل في المشروع كونها تساعد على تقليل حجم الضائعات المائية وبالتالي تقلل من الأستهلاك المائي للمحاصيل الزراعية.
- ٦- استخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي والزراعي في عملية الري بعد معالجتها لغرض تعويض النقصان في كمية الموارد المائية السطحية المتاحة في المشروع .

قائمة المصادر:

اولاً: الكتب

- ١- صلاح حميد الجنابي وسعدي علي غالب ، جغرافية العرق الاقليمية ، جامعة الموصل ، الموصل ، ١٩٩٢
 - ٢- عباس فاضل السعدي، جغرافية السكان، ج ١، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، ١٩٩٧ .
 - ٣- عصام خضير الحديثي واحمد مدلول الكبيسي وياس خضير الحديثي ، تقانات الري الحديثة ومواضيع اخرى في المسألة المائية ، ط ١ ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الأنبار ، كلية الزراعة ، ٢٠١٠ .
 - ٤- مهدي الصحاف ، الموارد المائية في العراق وصيانتها من التلوث ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٦
 - ٥- نبيل ابراهيم الطيف ، الري اساسياته وتطبيقاته، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، ١٩٨٨ .
ثانياً - الرسائل والأطاريح الجامعية :
١- رباب ابراهيم محمود العوادي ، اثر التصارييف(الواطئة والعالية) لمنظومة شط الحلة في كفاية المقنن المائي الحقل للمحاصيل الزراعية للمدة من (٢٠٠٠ - ٢٠٠٩) رسالة ماجستير (غ.م) ، كلية التربية للعلوم الانسانية جامعة بابل ، ٢٠١٢
 - ٢- رفاه مهنا محمد ، مشروع الخالص الأروائي - دراسة في جغرافية الموارد المائية ، رسالة ماجستير ، (غ - م) ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ٢٠٠٦
 - ٣- زهراء مهدي صالح القره غولي ، مشروع التريمة الأروائي في محافظة القادسية ، رسالة ماجستير ، (غ - م) ، كلية الآداب ، جامعة القادسية ، ٢٠١٥ .
 - ٤- عماد راتب كتاب ، اثر المناخ في كفاءة ري مشروع الجربوعية في محافظة بابل ، رسالة ماجستير، كلية الآداب ، جامعة القادسية، ٢٠١٦
 - ٥- مدالله عبد الله محسن الجبوري ،التشكيل المائي لنهر دجلة مابين مصب الزابين في العراق (دراسة في الجغرافية الطبيعية)، طروحة دكتوراه (غ.م) ، كلية التربية ،جامعة الموصل ، ١٩٩٨ .
 - ٦- محمد ابراهيم حمادي ، مشاريع الري واليزل على نهري السبل والعطشان في محافظة المثنى ، رسالة ماجستير ، (غ - م)، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ٢٠٠٦ .
 - ٧- محمد جعفر السامرائي ، مشاريع الري واليزل الحديثة في محافظات ميسان وذي قار والبصرة، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ١٩٩٩
- ثالثاً - التقارير :
- ١- مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية المستدامة ، دليل السقي باعتماد المعطيات المناخية ، المملكة المغربية جهة سوس ماسة درعة ، التكنولوجيا الزراعية ، بلا تاريخ.
 - ٢- محمد شطاوي وغازي النبقشندي وعبد النبي فردوس ومحمد زهدي شعبان وميشيل راهبة ، نماذج تقدير الاستهلاك المائي للمحاصيل الزراعية في الأردن، نشرة فنية متخصصة رقم ٢١ مركز البحوث والدراسات المائية والبيئية ، الجامعة الأردنية ، ١٩٩٨ .
 - ٣- جمهورية العراق ، الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، تقرير عن استصلاح اراضي مشروع(حرية - دغارة) في محافظة القادسية ، ٢٠١٤
- رابعاً- المطبوعات الحكومية :
- ١- جمهورية العراق ، هيئة التخطيط ، الجهاز المركز للاحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة ١٩٨٧ و ١٩٩٧ لمحافظة القادسية، بيانات غير منشورة.
 - ٢- جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية الزراعة في محافظة القادسية ، غرفة عمليات الترقيم ،بيانات غير منشورة ، ٢٠١٥
- ١- جمهورية العراق ،وزارة البلديات والاشغال العامة ،مديرية التخطيط العمراني في محافظة القادسية .بمقياس 1:500000، 2012