

تأثير مخصبات نانو الحديد والزنك المخلبية وطريقة الاضافة والسماذ العضوي Drin في محتوى الأوراق من
المادة الفعالة لنبات الديباج *Calotropis procera*(Ait.) R.Br

سعدية مهدي كاظم
طالبة دكتوراه

عبد الأمير علي ياسين
جامعة القادسية/كلية التربية
Yaseenali52@yahoo.com

الخلاصة:

نُفذت تجربة أصص في أحد المشاتل التابعة لمدينة القاسم أثناء موسم النمو 2016–2017، باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثلاث مكررات لمعرفة تأثير سبعة تراكيز من مخصبات نانو الحديد والزنك المخلبية وبطريقتي اضافة الرش الورقي شمل (0 و1^{حديد} و2^{حديد} و1^{زنك} و2^{زنك} و1^{حديد}+1^{زنك} و2^{حديد}+2^{زنك}) غم.لتر⁻¹ والاضافة مع مياه الري (0 و80^{حديد} و160^{حديد} و80^{زنك} و160^{زنك} و80^{حديد}+80^{زنك} و160^{حديد}+160^{زنك}) ملغم.لتر⁻¹ وتركيزان من السماذ العضوي Drin (0 و5) مل. لتر⁻¹ في محتوى أوراق نبات الديباج من المادة الفعالة. أظهرت النتائج ان استعمال نانو الزنك بالتركيز الموصى سجل اعلى زيادة معنوية في النسبة المئوية للـ Sterols مقابل اعلى محتوى من α -tocopherol عند التركيز ضعف الموصى من نانو الزنك. التركيز الموصى من نانو (حديد+زنك) تفوق في محتوى الأوراق من Calotropin مقابل اعلى محتوى من Amyrin عند التركيز ضعف الموصى من نانو (الحديد+زنك). واستعمال طريقة الرش الورقي سجلت أعلى زيادة معنوية في محتوى الاوراق من Sterols و α -tocopherol مقابل اعلى محتوى من Amyrin و Calotropin سجل عند طريقة التسميد مع مياه الري. استعمال التركيز 5مل.لتر⁻¹ من السماذ العضوي اثر معنويا في جميع الصفات المدروسة عدا المادة الفعالة α -tocopherol . وأن التداخلات بين العوامل المذكورة أعطت غالبيتها النتائج ذاتها.

كلمات مفتاحية: نانو الحديد والزنك، طريقة اضافة ، ديباج

* بحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني.

EFFECT OF Nano – Iron and Zinc chelated fertilizers, Method of Addition and Organic fertilizer (Drin) on leaves content from Active ingredient of *Calotropis procera* (Ait.) R.Br

Yaseen, A. A

AL-Qadisiyah University / College of Education

Yaseenali52@yahoo.com

Kadum,S.M.

PhD student

ABSTRACT:

A pot culture experiment was conducted in Al-Qasim city during the spring season of 2016-2017. The design of the experiment was Randomized Complete Blocks (RCBD) in a factorial arrangement with three replicate to study the effect of seven concentrations of nano iron and nano zinc fertilizer in two addition methods [by using a hand sprayer or with irrigation water (fertigation)] with the recommended and doubled concentrations for them as foliar spraying were (0 ,1^{Fe}, 2^{Fe},1^{Zn}, 2^{Zn}, 1^{Fe} +1^{Zn} and 2^{Fe}+2^{Zn}) g.L⁻¹ and fertigation (0 ,80^{Fe}, 160^{Fe},80^{Zn}, 160^{Zn}, 80^{Fe} +80^{Zn} and 160^{Fe} +160^{Zn}) mg.L⁻¹. The third factor included two concentrations of organic fertilizer Drin foliar fertilizer (0.0 and 5) ml. L⁻¹ on the leaves content of active ingredient of *Calotropis procera*. Means were compared by using Least Significant Difference (LSD) test at 0.05 probability level. The results showed a significant differences when the plants treated with nano-iron at the recommended concentrations recording the highest significant effect in rates of sterols while the doubled concentrations of nano zinc recorded the highest α -tocopherol, and using both (Fe+Zn) in the recommended concentration was superior with Calotropincontent. Foliar application of nano fertilizer was succeeded in significantly increasing sterols and Calotropinwhile the highest content of the Amyrin and α -tocopherol was recorded by fertigation methods. The use of organic fertilizer by the concentration of

5ml. L⁻¹ significant affected all studied traits except α -tocopherol. And the interaction between the factors gave the same result.

Key words :nano iron and zinc, application method, *Calotropis procera*

* part of Ph.D. dissertation of the second author.

المقدمة Introduction

الديباج [*Calotropis procera* (Ait.) R.Br] نبات شجيري معمر دائم الخضرة يعود إلى العائلة العشارية Asclepiadaceae⁽¹⁾. ويتراوح ارتفاع النبات ما بين (2 – 5) م، وتعد المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية في أفريقيا وآسيا الموطن الأصلي له ومنها إنتشر إلى المناطق المعتدلة من شمال وجنوب شرق آسيا⁽²⁾. ينمو في جميع أنواع الترب وخاصةً في التربة الرملية القاعدية فضلاً عن تحمله لمدى واسع من الملوحة والجفاف مما يفسر سبب إنتشاره في المناطق القاحلة وشبه القاحلة كمجمعات نباتية تقتصر عليه فقط لإحتوائه على مواد كلايكوسيدية مثبطة لنمو النباتات الأخرى⁽³⁾. والديباج واحداً من النباتات السامة لإحتوائه على العديد من المركبات السامة والمميتة للإنسان والحيوان على حدٍ سواء، وهذه السمية العالية للنبات تأتي من إحتوائه على مركبات الكاردينوليد Cardenolide؛ إذ تعمل بدورها على تثبيط مضخة الصوديوم - بوتاسيوم (Na⁺-K⁺ ATPase) في أغشية الخلايا والمسؤولة عن إنتاج الطاقة اللازمة لتبادل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم عبر تلك الأغشية⁽⁴⁾، وان عضلات القلب تعد الهدف الرئيس لهذه المركبات التي تتركز أكثر في العصارة اللبنة⁽⁵⁾.

وضع هذا النبات في قائمة النباتات التي تعتبر مصدراً مهماً لإنتاج مركبات العقاقير الصيدلانية لإحتوائه على العديد من المواد الفعالة حيويًا مثل مركبات الكاردينوليدات والراتنج Resins والكلايكوسيدات Glycosides والفينولات Phenoles والتربينات الثلاثية triterpenoids والسكريات والفلافونيات Flavonoids والقلويدات Alkaloids والصابونيات Saponins وإنزيمات التحلل البروتيني Proteolytic enzymes⁽⁶⁾ و⁽⁷⁾ وله أهمية إقتصادية تأتي من إستعماله في إنتاج أنواع الوقود الحيوي السائل في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ومن النباتات الواعدة لمكافحة التلوث⁽⁶⁾.

إن الإهتمام الكبير بالنباتات الطبية في التداوي والعلاج يكمن في كونها سهلة التداول وأمينة الإستعمال إلى حدٍ ما، إضافةً إلى أن المادة الدوائية المُصنَّعة مختبرياً قد لا تؤدي التأثير الفسلجي ذاته الذي تؤديه المادة الفعالة المستخلصة من مصادرها النباتية الطبيعية⁽³⁾ و⁽⁸⁾. لذا إتجهت الأنظار نحو إستعمال المواد الفعالة للنباتات في العلاج أو الوقاية من الأمراض بدلاً عن الأدوية الكيميائية المُصنَّعة⁽⁵⁾ و⁽⁹⁾. لذلك أصبح من الضروري دراسة المكونات الفعالة طبيياً لكل نبات

على انفراد وإيجاد تقانات خاصة تزيد من محتواها في النبات لتصبح عملية إستخلاصها ذات جدوى إقتصادية، وهي تأتي من إتباع الطرق الحديثة في التسميد كاستعمال الأسمدة النانوية التي تعد من التقنيات الحديثة التي أدت الى زيادة المواد الفعالة لمجموعة غير قليلة من النباتات الطبية، إلا إنها لم تستعمل مع نبات الديباج ومنها المخصبات النانوية المخيلية للحديد والزنك والمضافة بطريقة التغذية الورقية تارةً وتارةً أخرى بالتسميد مع مياه الري فضلاً عن إستعمال السماد العضوي بطريقة التغذية الورقية. ويُعد إستعمال دقائق المواد النانوية تقانة حديثة بات إستعمالها في مجالات واسعة من علوم الحياة ومنها إضافتها للتربة لتحسين خواصها أو مكوناتها الحيوية أو إضافتها للنباتات بقصد زيادة نموها وتحسين إنتاجيتها⁽¹⁰⁾. كما أن لكل من الحديد والزنك أهمية فسلجية في حياة النبات، فالحديد له دوراً في بناء الكلوروفيل وعمليات الأكسدة والإختزال داخل النسيج النباتي إلى جانب دخوله في تركيب السايكروكرومات المهمة في عملية التمثيل الضوئي، وفي تكوين البروتينات النباتية⁽¹¹⁾ و⁽¹²⁾. أما الزنك فعده⁽¹³⁾ أحد أهم العناصر الصغرى في تغذية النبات لما يؤديه من دور مهم في بناء ونمو النبات من خلال إشتراكه كعامل مساعد لنحو 300 إنزيماً. كما ان للزنك دوراً هاماً في إدارة أنواع الأوكسجين التفاعلي وحماية الخلايا النباتية ضد ضغوط الأكسدة⁽¹⁴⁾.

تُعد قاعدية التربة من العوامل المهمة التي تؤدي إلى عدم جاهزية العناصر الغذائية للنبات، إذ تتعرض بعض العناصر مثل الحديد والزنك والنحاس والمنغنيز والبورون في الترب القاعدية إلى الترسيب ومن ثم تكوين مركبات معقدة غير جاهزة للإمتصاص من قبل الجذور⁽¹¹⁾. كما أنّ إضافة الأسمدة الورقية بطريقة الرش على المجموع الخضري للنبات تؤمّن مُتطلبات النبات من المغذيات أثناء المراحل الحرجة والحساسة من نموّه التي تعجز الجذور عن توفيرها⁽¹⁵⁾. وهذا يدل على فعالية طريقة الرش الورقي تحت ظروف مُحددات الإمتصاص الجذري⁽¹⁶⁾. لذا أصبح الهدف من هذه الدراسة هو معرفة إستجابة نبات الديباج لتراكيز مختلفة من نانو الحديد والزنك وطريقة الاضافة والسماد العضوي Drin وتأثيرها في محتوى الاوراق من المادة الفعالة.

Materials and Methods

1- المواد وطرائق العمل

1-1: إجراء التجربة The Conducting Experiment

أُجريت التجربة في الموسم الربيعي (2016 – 2017) بهدف تحديد إستجابة نبات الديباج لتراكيز مختلفة من مخصبات نانو الحديد المخلي ونانو الزنك المخلي شملت طريقة الرش الورقي لها بالتراكيز (0، 1 حديد، 1 زنك، 2 زنك، 1 حديد + 1 زنك، 2 حديد + 2 زنك) غم لتر⁻¹ والاضافة بطريقة الرسمة (مع ماء الري) (0، 80 حديد، 160 حديد، 80 زنك، 160 زنك، 80 حديد + 80 زنك، 160 حديد + 160 زنك) ملغم لتر⁻¹، اي التركيز الموصى وضعف الموصى لكلا الطريقتين

وحسب نشرته الارشادية والسماذ العضوي Drin (0.0 و 5 مل. لتر⁻¹) في محتوى الاوراق من المادة الفعالة. تَضَمَّنَت التجربة ثلاثة عوامل (7 × 2 × 2)، الأول سبعة تراكيز من نانو الحديد والزنك والثاني طريقتي اضافة الرش الورقي والرسمدة (الاضافة مع ماء الري) والرش الورقي للسماذ العضوي Drin بتركيزين (0 و 5 مل. لتر⁻¹). نفذت التجربة في أصص سعة الأصيص الواحد 15 كغم تربة بأبعاد (30 × 40) سم، وتمت زراعة البذور بتاريخ 2016/5/1. وأجريت عمليات الخدمة من ري الشتلات بالإعتماد على الحالة الرطوبة للأصص وإزالة الأعشاب يدوياً كلما دعت الحاجة لذلك.

2-تحضير المعاملات Treatments Preparation

حضرت محاليل الرش الورقي من اذابة 1 غم و 2 غم من نانو الحديد المخليبي المجهز من شركة Sepehr Parmis الايرانية الحاوي على الحديد النانوي بنسبة 13% كل على انفراد في 1 لتر من الماء العادي فأصبح لدينا تركيزان من نانو الحديد المخليبي هي (1 و 2) غم. لتر⁻¹ ليكون التركيز 1 غم. لتر⁻¹ التركيز الموصى والتركيز 2 غم. لتر⁻¹ التركيز ضعف الموصى وحسب ماورد في نشرته الارشادية ، أما معاملة المقارنة فشملت الرش بالماء العادي فقط. وبنفس الطريقة تم تحضير محاليل تركيزها (1 ، 2) غم .لتر⁻¹ من نانو الزنك المخليبي والمجهز من نفس الشركة والحاوي على الزنك بنسبة 20%. وتم تحضير محاليل طريقة الرسمدة لكل من نانو الحديد المخليبي ونانو الزنك المخليبي من اذابة 80 ملغم من المخصب النانوي في 1 لتر⁻¹ من الماء العادي ليكون التركيز الموصى ثم 160 ملغم في 1 لتر⁻¹ من الماء العادي ليكون التركيز ضعف الموصى وحسب ماورد في نشرته الارشادية، اما معاملة المقارنة فقد اضيف لها لتر من الماء العادي فقط.

إستعملَ السَماذ الورقي السائل (Drin) المنتج من شركة Green Has الايطالية والمكوّن من نتروجين عضوي و كاربون عضوي ومجموعة من الاحماض الامينية جدول (1). أخذ حجم واحد من السَماذ الورقي (5 مل) وأكْمَل بالماء العادي إلى اللتر في دورق سعة 1 لتر فأصبح لدينا تركيز 5 مل. لتر⁻¹ من السَماذ العضوي وحسب نشرته الارشادية، أما معاملة المقارنة فرشت بالماء العادي فقط.

جدول (1): مكونات السَماذ العضوي السائل Drin (حسب نشرته الإرشادية).

Table(1):Ingredients of the organic Liquid fertilizer Drin (according to published guidance)

العنصر	و : و (%)	و : ح (%)
النتروجين العضوي (N)	6.3	7.56

22.8	19	الكاربون العضوي (C)
46.8	39	مجموع الاحماض الامينية

3- تنفيذ المُعاملات Treatments Application

اضيفت تراكيز النانو أولاً وبطريقتي الاضافة (الرش الورقي) حتى البلل الكامل للاوراق و(الرسمة) الاضافة الى النبات مع مياه الري بالقرب من منطقة الجذر (اذابة المخصبات في لتر من الماء العادي بحيث يكفي لسقي تربة الاصيص)، ثم رشت النباتات بالسماد العضوي بعد وصول النباتات الى 6 اوراق. استُعملت المرشّة اليدوية سعة 2 لتر في تنفيذ المُعاملات وبضع قطرات من المادة الناشرة (الزاهي) لضمان توزيع المحاليل (11). كما تمت عملية الرش للتراكيز المستعملة في الصباح الباكر مع مُراعاة فصل النباتات وتربة الاصص بقطع من النايلون أثناء الرش لضمان عدم التداخل بين المُعاملات المُتجاورة وعدم وصول المخصبات الى تربة الاصص. تمت الإضافة للمرة الثانية بعد مرور ثلاث أشهر على الإضافة الأولى وإتُبعت الخطوات نفسها المذكورة في الرشّة الأولى مع الرشّة الثانية.

4- الصفات المدروسة Studied characteristics

أُخذت القياسات للصفات المدروسة لجميع النباتات في كُل مُكرر من كُل مُعاملة بعد مرور شهر من الإضافة الثانية لتراكيز النانو والسماد العضوي، وهي كالآتي:
1-4: التقدير الكمي للمحتوى الكيميائي لأوراق النبات بواسطة كروماتوغرافيا الغاز المتصل بمطياف الكتلة (GC-MS)

Quantitative estimation of chemical content of plant leaves by gas chromatography related to mass spectrometry(GC-MS)

الاستخلاص Extract

تم وزن 5 غم من عينة الأوراق الجافة واستخلصت بمجموعة من المذيبات العضوية وحسب طريقة (17) مع بعض التحويلات. أُجري التحليل باستخدام جهاز GC-MS (SHIMADZU MS 2010) ياباني الصنع بواسطة نظام GC clarus 500 Perkin Elmer الذي يضم وحدة التحديد التلقائي auto sampler [AOC-20i+s] للمركبات وكروماتوغرافيا الغاز المربوطة باداة الطيف الكتلي، ابعاد عمود الفصل (30×0.25) Mdf Dimethyl (mm ID×1µm) والمكون من 100% ثنائي المثل متعدد السيلوكسان (Dimethyl polysiloxane 100%) والذي يعمل في وضع تأثير الالكترين 70 Ev (كاشف قنص الالكترين). يمثل غاز الهليوم الطور المتحرك بمعدل تدفق مستمر 1.2 مل. دقيقة⁻¹ وحجم السائل

المحقون 0.2 مايكرو لتر، درجة حرارة الحاقن 250 سيليزي و المصدر الايوني 280 سيليزي والضغط داخل الجهاز 49.5 kPa. واستند تحديد المقدار النسبي لكل مكون على مقارنة متوسط مساحة قمته الى اجمالي المناطق معتمدين على برنامج TurboMass Ver 5.2.0 في التعامل مع الاطياف الكتلية والمرئية (Mass spectra and chromatograms). واجري الاختبار في مختبرات ابحاث الاغذية و حماية المستهلك في كلية الزراعة - جامعة البصرة. وتم اختيار مجموعة من المركبات الفعالة اعتمادا على اهميتها ونسبتها المئوية وهي Sterols و Amyrin و α -tocopherol و Calotropine .

5- التحليل الإحصائي Statistical analysis

استُعملَ تصميم القطاعات العشوائية الكاملة Randomized Complete Block Design (RCBD) وفق تنظيم عاملي لتجربة عاملية Factorial experiment وقورنت متوسطات المُعاملات بإستعمال إختبار أقل فرق معنوي المعدل Least Significant Difference (LSD) عند مُستوى إحتمال 0.05⁽¹⁸⁾.

6-النتائج Results

6-1: النسبة المئوية للستيروولات النباتية الكلية في الأوراق (%)

Total Sterols Percentage in Leaves(%)

يلاحظ من الجدول (2) ان محتوى الاوراق من الستيروولات الكلية ازداد بزيادة التركيز من نانو الحديد ونانو الزنك و اضافتهما معا، وان اعلى محتوى للستيروولات الكلية في الاوراق بلغ 20.47% عند التركيز ضعف الموصى من نانو الزنك مقارنة بالتراكيز النانوية الاخرى و اقل محتوى كان عند معاملة المقارنة البالغة 14.76%. ويشير الجدول ذاته الى التأثير المعنوي لطريقة الاضافة اذ ان اعلى متوسط للنسبة المئوية للستيروولات الكلية بلغ 19.19% للنباتات التي استعملت فيها طريقة الرش الورقي مقارنة بـ 17.12% عند النباتات التي استعملت طريقة الرسمة . كما ان لاستعمال التركيز 5مل/لتر¹ من السماد العضوي تاثير معنوي في متوسط النسبة المئوية للستيروولات الكلية بلغ 19.91% والذي تفوق معنويا على معاملة المقارنة التي سجلت 16.34%.

ولم تعط التداخلات الثنائية بين تراكيز النانو وطريقة الاضافة من جهة وتراكيز النانو والسماد العضوي من جهة اخرى تأثيراً معنوياً في متوسط للنسبة المئوية للستيروولات الكلية. ومن التداخل الثنائي بين طريقة الاضافة والسماد العضوي لوحظ أن التوليفات التي استعمل معها السماد العضوي مع طريقتي الاضافة تفوقت معنوياً على مثيلاتها التي لم يستعمل معها السماد

جدول (2): تأثير نانو الحديد والزنك وطريقة الاضافة والسماذ العضوي Drin وتداخلاتها في النسبة المنوية للمادة الفعالة Phytoestrols في اوراق نبات الديباج *Calotropis procera*
 Table(5): Effect of Nano – Iron and Zinc fertilizers, Method of Addition, Organic fertilizer (Drin) and their interaction on Phytoestrols percentage in leaves of *Calotropis procera*

متوسط طرق الإضافة means of Method of Addition	تراكيز النانو × طريقة الاضافة Nano concentrations × Method of Addition	السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		تراكيز النانو Nano conce- ntrations	طريقة الاضافة Method of Addition	
		5	0			
19.19	16.02	18.37	13.78	0	رش ورقي ^Z Foliar ^Z	
	18.44	19.93	16.96	Fe موصى		
	20.98	21.22	20.83	Fe ضعف الموصى		
	20.30	20.69	19.91	Zn موصى		
	21.26	22.55	19.96	Zn ضعف الموصى		
	18.68	21.04	16.33	Zn+Fe موصى		
	18.69	20.88	16.71	Zn+Fe ضعف الموصى		
17.12	13.50	15.39	11.61	0	رسمة ^Y fertigation ^Y	
	18.39	20.13	16.65	Fe موصى		
	16.42	19.60	13.24	Fe ضعف الموصى		
	16.92	19.11	14.73	Zn موصى		
	19.68	20.72	18.63	Zn ضعف الموصى		
	16.81	19.04	14.58	Zn+Fe موصى		
	18.13	22.00	14.27	Zn+Fe ضعف الموصى		
0.996	N.S two-way interaction التداخل الثنائي			LSD 0.05		
3.726 three- way interaction التداخل الثلاثي						
طريقة الإضافة × السماذ العضوي Method of Addition × Organic fertilizer			تراكيز النانو × السماذ العضوي Nano concentrations × Organic fertilizer			
السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		طريقة الإضافة Method of Addition	متوسط تراكيز النانو means of nano fertilizer	السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		تراكيز النانو Nano conce- ntrations
5	0		0	5	0	
20.40	17.87	رش ورقي Foliar	14.76	16.88	12.64	0
			18.42	20.03	16.81	Fe موصى
			18.70	19.41	17.99	Fe ضعف الموصى
19.43	14.82	رسمة fertigation	18.61	19.90	17.32	Zn موصى
			20.47	21.64	19.30	Zn ضعف الموصى
			17.52	20.09	14.95	Zn+Fe موصى
19.91	16.34	متوسط السماذ العضوي means of organic fertilizer	18.41	21.44	15.39	Zn+Fe ضعف الموصى
0.996	LSD 0.05		1.863	LSD 0.05		
1.408			N.S two-way interaction التداخل الثنائي			

Z: الموصى وفق النشرة الإرشادية 1 غم. لتر⁻¹ وضعف الموصى 2 غم. لتر⁻¹ رشاً على الأوراق لكل من نانو الحديد والزنك.
 Y: الموصى وفق النشرة الإرشادية 80 ملغم. لتر⁻¹ وضعف الموصى 160 ملغم. لتر⁻¹ مع ماء الري لكل من نانو الحديد والزنك.

العضوي، اذ بلغت النسبة المئوية للستيرولات الكلية عند طريقتي الاضافة (الرش الورقي والرسمدة) مع السماد العضوي (20.40 و 19.43%) على التوالي واللذان لم يختلفا عن بعضهما معنويا مقارنة بما حققته الطريقتين (الرش الورقي والرسمدة) من دون استعمال السماد العضوي (17.87 و 14.82%).

ان التداخل الثلاثي لعوامل الدراسة في الجدول ذاته بين اعلى محتوى من الستيرولات الكلية كانت في معاملة الرش الورقي لنانو الزنك بالتركيز الموصى مع استعمال السماد العضوي 5مل لتر⁻¹ وبلغت 22.55%. واختلف معنويا اغلب معاملات نانو الحديد والزنك مع طريقتي الاضافة ومن دون استعمال السماد العضوي، واقل نسبة مئوية للستيرولات الكلية سجلت عند معاملة المقارنة بطريقة الرسمدة ومن دون استعمال السماد العضوي اذ بلغت 11.61%.

2-6: النسبة المئوية للاميرين (%)

Amyrin Percentage in Leaves(%)

أشارت نتائج جدول (3) إلى أن النسبة المئوية للاميرين في اوراق نبات الديباج زادت بشكلٍ معنوي مع جميع معاملات النانو وسجلت معاملة التركيز ضعف الموصى من نانو Zn+Fe اعلى نسبةً بلغت 16.01%، والتي لم تختلف معنويا عن معاملة التركيز الموصى من نانو Fe 15.89% في حين اختلفت معنويا عن المعاملات الاخرى واقل نسبة من الاميرين كانت في معاملة المقارنة وبلغت 11.83%. وتفوقت طريقة الرسمدة في النسبة المئوية للاميرين واعطت 15.30% مقارنةً بما حققته طريقة الرش الورقي والتي بلغت 13.62% كما تشير نتائج الجدول ذاته الى التأثير المعنوي لاستعمال السماد العضوي 5 مل. لتر⁻¹ اذ اعطى أعلى نسبة مئوية للاميرين بلغت 15.23% مقارنةً بما حققته نباتات المقارنة 13.69%.

وفي التداخلات الثنائية نلاحظ من الجدول نفسه للتداخل بين تراكيز النانو وطريقة الاضافة ان استعمال تراكيز النانو مع طريقة الرسمدة تفوقت في النسبة المئوية للاميرين على مثيلاتها التي استعملت بطريقة الرش الورقي، وان اعلى نسبة مئوية للاميرين كانت عند التوليفة المكونة من التركيز ضعف الموصى من نانو Zn + Fe بطريقة الرسمدة والتي بلغت 17.33% تلاه المعاملة بالتركيز الموصى من نانو Fe والبالغة 16.07% وبنفس طريقة الاضافة واللذان لم يختلفا عن بعضهما معنويا مقارنة باقل نسبة مئوية للاميرين عند معاملة المقارنة التابعة لها 11.03%.

جدول (3): تأثير نانو الحديد والزنك وطريقة الاضافة والسماذ العضوي Drin وتداخلاتها في النسبة المنوية للمادة الفعالة amyryn في اوراق نبات الديقاج *Calotropis procera*

Table(5): Effect of Nano – Iron and Zinc fertilizers, Method of Addition, Organic fertilizer (Drin) and their interaction on amyryn percentage in leaves of *Calotropis procera*

متوسط طرق الإضافة means of Method of Addition	تراكيز النانو × طريقة الاضافة Nano concentration × Method of Addition	السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		تراكيز النانو Nano conce- ntrations	طريقة الاضافة Method of Addition	
		5	0			
13.62	12.62	15.60	9.65	0	رش ورقي ^Z Foliar ^Z	
	15.71	15.13	16.30	Fe موصى ^Z		
	13.26	15.60	14.07	Fe ضعف الموصى ^Z		
	13.11	15.13	13.91	Zn موصى ^Z		
	13.26	12.46	13.63	Zn ضعف الموصى ^Z		
	12.65	13.14	12.16	Zn+Fe موصى ^Z		
	14.69	14.91	14.48	Zn+Fe ضعف الموصى ^Z		
15.30	11.03	12.65	9.41	0	رسمة ^Y fertigation ^Y	
	16.07	16.17	15.98	Fe موصى ^Y		
	15.64	16.00	15.28	Fe ضعف الموصى ^Y		
	15.33	17.34	13.33	Zn موصى ^Y		
	15.96	17.92	14.00	Zn ضعف الموصى ^Y		
	15.73	17.21	14.25	Zn+Fe موصى ^Y		
	17.33	19.43	15.24	Zn+Fe ضعف الموصى ^Y		
0.838	2.217	two- way interaction		التداخل الثنائي		
N.S three- way interaction						
طريقة الاضافة × السماذ العضوي Method of Addition × Organic fertilizer			تراكيز النانو × السماذ العضوي Nano constrations × Organic fertilizer			
السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		طريقة الاضافة Method of Addition	متوسط تراكيز النانو means of nano fertilizer	السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		تراكيز النانو Nano conce- ntrations
5	0		0	5	0	
13.78	13.46	رش ورقي Foliar	11.83	14.13	9.53	0
			15.89	15.65	16.14	Fe موصى ^Z
			14.45	14.23	14.67	Fe ضعف الموصى ^Z
16.67	13.93	رسمة fertigation	14.22	14.83	13.62	Zn موصى ^Z
			14.61	15.40	13.81	Zn ضعف الموصى ^Z
			14.19	15.17	13.20	Zn+Fe موصى ^Z
15.23	13.69	متوسط السماذ العضوي means of organic fertilizer	16.01	17.07	14.96	Zn+Fe ضعف الموصى ^Z
0.838	LSD _{0.05}	1.568	LSD _{0.05}			
1.185		2.217 two- way interaction				التداخل الثنائي

Z: الموصى وفق النشرة الإرشادية 1 غم. لتر⁻¹ وضعف الموصى 2 غم. لتر⁻¹ رشاً على الأوراق لكل من نانو الحديد والزنك.
Y: الموصى وفق النشرة الإرشادية 80 ملغم. لتر⁻¹ وضعف الموصى 160 ملغم. لتر⁻¹ مع ماء الري لكل من نانو الحديد والزنك.

وفي التداخل الثنائي بين تراكيز النانو والسماذ العضوي يلاحظ بان استعمال تراكيز النانو مع ومن دون استعمال السماذ العضوي تفوقت معنوياً على معاملة المقارنة (بدون نانو وبدون

سماد عضوي) 9.53%، وان اعلى نسبة مئوية للامايرين كانت عند استعمال التركيز ضعف الموصى من نانو Zn + Fe مع 5مل.لتر⁻¹ السماد العضوي وبلغت 17.07%. وفي التداخل الثنائي بين طريقة الاضافة والسماد العضوي يلاحظ أن التوليفة المتضمنة طريقة الرسمدة مع السماد العضوي بتركيز 5 مل. لتر⁻¹ حققت أعلى نسبة مئوية للامايرين (16.67%) تفوقت معنوياً على جميع التوليفات الثنائية الأخرى. ولم يُظهر التداخل الثلاثي بين عوامل الدراسة اي تأثير معنوي في النسبة المئوية للامايرين.

3-6: النسبة المئوية للمادة الفعالة α -tocopherol

بيّنت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الواردة في جدول (4) أنّ النسبة المئوية للمادة الفعالة α -tocopherol في أوراق نبات الدجاج مع معاملة نانو الزنك بالتركيز (الموصى وضعف الموصى) أعطت أعلى نسبة بلغت (4.855 و 4.896%) على التوالي، وتفوقتا معنوياً على جميع تراكيز النانو الأخرى، واقل نسبة من مادة α -tocopherol كانت في معاملة المقارنة واعطت 2.924%. أظهرت طريقة الاضافة تأثيراً معنوياً في النسبة المئوية للمادة الفعالة α -tocopherol إذ سجّلت النباتات التي استعملت طريقة الرسمدة أعلى نسبة لهذه المادة بلغت 4.351% مقارنةً بما سجّلته النباتات التي استعملت طريقة الرش الورقي 4.065%. ولم يلاحظ فرق معنوي بين معاملة المقارنة والتركيز 5 مل. لتر⁻¹ من السماد العضوي في النسبة المئوية لهذه المادة.

وفي التداخل الثنائي بين تراكيز النانو وطريقة الاضافة أظهرت تفوق توليفتي نانو الزنك بالتركيز الموصى وضعف الموصى مع طريقة الرسمدة تفوقاً معنوياً في محتوى نباتاتها من المادة الفعالة α -tocopherol وبلغتا (5.200 و 5.247%)، على التوالي مقارنةً بما سجّلته التوليفات الأخرى ونباتات معاملة المقارنة مع الرش الورقي التي سجلت اقل نسبة 2.943% من المادة ذاتها. وأوضح تداخل تراكيز النانو والسماد العضوي ان استعمال التركيز الموصى من نانو Zn وبدون استعمال السماد العضوي اعطى أعلى نسبة من المادة الفعالة α -tocopherol وبلغت 5.310 ولم تختلف معنوياً عن التركيز ضعف الموصى من نانو Zn، في حين اختلفت معنوياً مع جميع المعاملات الأخرى في هذا التداخل، واقل محتوى من هذه المادة الفعالة كان في معاملة المقارنة (0نانو ومن دون استعمال السماد العضوي) وبلغت 2.448%. وفي التداخل الثنائي بين طريقة الاضافة والسماد العضوي أظهرت تفوق توليفة الرسمدة مع السماد العضوي بتركيز 5 مل.لتر⁻¹ في النسبة المئوية من مادة α -tocopherol بلغت 4.527% مقارنةً بما سجّلته التوليفات الأخرى.

جدول (4): تأثير نانو الحديد والزنك وطريقة الاضافة والسماذ العضوي Drin وتداخلاتها في النسبة المئوية للمادة الفعالة α -tocopherol في اوراق نبات الديباج *Calotropis procera*

Table(5): Effect of Nano – Iron and Zinc fertilizers, Method of Addition, Organic fertilizer (Drin) and their interaction on α -tocopherol percentage in leaves of *Calotropis procera*

متوسط طرق الإضافة means of Method of Addition	تراكيز النانو x طريقة الاضافة Nano concentration × Method of Addition	السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		تراكيز النانو Nano conce- ntrations	طريقة الاضافة Method of Addition	
		5	0			
4.065	2.905	3.263	2.547	0	رش ورقي ^Z Foliar ^Z	
	4.100	4.033	4.167	Fe الموصى		
	4.463	4.540	4.387	Fe ضعف الموصى		
	4.560	3.920	5.200	Zn الموصى		
	4.545	3.743	5.347	Zn ضعف الموصى		
	4.240	4.360	4.120	Zn+Fe الموصى		
	3.645	3.173	4.117	Zn+Fe ضعف الموصى		
4.351	2.943	3.537	2.350	0	رسمدة ^Y fertigation ^Y	
	4.267	4.377	4.157	Fe الموصى		
	4.062	3.550	4.573	Fe ضعف الموصى		
	5.200	4.880	5.520	Zn الموصى		
	5.247	5.540	4.953	Zn ضعف الموصى		
	4.117	4.697	3.537	Zn+Fe الموصى		
	4.621	5.110	4.133	Zn+Fe ضعف الموصى		
0.259	0.686	two- way interaction		التداخل الثنائي	LSD _{0.05}	
0.970 three- way interaction						
طريقة الاضافة x السماذ العضوي Method of Addition × Organic fertilizer			تراكيز النانو x السماذ العضوي Nano constra-tions × Organic fertilizer			
السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		طريقة الاضافة Method of Addition	متوسط تراكيز النانو means of nano fertilizer		السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)	تراكيز النانو Nano conce- ntrations
5	0		0	5		
3.862	4.269	رش ورقي Foliar	2.924	3.400	2.448	0
			4.183	4.205	4.162	Fe الموصى
			4.263	4.045	4.480	Fe ضعف الموصى
4.527	4.175	رسمدة fertigation	4.855	4.400	5.310	Zn الموصى
			4.896	4.642	5.150	Zn ضعف الموصى
			4.153	4.528	3.778	Zn+Fe الموصى
4.195	4.222	متوسط السماذ العضوي means of organic fertilizer	4.183	4.142	4.225	Zn+Fe ضعف الموصى
N.S		LSD _{0.05}	0.485			LSD _{0.05}
0.366			0.686 two- way interaction			التداخل الثنائي

Z: الموصى وفق النشرة الإرشادية 1 غم. لتر⁻¹ وضعف الموصى 2 غم. لتر⁻¹ رشاً على الأوراق لكل من نانو الحديد والزنك.
Y: الموصى وفق النشرة الإرشادية 80 ملغم. لتر⁻¹ وضعف الموصى 160 ملغم. لتر⁻¹ مع ماء الري لكل من نانو الحديد والزنك.

ومن التداخل الثلاثي للعوامل المدروسة يظهر من الجدول ذاته بأن اعلى نسبة مئوية من المادة الفعالة α -tocopherol في الاوراق كانت مع رسمة نانو الزنك بالتركيز ضعف الموصى مع استعمال السماد العضوي 5مل.لتر⁻¹ وبلغت 5.540% واختلفت معنوياً مع اغلب معاملات هذا التداخل، مقارنة باقل نسبة لهذه المادة الفعالة في معاملة المقارنة التابعة لها وبلغت 2.350%.

4-6:النسبة المئوية للمادة الفعالة Calotropin

ظهر من بيانات جدول (5) التفوق المعنوي لتراكيز النانو في زيادة النسبة المئوية من المادة الفعالة Calotropin في الأوراق، اذ اعطت المعاملة بالتركيز الموصى من نانو (Zn+Fe) تائيراً معنوياً في النسبة المئوية من هذه المادة وبلغت 12.86% واختلفت معنوياً مع جميع المعاملات الاخرى باستثناء معاملة نانو Fe بالتركيز ضعف الموصى. وتوقفت معاملة الرش الورقي بنسبة المادة الفعالة Calotropin واعطت 11.31% معنوياً على نباتات معاملة الرسمة التي سجلت 10.15%.

وبيّن التأثير المعنوي لاستعمال السماد العضوي على النسبة المئوية من Calotropin اذ أنّ النباتات المستعمل معها السماد العضوي 5مل.لتر⁻¹ تفوّقت معنوياً بمحتوى أوراقها من المادة الفعالة Calotropin وسجلت 11.77% قياساً بمعاملة عدم استعماله اذ سجلت 9.48%. وفي التداخل الثنائي بين تراكيز النانو وطريقة الاضافة يلاحظ من الجدول ذاته عدم وجود فروقات معنوية بين معاملات هذا التداخل في النسبة المئوية للـ Calotropin. وفي التداخل الثنائي بين تراكيز النانو والسماد العضوي أظهر ان استعمال السماد العضوي 5مل.لتر⁻¹ مع التركيز الموصى من نانو (Zn +Fe) اعطت أعلى نسبة من الـ Calotropin وبلغت 14.59%، واقل نسبة من هذه المادة كانت في معاملة المقارنة وبلغت 6.28%. وفي التداخل الثنائي بين طريقة الاضافة والسماد العضوي لم يظهر فروقات معنوية بين معاملات هذا التداخل في النسبة المئوية للمادة الفعالة Calotropin.

ومن التداخل الثلاثي لعوامل الدراسة ظهر بأن النباتات المعاملة بالتركيز الموصى من نانو (Zn +Fe) مع طريقة الرش الورقي واستعمال 5مل،لتر⁻¹ سماد عضوي اعطت اعلى نسبة من المادة الفعالة Calotropin وبلغت 15.14% واختلفت معنوياً مع بعض معاملات هذا التداخل، واقل محتوى من هذه المادة كان مع معاملة المقارنة التابعة لطريقة الرسمة 4.91%.

جدول (5): تأثير نانو الحديد والزنك وطريقة الاضافة والسماذ العضوي Drin وتداخلاتها في النسبة المنوية للمادة الفعالة Calotropin في اوراق نبات الديباج *Calotropis procera*
 Table(5): Effect of Nano – Iron and Zinc fertilizers, Method of Addition, Organic fertilizer (Drin) and their interaction on Calotropin percentage in leaves of *Calotropis procera*

متوسط طرق الإضافة means of Method of Addition	تراكيز النانو × طريقة الإضافة Nano concentration × Method of Addition	السماذ العضوي مل لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)		تراكيز النانو Nano conce- ntrations	طريقة الإضافة Method of Addition
		5	0		
11.31	9.51	11.37	7.65	0	رش ورقي ^Z Foliar ^Z
	10.44	11.59	9.30	Fe موصى	
	12.43	13.56	11.30	Fe ضعف الموصى	
	10.80	10.89	10.71	Zn موصى	
	11.59	12.89	10.29	Zn ضعف الموصى	
	13.74	15.14	12.33	Zn+Fe موصى	
	10.69	11.54	9.85	Zn+Fe ضعف الموصى	
10.15	7.81	10.72	4.91	0	رسمدة ^Y fertigation ^Y
	9.89	10.47	9.32	Fe موصى	
	11.92	13.40	10.44	Fe ضعف الموصى	
	9.42	10.44	8.39	Zn موصى	
	10.34	10.72	9.97	Zn ضعف الموصى	
	11.98	14.04	9.91	Zn+Fe موصى	
	9.70	11.00	8.40	Zn+Fe ضعف الموصى	
0.60	two- way interaction التداخل الثنائي			LSD 0.05	
2.27 three- way interaction التداخل الثلاثي					
طريقة الإضافة × السماذ العضوي Method of Addition × Organic fertilizer			تراكيز النانو × السماذ العضوي Nano constractions × Organic fertilizer		
السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)	طريقة الإضافة Method of Addition	متوسط تراكيز النانو means of nano fertilizer		السماذ العضوي مل.لتر ⁻¹ organic fertilizer (mg.L ⁻¹)	تراكيز النانو Nano conce- ntrations
		5	0		
12.40	رش ورقي Foliar	8.66	11.04	6.28	0
		10.17	11.03	9.31	Fe موصى
		12.18	13.58	10.77	Fe ضعف الموصى
10.23	رسمدة fertigation	10.11	10.56	9.65	Zn موصى
		10.22	10.30	10.13	Zn ضعف الموصى
		12.86	14.59	11.12	Zn+Fe موصى
11.77	9.48	10.20	11.27	9.12	Zn+Fe ضعف الموصى
0.60	LSD 0.05	1.13		LSD 0.05	
N.S		1.60 two- way interaction التداخل الثنائي			

Z: الموصى وفق النشرة الإرشادية 1 غم. لتر⁻¹ وضعف الموصى 2 غم. لتر⁻¹ رشاً على الأوراق لكل من نانو الحديد والزنك.
 Y: الموصى وفق النشرة الإرشادية 80 ملغم. لتر⁻¹ وضعف الموصى 160 ملغم. لتر⁻¹ مع ماء الري لكل من نانو الحديد والزنك.

المناقشة Discussion

إنَّ زيادة محتوى الأوراق من المواد الفعالة الجداول (2-5) بتأثير نانو الحديد والزنك يعود إلى أن الأسمدة النانوية توفر مساحة سطحية أكبر لتفاعلات الأيض المختلفة في النبات مما يزيد من معدل التمثيل الضوئي مما يشجع الطلب على العناصر المعدنية وينتج المزيد من المادة الفعالة، وان صغر حجم دقائق النانو يسهل عليها اختراق مسام جدر الخلايا بسهولة وصولاً إلى الحزم الوعائية⁽¹⁹⁾ وتحافظ على النبات من الإجهادات المختلفة الحيوية وغير الحيوية⁽²⁰⁾. وللدقائق النانوية دور في زيادة سرعة التفاعلات الحيوية بفعل المساحة السطحية الكبيرة لدقائقها التي تزيد من سرعة التفاعلات المؤدية إلى إنتاج مواد النمو، وعلى اعتبار أن لكل إنزيماته الخاصة تؤدي إلى زيادة الصفات الخضرية للنبات وزيادة إنتاج مركبات الأيض الثانوي في الأوراق⁽²¹⁾. كما ان نانو الحديد يزيد من كفاءة الثغور (فتح الثغور) مما ينعكس بشكل ايجابي على زيادة كمية (CO₂) الداخل الى اوراق النبات وزيادة كفاءة عملية البناء الضوئي ونواتجها⁽²²⁾ وهذا بدوره يزيد من نواتج الأيض الثانوي في النبات، ان نانو الحديد يحفز نمو النبات من خلال تنظيم المحتوى الهرموني والانزيمي، ومن هذه الهرمونات حامض السالسليك الذي يعزز إنتاج مركبات الأيض الثانوي⁽²³⁾ و⁽²⁴⁾ و⁽²⁵⁾. وبالمقابل فإن زيادة المواد الفعالة قيد الدراسة نتيجة إضافة نانو الزنك تعود إلى تأثيره الإيجابي في تشجيع النمو الخضري ومن ثم زيادة كفاءة النبات وخاصةً في عملية البناء الضوئي من خلال إشتراك الزنك في فتح خلايا الثغور بكونه مكون لانزيم carbonic anhydrase اللازم للحفاظ على [HCO] كاف في الخلايا الحارسة وأيضا كعامل يؤثر على امتصاص K⁺ من قبل خلايا الحارسة. مما تؤدي إلى زيادة كفاءة عملية البناء الضوئي والمادة الفعالة المعتمدة على تصنيع وتراكم المواد الغذائية ونواتج الأيض الثانوية الناتجة من هذه العملية⁽²⁶⁾ و⁽²⁷⁾. ان البناء الحيوي للمركب الفعال α -tocopherol يتطلب توفر الزنك كعامل محفز لعمل الانزيمات المكونه له⁽²⁸⁾، كما ان الحامض الاميني التايروسين (Tyrosine) يزداد بزيادة الزنك المجهز للنبات⁽²⁹⁾ و⁽³⁰⁾ الذي يعد مصدرا لتخليق هذه المادة الفعالة، وهذا مايفسر زيادة النسبة المئوية لمركب α -tocopherol مع استعمال نانو الزنك جدول (4). كما أن التأثير المعنوي للسماد العضوي في زيادة الاحماض الامينية الموجودة في السماد العضوي تلعب دور في زيادة كفاءة عمليتي البناء الضوئي والتمثيل الكربوني مما يؤدي إلى زيادة المواد الغذائية المصنعة في النبات وتراكمها بالتالي زيادة نواتج الأيض الثانوي⁽³¹⁾.

المصادر References

- 1- Ping-tao, L.; M. G. Gilbert, and W. D. Stevens. 1995. Asclepiadaceae , Flora of China 16: 189–270.

- 2- Hassan, L. M.; T. M. Galal, and, E.A. Farahat.2015. The biology of *Calotropis procera* (Aiton) W.T., Trees, 29:311–320.
- 3- El-Midany, M. 2014. Population dynamic of *Calotropis procera* in Cairo province. M.Sc. Thesis. Helwan University, Cairo, Egypt
- 4- Al-Snafi,A.E. 2015. The constituents and pharmacological properties of *Calotropis procera* –An overview. Interna. J, of Pharm., 5(3) :259-275.
- 5- Galal, T.M.; E.A.Farahat, and, M.M. El-Midany.2016. Nutrients and heavy metals accumulation by the giant milkweed *Calotropis procera* (Aiton) W.T. Aiton in urbanized areas, Egypt. 27, (2) : 241–250.
- 6- Payal,C.and R. A. Sharma .2016. The Genus *Calotropis*: An Overview on Bioactive Principles and their Bioefficacy. Research J. of Recent Sciences , 5(1): 61-70.
- 7- Pawar, P.R. 2017. Separation and identification of active constituents of *Calotropis gigantean* latex, by HPLC, FTIR, UV-Visible and classical techniques. World J. of Pharma. and Life Sci., 2(6): 590-596.
- 8- Abdullatif, B.M.; M.M. El-Kazan, and M.A. Al-Zahrani .2016. Phytoremediation Ability of *Calotropis procera* in Reducing Air Pollution in Jeddah City-Kingdom of Saudi Arabia. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. , 5(3): 212-225.
- 9- Jaradat, N.A.; A.N.Zaid ; R. Al-Ramahi and M.A. Alqub. 2017. Ethnopharmacol- ogical survey of medicinal plants practiced by traditional healers and herbalists for treatment of some urological diseases in the West Bank/Palestine. BMC Complementary and Alternative Medicine , 17(1):2-18
- 10- Prasad, R., V. Kumar and K. Prasad.2014. Nanotechnology in sustainable agriculture: Present concerns and future aspects, A. J. of Biotech., 13(6):705-713.

- 11- Kirkby, E. A. and Mengel, K.(2012). Principles of Plant Nutrition. 5TH edition, Springer Science & Business Media, Pp :849.
- 12- Barker, A.V. and M.L. Stratton.2015. Iron. Chapter11.In Barker, A.V. and Pilbeam, D.J.(eds):Handbook of Plant Nutrition. Second Edition. CRC Press Taylor and Francis Group. London. New York, Pp:399-426.
- 13- Sharma, P.N.; N.Kumar and S.S.Bisht .1994. Effect of zinc deficiency on chlorophyll content , photosynthesis and water relations of cauliflower plants. *Photosynthetica*, 30(3): 353-359.
- 14- Amiri, A. B.; C. Baninasab; A.Ghobadi .2016. Zinc soil application enhances photosynthetic capacity and antioxidant enzyme activities in almond seedlings affected by salinity stress. *Photosynthetic*, 54(2) : 267–274..
- 15- Martin, P. 2002. Micro–nutrient deficiency in Asia and the pacific. Borax Europe limited, UK, at IFA. Regional for Asia and the Pacific, Singapore, PP: 18–20.
- 16- Romhold, V. and M. M. El–Fouly .2000. Foliar Nutrient Application: Challenge and Limits in Crop Production. 2nd ed. International Workshop on Foliar Fertilization. Bangkok, Thailand, PP: 1–32.
- 17- Hussein ,H.I.; A. Kamel ; M. Zeid and K.H. EL-Sebae .1994. Uscharin, the most potent molluscicidal compound tested against land snails. *Journal of Chemical Ecology*, 20(I): 136-140.
- 18- Steel, R. G. D. and J. H. Torrie.1980. Principles and Procedures of Statistics. A Biometrical Approach. New York, USA, PP: 633.
- 19- Ma, X.; J.Geiser-Lee ; Y.Deng , and A.Kolmakov .2010. Interactions between engineered nanoparticles (ENPs) and plants: Phytotoxicity, uptake and accumulation. *Sci. of Environment*, 408(16): 3053–3061.

- 20- Singh, M.D.; G.Chirag ; P. Prakash; M.H. Mohan, and G. Prakasha. 2017. Nano-Fertilizers is a New Way to Increase Nutrients Use Efficiency in Crop Production. *Int. J. of Agri. Sci.*, 9(7) :3831-3833.
- 21- Agrawal,S. and P.Rathore. 2014. Nanotechnology Pros and Cons to Agriculture: A Review. *Int .J. Curr. Microbiol. App. Sci* ,3(3): 43-55.
- 22- Kim, J.; H. Yoon ; I. Hwang, and Y. Chang 2016.Iron Nanoparticle-Induced Activation of Plasma Membrane H⁺-ATPase Promotes Stomatal Opening in *Arabidopsis thaliana* . *Environ. Sci. Technol.*, 49(2): 1113–1119.
- 23- Rui, M.; C. Ma ; Y.Hao and J. Guo.2016. Iron Oxide Nanoparticles as a Potential Iron Fertilizer for Peanut (*Arachis hypogaea*). *Front. Plant Sci.* 7(815):1-10.
- 24- Al-oubaidi, H.K.M.and A.S. Ameen .2014. Increasing secondary metabolites of *Calendula officinalis* L. using salicylic acid in vitro. *World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Scie.*, 3(5):1146-1155.
- 25- Kong, X.; H.Tian and Z. Ding .2017. Plant Hormone Signaling Mediates Plant Growth Plasticity in Response to Metal Stress,Ch8 in *Mechanism of Plant Hormone Signaling under Stress* (ed G. K. Pandey), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. Pp:223-235.
- 26- Sharma, P.N.; A. Tripathi and S.S. Bisht .1995. Zinc Requirement for Stomatal Opening in Cauliflower'. *Plant Physiol.*, 107: 751-756
- 27- Chamani, E.; S.K. Ghalehtaki and M. Mohebodini .2015. The effect of Zinc oxide nano particles and Humic acid on morphological characters and secondary metabolite production in *Lilium ledebourii* Bioss, *Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding*, 4(2):11-19.
- 28-Tzin,V.; S.Malitsky; M.B. Zvi, and M. Bedair .2012. Expression of a bacterial feedback-insensitive 3-deoxy-D-arabinoheptulosonate -7 phosphate synthase of the shikimate pathway in *Arabidopsis* elucidates potential metabolic bottlenecks between primary and secondary metabolism, *New Phytologist* ,194: 430–439.

- 29- Navarro,E.; Y. Barrameda-Medinaa and M. Lentinib .2016. Comparative study of Zn deficiency in *L. sativa* and *B. oleracea* plants: NH_4^+ assimilation and nitrogen derived protective compounds. *Plant Science*, 248:(8):11-20.
- 30-Schenck,C.; C. Holland; M.Schneider; J. Jez and H. Maeda .2017. Molecular Basis of TyrA Substrate Specificity Underlying the Evolution of Alternative Tyrosine Biosynthetic Pathways. *The FASEB J.*, 31 (1): 628-634.
- 31 - Sunithakumari, K. and S. Padma.2016. Zinc solubilizing bacterial isolates from the agricultural fields of Coimbatore, India. *Current Sci.*, 110(2): 196-205.

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION AND
SCIENTIFIC RESEARCH

AL-QASIM GREEN
UNIVERSITY

College of Agriculture
Euphrates Journal of
Agriculture Science

جمهورية العراق



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة القاسم الخضراء

كلية الزراعة

مجلة الفرات للعلوم الزراعية

NO:

496

Date:

25/7/2017

.. يَنْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ..

العدد: ٤٩٦

التاريخ: ٢٠١٧/٧/٢٥

الى / الدكتور عبد الأمير علي ياسين المحترم

السيدة سعاد مهدي كاظم المحترمة



م/ قبول نشر

تهديكم هيئة تحرير مجلة الفرات للعلوم الزراعية أطيب تحياتها ونود اعلامكم بقبول بحثكم
الموسوم :

تأثير مخصبات نانو الحديد والزنك المخليبية وطريقة الاضافة والسماذ العضوي Drin في محتوى

الأوراق من المادة الفعالة لنبات الديباج *Calotropis procera* (Ait.) R.Br

للنشر في مجلة الفرات للعلوم الزراعية في المجلد (التاسع) العدد (الرابع) لسنة 2017

مع التقدير

م.م اسراء لؤي حمدان

مدير التحرير

2017/7/26



تنشر البحوث على الموقع الالكتروني (العراقية للمجلات الأكاديمية العلمية) [http:// www.iasj.net](http://www.iasj.net)

E-mail : alfuratagriculture@yahoo.com

Mob: 07822955516