

## العنوان

### تقييم الملاءمة المكانية بين خصائص المناخ وزراعة محصول الذرة الصفراء في

### محافظات الفرات الاوسط باستخدام (GIS)

الطالب م . م محمد خضير كلف  
mohammed.kilef1980@gmail.com  
مديرية تربية القادسية

أ . د صلاح ياركة ملك الخميسي  
salah.melek@qu.edu.iq  
جامعة القادسية /كلية الآداب / قسم الجغرافية

**المستخلص :-** يتناول البحث خصائص المناخ المؤثرة في زراعة محصول الذرة الصفراء من حيث تحديد افضل الاراضي لزراعته اعتماداً على تلك الخصائص ، اذ يعد محصول الذرة الصفراء من المحاصيل الغذائية الرئيسة التي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية ذات الاستهلاك المباشر من قبل السكان ، ولأهمية هذا المحصول بدأ المختصون بجانب الانتاج النباتي البحث عن افضل الوسائل والطرق للوصول الى المناطق الامثل في زراعة المحصول ، ومن هذه الوسائل تقانة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ، فتقييم الملاءمة المكانية بين خصائص المناخ وزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط من اهم الدراسات التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية في تحديد وتصنيف الاراضي تبعاً لملاءمة مناخها ، اذ تم في ضوء ذلك تقييم وتصنيف خصائص المناخ والمتمثلة بـ ( الاشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية ) وتمت عملية التقييم والتصنيف في برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) من خلال اعادة تصنيفها بأداة (Reclassify) وفقاً لمتطلبات محصول الذرة الصفراء منها اعتماداً على معايير (SYS) المعتمدة من قبل منظمة الزراعة والاغذية (FAO) والتي وضعت حدوداً مثالية لزراعته تمثلت بخمسة مستويات (-N2-N1-S3) ، فضلاً عن عمل نموذج للملاءمة المكانية النهائية بتطبيق (Model Builder) ومن ثم استخدام اداة (Weighted Overly) لإعطاء وزن لكل خاصية من تلك الخواص اعتماداً على اهميتها ومدى تأثيرها في المحصول ومقدارها في التربة ، وبالتالي توصل الي ان هنالك اربع مستويات للملاءمة هي (-N2-S3) ، اذ سجلت الفئتين (S2-S1) العالية الملاءمة والمتوسطة الملاءمة النسب الاعلى اذ بلغت (79.6%) من نسبة مساحة منطقة الدراسة .

الكلمات المفتاحية : ( الملاءمة المكانية – الذرة الصفراء – GIS – خصائص المناخ )

## Title

### Evaluation of spatial fit between climate characteristics and maize cultivation in Middle Euphrates Governorates Using (GIS)

M . M Mohammed Khudair Kilef  
mohammed.kilef1980@gmail.com  
Al-Qadisiyah Education Directorate

ph. Salah Yarkah melek Al-Khamisi  
salah.melek@qu.edu.iq

Al-Qadisiyah University/College of Arts  
Department of Geography

**Abstract:** The research deals with the climate characteristics affecting the cultivation of the yellow corn crop in terms of determining the best lands for cultivation based on those characteristics. In addition to plant production, specialists began searching for the best means and methods to reach the optimal areas for crop cultivation, and among these methods is the technology of geographic information systems (GIS).

Geographical lands are defined and classified according to the suitability of their climate. In light of this, the climatic characteristics were evaluated and classified as (solar radiation, temperature and relative humidity). The evaluation and classification process was carried out in the Geographic Information Systems (GIS) program, by reclassifying it with the Reclassify tool, according to the requirements of The yellow corn crop from them based on the (SYS) standards approved by the Food and Agriculture Organization (FAO), which set ideal limits for corn It was represented by five levels (N2-N1-S3-S2-S1), in addition to making a model for the final spatial fit by applying (Model Builder) and then using the (Overly Weighted) tool to give a weight for each of those properties depending on its importance and its impact on the crop. and its amount in the soil, and accordingly the research concluded that there are four levels of suitability which are (N2-S3-S2-S1), as the two categories (S2-S1) of high suitability and medium suitability recorded the highest percentages as they reached (79.6%) of the percentage of the area of the study area.

Keywords: (spatial fit - maize - GIS - climate characteristics)

**المقدمة :-** للمناخ دور مهم في تحديد زراعة محصول الذرة الصفراء وهذا ما هو واضح من خلال نجاح زراعته في فصل الصيف وانعدامها في فصل الشتاء وهنا يبرز دور المناخ كعامل محدد لزراعته ، لذا فدراسة تأثير خصائص المناخ من الموضوعات المهمة في جغرافية الزراعة والانتاج النباتي ولمعرفة ذلك التأثير تم دراسته من حيث الملاءمة المكانية التي تعتمد في التوصل الى نتائجها على افضل الوسائل والبرامج ومنها برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والذي يعطي امكانية كبيرة في تحديد الاراضي الامثل لزراعة المحصول ، اذ تعتمد هذه التقانة على متطلبات المحصول المثالية من خصائص المناخ والتي تعد كمحددات لزراعته في المنطقة ، فتوافرها ضمن هذه المتطلبات تعطي صورة واضحة عن اهم وافضل المناطق لزراعته ويتم ذلك من خلال اعادة تصنيف هذه الخصائص في ضوء تلك المتطلبات باستخدام اداة (Reclassify) في برنامج (GIS) ومن ثم عمل نموذج للملاءمة المكانية (Model Builder) يستخدم فيه اداة ( Overly Weighted) لتحديد وزن كل خاصية من تلك الخصائص وبحسب اهميتها للمحصول معتمدا على معيار (Sys) المعتمد من قبل منظمة الزراعة والاعذية (FAO) .

**فتمثلت مشكلة البحث بطرح التساؤلات الاتية :-**

- 1- ما مدى ملاءمة خصائص المناخ لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط ؟
- 2- ما صورة التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط ؟
- 3- كيف يمكن تحديد الاراضي المثلى لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط ؟

**اما فرضية البحث فتتلخص بالاتي :-**


- 1- تتمتع محافظات الفرات الاوسط بخصائص مناخية مثالية لزراعة محصول الذرة الصفراء لأغلب مناطقها .
- 2- يتوزع محصول الذرة الصفراء توزيعاً غير منتظماً في محافظات الفرات الاوسط.
- 3- لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) امكانية كبيرة في تحديد افضل المناطق لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط .

**هدف البحث :-** يهدف البحث الى الكشف عن خصائص المناخ ومدى ملاءمتها لزراعة محصول الذرة الصفراء ويتم ذلك من خلال معرفة متطلباتها من هذه الخصائص وباستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) يتم تصنيف وتقييم الملاءمة المكانية لزراعة المحصول في محافظات الفرات الاوسط .

**منهج البحث :-** اعتمد البحث المنهج النظامي الذي اعتمد دراسة خصائص المناخ المؤثرة في زراعة المحصول ، ودعم ذلك بالمنهج المحصولي الذي يعنى بدراسة المحصول من حيث التعريف به من حيث طبيعته وكمية انتاجه ، كما تم استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للكشف عن مدى ملاءمة خصائص المناخ لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط .

**حدود الدراسة :-** تشمل حدود الدراسة الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية ، تتمثل الحدود الموضوعية بمحصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط معتمدا على الاهمية الاقتصادية كأساس في عملية الاختيار .

اما الحدود المكانية فتمثلت بمحافظات الفرات الاوسط الخمس ( بابل – كربلاء – النجف – القادسية – المثنى ) ، تشكل هذه المحافظات الخمس منطقة جغرافية متجاورة ومشاركة بالخصائص الطبيعية ضمن السهل الرسوبي والهضبة الغربية العراقية تتخذ لها امتدادا جغرافيا ( شمال غرب جنوب شرق ) وهي حلقة الوصل بين المحافظات الغربية والمحافظات الجنوبية ، اذ تحدها من الشمال محافظة بغداد ومن الشمال الغربي محافظة الانبار ومن الغرب الحدود العراقية السعودية ومن الشرق محافظتي واسط وذي قار ومن الجنوب الشرقي محافظة البصرة ، اما فلكياً فتقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض (  $29.4^{\circ}$  -  $33.3^{\circ}$  شمالاً ) وبين خطي طول (  $43^{\circ}$  -  $46^{\circ}$  شرقاً ) . خريطة رقم ( 1 ) .



المصدر : الباحث بالاعتماد على : وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق الانبارية لعام 2007م ، بمقياس 1 : 1000000 ، وبرنامج (GIS)

اذ يبلغ مجموع مساحة المحافظات الخمسة ( 98870 كم<sup>2</sup> ) بما نسبته ( 22 % ) من مجموع مساحة العراق البالغة ( 435.052 كم<sup>2</sup> )<sup>(1)</sup> ، وتقسم ادارياً الى ( 20 قضاء و 60 ناحية ) ، جدول رقم ( 1 ) .

جدول رقم ( 1 )

محافظات الفرات الاوسط مساحتها وعدد وحداتها الادارية لعام 2019م

المحافظة	مركز المحافظة	عدد الاقضية	عدد النواحي	المساحة (كم <sup>2</sup> )	% للمساحة	
بابل	الحلة	4	16	5119	5.2	
كربلاء	كربلاء	3	7	5034	5.1	
النجف	النجف	4	10	28824	29.2	
القادسية	الديوانية	4	15	8153	8.2	
المتنى	الساموة	5	12	51740	52.3	
المجموع					98870	100

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، المجموعة الاحصائية السنوية ، 2019م ، ص 4 .

## المفاهيم والمصطلحات :-

### 1- التقييم (Evaluation) :-

هو اداة للتخطيط الاستراتيجي لاستخدامات الاراضي والذي ينتبأ بأداء الارض من حيث الفوائد المتوقعة والقيود المفروضة على استخدام الاراضي المنتجة ، فضلاً عن البيئة المتوقعة للتدهور الحاصل بسبب هذه الاستخدامات<sup>(2)</sup> .

### 2- نظم المعلومات الجغرافية ( Geographical Information Systems ) :-

وردت العديد من التعريفات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية اهمها ما جاء به الجغرافي والذي يعد ان تعريف نظم المعلومات الجغرافية لا بد ان يشمل منهج الربط بين المعلومات النوعية او الكمية وبين مواقعها الحقيقية على سطح الارض<sup>(3)</sup> .

### 3- الملاءمة المكانية ( Suitability of the spatial ) :-

هي دالة لمتطلبات المحاصيل وخصائص الارض وهي مقياس لكيفية معرفة صفات وحدة الارض ومتطلبات شكل معين من استخدامات الاراضي<sup>(4)</sup> .

## المحور الاول

### خصائص المناخ المؤثرة في زراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط

ان دراسة خصائص المناخ تعطي امكانية للكشف عن مدى تأثيرها في الانتاج الزراعي ، اذ تعد العناصر بمجملها رغم تباين فعاليتها العامل المحدد لزراعة وانتاج محصول الذرة الصفراء ، فضلاً عن ان توافرها بما يتناسب ومتطلبات زراعة المحصول ، اذ تعمل على نجاحه وتحقق اعلى انتاج وانتاجية ممكنة مع توافر الامكانات الجغرافية الاخرى ، ان التباين في معدلات العناصر المناخية ينعكس تأثيرها على انتاجية المحصول المزروع في المنطقة ، ولمعرفة مناخ منطقة الدراسة تم تطبيق معادلة كوبن اذ تبين انها تقع ضمن المناخ الصحراوي الحار الجاف والذي يرمز له بالرمز ( BW ) ، جدول (2) خريطة ( 2 )

ان ابرز الصفات التي يتمتع بها مناخ منطقة الدراسة هو ارتفاع معدل درجات الحرارة السنوية وكذلك المدى الحراري اليومي عالي وامطاره قليلة ومتذبذبة لا تزيد عن ( 250 ملم ) في السنة في افضل مناطقه فالصيف حار جداً ترتفع فيه درجات الحرارة والشتاء معتدل نسبياً<sup>(5)</sup> .

#### جدول ( 2 )

مناخ محافظات الفرات الاوسط بحسب تصنيف كوبن للمدة ( 2013 – 2020م)

مجموع محطات المحافظات	المعدل السنوي للأمطار (سم)	المعدل السنوي لدرجة الحرارة (م <sup>0</sup> )	نتيجة المعادلة	صنف المناخ ورمزه
بابل	10.758	23.77	0.453	المناخ الصحراوي الجاف (BW)
كربلاء	9.333	23.82	0.392	المناخ الصحراوي الجاف (BW)
النجف	9.43	23.87	0.395	المناخ الصحراوي الجاف (BW)
الديوانية	8.775	23.78	0.369	المناخ الصحراوي الجاف (BW)
المتن	9.96	24.82	0.401	المناخ الصحراوي الجاف (BW)
الصنف العام لمناخ محطات منطقة الدراسة				

المصدر : الباحث بالاعتماد على تطبيق معادلة كوبن ( ط / ح = 1 ) ، حيث ان ( ط ) تمثل المعدل السنوي للأمطار (سم) و ( ح ) المعدل السنوي لدرجة الحرارة ( م<sup>0</sup> ) ، اما مخرجاتها فيكون المناخ حار جاف اذا كانت نتيجة المعادلة اقل من ( 1 ) ، ومناخ رطب اذا كانت النتيجة اكبر من ( 1 ) . للاستزادة ينظر :- نعمان شحادة ، المناخ العملي ، ط1 ، مطبعة النور النموذجية عمان ، 1983م ، ص 152 .

ولغرض الكشف عن هذا التأثير سيتم دراسة عناصر المناخ المؤثرة بشكل اكثر تفصيلاً لإظهار مدى قوة التأثير الناتجة عن هذا العامل وملاءمته لاستعمالات الارض الزراعية في منطقة الدراسة ، وعلى النحو الاتي


اولاً / الاشعاع الشمسي ( Solar Radiation ) :-

تعد الشمس المصدر الرئيس للطاقة على سطح الارض وغلافها الجوي ، اذ تساهم بحدود (99.97%) من الطاقة المستغلة في الغلاف الجوي وعلى سطح الارض ، وتساهم المصادر الاخرى المتمثلة بباطن الارض وطاقة النجوم وطاقة المد والجزر بجزء ضئيل لا يتجاوز (0.03%)<sup>(6)</sup> .

كما تعد المصدر الاساسي للضوء والحرارة ، لذا فهي تؤثر في المحاصيل الزراعية ، اذ يحتاج المحصول الى الضوء من اجل فصل الكربون عن ثاني اوكسيد الكربون الموجود في الهواء او الماء للحصول على الغذاء الضروري لحياة النبات ، فضلاً عن تأثيره على نمو وتطوير وشكل النبات ويزداد بزيادة شدة الاشعاع الشمسي ويؤثر على عملية التبخر/نتح من اوراق النبات وكلما يصبح الضوء كثيفاً يزداد معدل النتح وتقل هذه العملية عندما تصبح شدة الضوء ضعيفة<sup>(7)</sup> .

ويبرز تأثيره واضحاً على النبات من خلال عملية التمثيل الضوئي والتي تعد من العمليات الكيميائية الحيوية للنبات والتي تعتمد بدرجة رئيسة على الطاقة التي تولدها اشعة الشمس ، وعملية التمثيل الضوئي تعتمد على محددتين اساسيين هما الاشعاع الشمسي الواصل للنبات وكفاءة استعمال النبات للإشعاع في انتاج المواد الجافة ونوعيتها<sup>(8)</sup> .

خريطة ( 2 )  
أقاليم العراق المناخية وموقع محافظات الفرات الاوسط منها بحسب تصنيف كوبن



المصدر : آزاد محمد أمين النقشبندي ومصطفى عبد الله السويدي ، تصنيف مناخ العراق وتحليل خرائط اقاليمه المناخية  
مجلة كلية الاداب جامعة البصرة ، العدد(22) ، السنة (24) مطبعة دار الحكمة ، البصرة ، 1991 ، ص 21

يعتمد الاشعاع الشمسي بالدرجة الاساس على حركة الشمس الظاهرية والتي تحدد زاوية سقوط الاشعاع الشمسي ، ففي منطقة الدراسة يتصف الاشعاع الشمسي بالتباين ما بين شهور الصيف والشتاء ، اذ يتمثل بساعات السطوع الشمسي ( النظرية والفعلية ) ومدى فاعليتها وتأثيرها على نمو النبات وازهاره وهنا يبرز دور السطوع الفعلي<sup>(\*)</sup> على العمليات الفسيولوجية للنبات ، فصفاء السماء وخلوها من الغيوم والملوثات من دقائق الغبار تساعد على زيادة ساعات السطوع الفعلية وترفع من اهميته وتأثيره على النبات وهذا ما يتحقق بنسبة كبيرة في فصل الصيف ، اذ تختلف ساعات السطوع النظرية عن الفعلية .

يتضح من خلال جدول ( 3 ) ان هناك تبايناً زمنياً ومكانياً ، زمانياً ما بين شهور السنة وفصولها ، ومكانياً ما بين محطات منطقة الدراسة ، فساعات السطوع النظرية تتباين ما بين فصلي النمو الصيفي والشتوي ، اذ سجل فصل الصيف اعلى معدل لساعات السطوع النظري في محطتي ( النخيب والسماوة ) اذ بلغ (13.28 ساعة/يوم) لكل منهما ، وادنى معدل سجل في محطة ( الحلة ) بلغ (12.6 ساعة/يوم) ، اما محطتي النجف والديوانية فقد سجلت معدل بلغ ( 12.25 و 13.4 ساعة/يوم ) على التوالي ، خريطة (3).


اما ساعات السطوع الشمسي الفعلية فهي متباينة ايضاً ، اذ سجل اعلى معدل لساعات السطوع الفعلية لفصل الصيف في محطة الحلة اذ بلغت ( 10.12 ساعة/يوم ) وادنى معدل سجل في محطة النجف بلغ ( 9.37 ساعة/يوم ) ، اما محطات النخيب والديوانية والسماوة فقد بلغت معدلاتها ( 9.88 و 9.85 و 9.8 ساعة/يوم ) على التوالي ، خريطة (4).

جدول ( 3 )


المعدلات الشهرية لعدد ساعات سطوع الشمس النظرية والفعلية (ساعة / يوم)  
لمحطات الانواء الجوية في محافظات الفرات الاوسط للفترة ( 2013-2020 )

معدل فصل النمو الصيفي	تشرين الاول		ايلول		آب		تموز		حزيران		مايس		المحافظة	
	سطوع نظري	سطوع فعلي	سطوع نظري	سطوع فعلي	سطوع نظري	سطوع فعلي	سطوع نظري	سطوع فعلي	سطوع نظري	سطوع فعلي	سطوع نظري	سطوع فعلي		
10.12	12.6	8.2	11.1	9.9	12	11.1	13.1	11.2	13.3	10.7	13.2	9.6	12.9	الحلة
9.88	13.28	7.9	12.3	9.1	13.2	10.8	13.4	11.1	13.7	11.2	14.1	9.15	13	كربلاء
9.37	13.25	7.6	12.6	9.3	13.1	10.4	13.3	10.5	13.5	10.1	13.9	8.3	13.1	النجف
9.85	13.4	7.8	12.6	9.6	12.9	10.9	13.7	11.1	13.6	10.9	14.1	8.8	13.5	الديوانية
9.8	13.28	7.7	12.2	9.7	13.1	11	13.8	11.2	14.1	10.7	13.7	8.5	12.8	السماوة

المصدر: جمهورية العراق ، وزارة النقل والمواصلات ، الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، بيانات غير منشورة ، 2021م .



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول ( 3 )



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول ( 3 )

وبشكل عام ترتفع معدلات السطوع النظرية والفعلية في جميع المحطات لأشهر الصيف ( مايس – حزيران – تموز – آب ) ، يعود تباين معدلات السطوع النظرية والفعلية الى حركة الشمس الظاهرية ووقت مرور دوائر العرض الجغرافية امام الشمس ، فضلاً عن الظواهر الجوية التي تعمل على منع او تقليل وصول الاشعاع الشمسي الى سطح الارض كالتغيوم والعواصف الترابية والغبار العالق ، اذ يعمل هذا التباين في معدلات الاشعاع الشمسي على ايجاد تنوعاً في زراعة المحاصيل وبحسب متطلبات المحاصيل الزراعية من مقدار الاشعاع الشمسي الفعلي ، وقد تبين ايضاً أن منطقة الدراسة ترتفع فيها نسبة السطوع الشمسي من ما يجعلها تتمتع بنسبة عالية من الساعات الضوئية والتي تنعكس بشكل ايجابي لصالح المحصول المزروع اذ يصبح فصل النمو طويل يساعد على نمو المحاصيل الزراعية بصورة جيدة ويرفع من انتاجها ونتاجيتها .

## ثانياً - درجة الحرارة (Temperature) :-

تعد درجات الحرارة من اهم عوامل المناخ التي لها التأثير الكبير على النبات في كل مرحلة من مراحل نموه ابتداءً من الانبات وحتى النضج ، اذ تؤثر درجات الحرارة بشكل مباشر وغير مباشر في كل وظيفة من الوظائف الحيوية للنبات ، فهي تؤثر في العمليات الطبيعية كالانتشار والنفذية وامتصاص الماء وتبخره ، وفي كافة العمليات الكيميائية للتحويل الغذائي ، اذ تعتمد هذه العمليات المختلفة على تغير درجة الحرارة ، فترتفع بارتفاعها الى ان تصل الى درجتها المثلى وتنخفض بانخفاض درجات الحرارة الى حد ادنى لتعمل على ابطاء هذه المعدلات لدرجة شديدة<sup>(9)</sup>.

فلكل محصول زراعي حدود حرارية خاصة به تختلف هذه الحدود من محصول لأخر ، فيحتاج هذا المحصول درجة حرارة معينة او مثلى في كل مرحلة من مراحل نموه ، فدرجة حرارة الانبات ( نمو البذور ) تختلف عن درجة الحرارة التي تحتاجها في مرحلة النمو او النضج<sup>(10)</sup> . اذ يتعرض المحصول الى الضرر او الهلاك في بعض الاحيان اذا ما انخفضت درجة الحرارة عن الحد الادنى او تجاوزت الحد الاعلى<sup>(11)</sup> .

كما تؤثر درجة الحرارة على عناصر المناخ الاخرى فهي تعمل على احداث التغيرات في الضغط الجوي والرياح والرطوبة والامطار فضلاً عن تأثيرها على الظواهر الجوية كالتبخر والتكاثف ، اذ يطلق على مجموع طاقة الجزيئات المتحركة للجسم والتي تقاس بالسرعات مصطلح كمية الحرارة اما معدل طاقات الجزيئات المتحركة التي تقاس بالدرجات فيطلق عليها مصطلح درجة الحرارة<sup>(12)</sup> .

فدرجات الحرارة في منطقة الدراسة وبسبب وقوعها ضمن المناخ الصحراوي الحار الجاف فقد اكتسبت خصائصها الحرارية منها ، لذا فقد سجلت درجات الحرارة تطرفاً وتبايناً واضحاً ما بين اشهر السنة وفصولها وما بين محطاتها المناخية وهذا التباين انعكس بدوره على درجات الحرارة الصغرى والعظمى والشهرية والفصلية والسنوية ، ولغرض معرفتها سيتم دراستها على النحو الآتي:-

### 1 - معدل درجات الحرارة الصغرى والعظمى :-

يظهر من خلال جدول (4) ان درجة الحرارة الصغرى والعظمى تتباين زمانياً ومكانياً ، ففي فصل الصيف سجلت درجات الحرارة الصغرى والعظمى ارتفاعاً ملحوظاً ، اذ بلغت معدلات درجة الحرارة الصغرى ادنى معدل لها لهذا الفصل في شهر مايس اذ بلغ معدلها (17.2م°) في محافظة النجف واعلى معدل لها في شهر تموز بلغ (27.3م°) في محافظة النجف ايضاً .

اما درجات الحرارة العظمى فقد سجلت اعلى معدل في شهري تموز وآب اذ بلغت لشهر تموز (45.3م°) لكل من محافظتي ( القادسية والمثنى ) ، اما في شهر آب فقد سجلت معدل بلغ ( 46 م° و 45.7 م°) لكل من محافظتي ( القادسية والمثنى ) على التوالي ، وسجلت ادنى معدل لها في شهر تشرين الثاني بلغ (32.5 م°) في محافظة النجف .

وبصورة عامة فأن معدلات درجات الحرارة الصغرى والعظمى مرتفعة في هذا الفصل ، وكانت شهور (حزيران وتموز وآب) قد سجلت اعلى معدلاتها ، ويعود السبب في ذلك الى حركة الشمس الظاهرية باتجاه النصف الشمالي من الكرة الارضية والتي تتعامد على مدار السرطان في (21 حزيران) اذ يقع الى الجنوب من منطقة الدراسة بعدة دوائر عرض ، اذ اعطى هذا القرب امكانية زيادة عمليات التسخين للشهور الثلاث بسبب زيادة ساعات النهار ( طول النهار ) مع زيادة شدة الاشعاع الشمسي المسؤول عن تراكم الطاقة الحرارية في المنطقة ، فضلاً عن انعدام الغيوم وصفاء السماء الذي يساعد على وصول اكبر كمية من الاشعاع الشمسي لمنطقة الدراسة .



جدول ( 4 )

معدل درجة الحرارة الصغرى والعظمى لمحطات الانواء الجوي الزراعية في محافظات الفرات الاوسط للمدة (2013-2020)

فصل النمو الصيفي		مايس		حزيران		تموز		اب		ايلول		تشرين الاول	
المحافظة	المحطة	ح	ع	ح	ع	ح	ع	ح	ع	ح	ع	ح	ع
بابل	القاسم	38.2	20.8	42.5	24.6	44.9	27.1	45.4	26.9	41.9	23.5	34.7	18.3
	الكفل	37.9	20.3	42.7	24.2	45.2	26.4	45.6	25.8	42.1	22.4	34.5	17.7
	المسيب	37.4	19.5	42.0	22.7	44.5	25.6	44.8	24.5	41.4	21.4	33.4	16.7
	المهناوية	37.0	19.7	41.7	24.0	44.3	26.3	44.4	26.0	41.2	22.4	34.2	18.6
معدل محطات المحافظة		37.6	20.1	42.2	23.9	44.7	26.4	45.1	25.8	41.7	22.4	34.2	17.8
كربلاء	ام غراغر	37.5	19.4	42.0	23.0	44.2	24.9	44.5	24.6	41.1	21.4	34.1	16.9
	الرزازة	37.2	21.4	42.2	25.5	44.9	27.7	45.3	27.5	41.4	23.9	34.1	18.1
	عين التمر	37.9	20.6	43.1	25.0	45.3	27.2	45.5	26.9	41.6	22.9	34.2	17.3
معدل محطات المحافظة		37.5	20.5	42.4	24.5	44.8	26.6	45.1	26.3	41.4	22.7	34.1	17.4
النجف	ام عباسية	38.0	20.7	42.3	24.7	44.4	27.2	44.5	26.5	41.1	23.9	32.3	16.6
	المشخاب	37.2	20.1	41.1	24.6	41.8	26.4	41.7	26.1	38.8	22.7	31.5	17.2
	شبكة	38.1	21.7	42.2	25.5	45.4	28.3	45.3	27.5	41.3	23.7	33.6	17.7
معدل محطات المحافظة		37.8	20.8	41.9	24.9	43.9	27.3	43.8	26.7	40.4	23.4	32.5	17.2
القادسية	الديوانية	38.8	23.1	32.4	25.4	44.9	27.6	45.4	27.4	42.9	23.9	34.2	18.7
	عفك	38.9	20.5	43.1	24.1	45.6	26.6	46.5	26.9	42.6	23.2	35.4	18.1
معدل محطات المحافظة		38.9	21.8	37.8	24.8	45.3	27.1	46	27.2	42.8	23.6	34.8	18.4
المتن	النجمي	38.4	21.8	42.6	24.6	45.2	26.7	45.4	26.1	42.5	23.1	34.5	18.1
	الخضر	38.7	22.4	43.1	25.1	45.8	26.5	46.3	25.7	42.9	22.7	36.3	18.3
	السلمان	38.1	24.1	42.0	27.7	45	28.2	45.3	27.5	41.7	25.0	34.9	19.2
معدل محطات المحافظة		38.4	22.8	42.6	25.8	45.3	27.1	45.7	26.4	42.4	23.6	35.2	18.5

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، شبكة الارصاد الجوية العراقية ، بيانات غير منشورة ، 2021م

2 - معدل درجات الحرارة الشهرية والفصلية :-

يظهر من خلال جدول (5) خريطة (5) ان معدل درجة الحرارة الشهرية والفصلية يتباين في منطقة الدراسة ، ففي فصل الصيف سجل ادنى معدل في محافظة النجف بلغ (31.74 م°) ، و اعلى معدل في محافظة المتن بلغ ( 32.84 م° ) وجاءت محافظات ( بابل - كربلاء - القادسية ) بينهما بمعدلات بلغت (31.84 م° و 31.98 م° و 32.73 م° ) على التوالي .

اما شهريا فقد سجلت ادنى معدل لفصل الصيف في شهر تشرين الاول بلغ (24.87 م°) في محافظة النجف ، اما اعلى معدل لها في شهري تموز وأب في كل من محافظتي ( القادسية والمتن ) اذ بلغ لشهر تموز (36.2 م° و 36.27 م° ) على التوالي ، وأب (36.55 م° و 36.07 م° ) على التوالي .

ثالثاً / الرطوبة النسبية (Relative humidity) :-

تعرف الرطوبة النسبية بأنها نسبة كمية بخار الماء الموجودة فعلاً في الهواء والتي لها حجم ودرجة حرارة محددين وهذه الكمية تصل الى حدها الاقصى الذي يمكن ان يحمله الهواء ( سعة الرطوبة ) ، وبشكل عام يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية ، والتي تنخفض مع زيادة درجات الحرارة وتزداد مع انخفاض درجات الحرارة<sup>(13)</sup>

يرتبط تأثير الرطوبة على المحاصيل الزراعية بدرجة الحرارة ، فدرجات الحرارة العالية والرطوبة النسبية المنخفضة تؤدي الى زيادة عمليات النتح في النبات والتبخر في التربة وهذا ما ينعكس سلباً على الاحتياجات المائية وبالتالي تكون عملية التجهيز المائي اقل من المفقود ، من ما يحصل عدم توازن مائي لصالح المفقود فتقل نسبة الماء في النبات فيتعرض الى الاضرار<sup>(14)</sup> .


## تقييم الملاءمة المكانية بين خصائص المناخ وزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط باستخدام (GIS)

جدول ( 5 )

المعدل الشهري والفصلي لدرجات الحرارة ( م °) لمحطات الانواء الجوي الزراعية في محافظات الفرات الاوسط للمدة (2013- 2020)

المحافظة	المحطة	مايس	حزيران	تموز	اب	ايلول	تشرين الاول	معدل فصل النمو الصيفي
بابل	القاسم	29.5	33.6	36	36.2	32.7	26.5	32.42
	الكفل	29.1	33.5	35.8	35.7	32.3	26.1	32.08
	المسيب	28.5	32.3	35.1	34.7	31.4	25.1	31.18
	المهناوية	28.4	32.9	35.3	35.2	31.8	26.4	31.67
معدل محطات المحافظة								28.88
كربلاء	ام غراغر	28.5	32.5	34.8	34.6	31.3	25.5	31.2
	الرزازة	29.3	33.9	36.3	36.4	32.7	26.1	32.45
	عين التمر	29.3	34.1	36.3	36.2	32.3	25.8	32.33
معدل محطات المحافظة								29.03
النجف	ام عباسية	29.4	33.5	35.8	35.5	32.5	24.5	31.87
	المشخاب	28.7	32.9	34.1	33.9	30.8	24.4	30.8
	شيجة	29.9	33.9	36.9	36.4	32.5	25.7	32.55
معدل محطات المحافظة								29.33
القادسية	الديوانية	30.9	33.9	36.3	36.4	32.9	26.5	32.82
	عفك	29.7	33.6	36.1	36.7	32.9	26.8	32.63
معدل محطات المحافظة								30.3
المتن	النجمي	30.1	33.6	36	35.8	32.8	26.3	32.43
	الخضر	30.6	34.1	36.2	36	32.8	27.3	32.83
	السلمان	31.1	34.9	36.6	36.4	33.4	27.1	33.25
معدل محطات المحافظة								30.6

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، شبكة الارصاد الجوية العراقية ، بيانات غير منشورة ، 2020



ان انخفاض الرطوبة النسبية في الهواء من (95% الى 5% ) تؤدي الى زيادة التبخر /نتج بحدود ست مرات من ما يعرض المحصول المزروع الى الذبول ويزيد من متطلباته المائية<sup>(15)</sup> .  
ومن الاثار السلبية التي تتركها الرطوبة النسبية على المحاصيل الزراعية هي توفير البيئة الملائمة لانتشار الامراض التي تصيب المحاصيل وتقلل من كميات انتاجها<sup>(16)</sup> .  
كما يبرز تأثيرها مباشرة على بعض العمليات الفسيولوجية للنبات خاصة اثناء مرحلتي الازهار والاثمار ، فضلاً عن ان زيادة معدلات النتج لها تأثير على الصفات النباتية كافة<sup>(17)</sup> .  
يتضح من خلال جدول (6) خريطة ( 6 ) ان الرطوبة النسبية تتباين زمانياً ومكانياً ، زمانياً بين شهور السنة ، ومكانياً ما بين محطات منطقة الدراسة .  
فقد سجل فصل النمو الصيفي اعلى نسبة في محافظة بابل بلغت ( 31.21% ) ، وادنى نسبة في محافظة المثنى بلغت (22.59%) ، اما محافظات (كربلاء – النجف- القادسية ) فقد سجلت نسب بلغت ( 28.03 % و29.37% و25.11% ) على التوالي .  
اما شهرياً فقد سجل فصل النمو الصيفي اعلى نسبة في محافظة بابل لشهر (تشرين الاول) بلغت (41.98%) ، وادنى نسبة في محافظة المثنى لشهر (كانون الثاني) بلغت (17.1%) .  
كما يتضح ايضاً ان هناك تناسب عكسي ما بين الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة ، فعندما ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف تنخفض الرطوبة النسبية الى ادنى مستواها ما يعرض المحاصيل الزراعية الى الضرر ، فضلاً عن زيادة عدد الريات لتعويض النقص الحاصل بكميات المياه جراء عملية التبخر/نتج التي تحصل بالتزامن مع قلة الرطوبة النسبية .


#### جدول ( 6 )

معدل الرطوبة النسبية الشهرية ( % ) لمحطات الانواء الجوي الزراعية في محافظات الفرات الاوسط للمدة (2013-2020)

المحافظة	المحطة	مايس	حزيران	تموز	اب	ايلول	تشرين الاول	معدل فصل النمو الصيفي
بابل	القاسم	29.6	22.1	19.5	21.3	24.7	36.9	25.68
	الكفل	34.8	25.1	23.2	25.8	29.9	41.3	30.02
	المسيب	38.2	30.7	28.4	32.2	35.7	45.4	35.1
	المهناوية	39.2	31.1	26.3	29.7	33.6	44.3	34.03
معدل محطات المحافظة								
كربلاء	ام غراغر	38.1	31.9	31.3	34.3	38.7	47.1	36.9
	الرزازة	28.4	19.8	17.9	19.6	23.8	34.3	23.97
	عين التمر	26.6	18.6	17	18.7	24.6	33.8	23.22
معدل محطات المحافظة								
النجف	ام عباسية	34.5	24.8	23.1	27.5	30.8	39.7	30.07
	المشخاب	39.9	29.5	32.7	37.4	40.8	52.2	38.75
	شبيجة	23.3	16.9	12.5	15	17	31.1	19.3
معدل محطات المحافظة								
القادسية	الديوانية	28.9	23.7	22.5	23.9	23.6	37.1	26.62
	عفك	27.1	21.1	18.8	18.9	22.1	33.6	23.6
معدل محطات المحافظة								
المثنى	النجمي	31.6	21.4	19.5	21.3	23.9	35.9	25.6
	الخضر	27.3	18.7	17.4	9.3	21.5	30.8	23.14
	السلمان	26	15.7	14.4	14.8	16.3	26.9	19.02
	معدل محطات المحافظة							
22.59								

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، شبكة الارصاد الجوية العراقية ، بيانات غير منشورة ، 2020م

خريطة ( 6 )  
معدل الرطوبة النسبية (%) لفصل النمو الصيفي في محافظات الفرات الاوسط



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول ( 6 )

## المحور الثاني

### التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط

يعد محصول الذرة الصفراء من المحاصيل ذات الاهمية الغذائية والاقتصادية الكبيرة ، اذ يعود تاريخ معرفة الانسان بالذرة الى (7000 عام ) وهي في الاصل كانت نباتاً برياً يسمى (teasinte) وهو مختلف من حيث التركيب عن محصول الذرة الحالي ، اذ يرجح العلماء ان الذرة الحالية هي هجين من نوعين من النباتات البرية هما (teasinte و tripsacum ) والذي تم تهجينه من قبل الانسان ليكون محصول غذائي مهم ، اذ انتشرت زراعته في المكسيك والتي تعد الموطن الاصلي له ومن ثم الى اجزاء من امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ثم الى الولايات المتحدة وكندا واخذه المستكشفون الاوروبيون الى اوروبا ومن ثم اخذتها التجارة الى كل من اسيا وافريقيا<sup>(18)</sup>.

فمن حيث الاهمية الغذائية والاقتصادية فحبوب الذرة الصفراء تحتوي على قيمة غذائية كبيرة ، اذ يشكل النشأ (72%) والبروتين (10%) والزيوت (4.8%) والالياف (8.5%) والسكر (3%) والرماد (1.7%) ، وهو مصدر جيد للمعادن والفيتامينات ويستخدم في صناعة الزيوت النباتية وصناعة الصابون ، كما يستعمل النشأ في المستحضرات الطبية وكمخففات لمستحضرات التجميل فضلاً عن استعماله في صناعة الكحول ، ويدخل ايضاً في صناعة الخبز والمعجنات بعد خلطه مع الحنطة والشعير ، اما مخلفاته فتستعمل كعلف للحيوانات ولصناعة الورق ، وللذرة فوائد صحية مختلفة اذ تعد جيدة للبشرة وللشعر وللقلب والدماغ ، فضلاً عن فائدتها للجهاز الهضمي فهي تسهل هضم الطعام في المعدة<sup>(19)</sup>.

يزرع المحصول في منطقة الدراسة بالعمرة الخريفية ، اذ تتم زراعته ابتداءً من شهر تموز الى بداية شهر آب وهي المدة الافضل لزراعته وتحصد بعد مرور ( 3.5 - 4 ) شهور قبل التساقط المطري<sup>(20)</sup>.

اذ تبلغ المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء مقدار (136343 دونماً) وبنسبة (27.1%) من مساحة المحاصيل الصيفية ، اما نسبتها من مساحة محاصيل الحبوب في منطقة الدراسة فقد بلغت (5.9%) ، واما نسبتها من مساحة المحصول في العراق فقد بلغت (33.8%)<sup>(21)</sup>.

اما توزيعه الجغرافي في منطقة الدراسة فالمحصول يزرع في وحدات الادارية التي تخلو من زراعة محصول الرز وهذا واضح من خلال تركيز زراعته في محافظة بابل ومحافظة كربلاء وفي المناطق الاخرى التي يقل فيها زراعة محصول الرز ايضاً كما في الوحدات الادارية ضمن محافظات القادسية والنجف والمثنى ، ومن خلال ما تقدم ولكي تكون الصورة اكثر وضوحاً عن التوزيع الجغرافي للذرة الصفراء سيتم دراستها من حيث ( المساحة والانتاج والانتاجية ) وعلى النحو الآتي :- جدول (7) .

#### أ - التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة بابل :-

تنتشر زراعة المحصول في جميع الوحدات الادارية في المحافظة ، اذ يتباين من حيث المساحة والانتاج والانتاجية ما بين هذه الوحدات الادارية .

- من حيث المساحة :- بلغ المجموع الكلي للمساحة المزروعة بالمحصول مقدار (116100 دونماً) اذ تباينت هذه المساحة ما بين الوحدات الادارية في المحافظة ، اذ سجل قضاء الهاشمية اعلى مقدار للمساحة بلغ (52200 دونماً) وبنسبة (45%) ، وادنى مقدار للمساحة سجل في قضاء الحلة اذ بلغ (10250 دونماً) وبنسبة (8.8%) من اجمالي المساحة في المحافظة ، اما على مستوى النواحي فقد سجلت ناحية المدحتية اعلى مساحة مزروعة بلغت (24000 دونماً) وبنسبة (20.7%) وادنى مقدار سجل في مركز قضاء الحلة اذ بلغ (1800 دونماً) وبنسبة (1.6%) ، اما بقية الوحدات الادارية فقد تراوحت مساحتها ما بين (1800 - 2400 دونماً) .

تقييم الملاءمة المكانية بين خصائص المناخ وزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط باستخدام (GIS)

جدول (7)

المساحة المزروعة والانتاج والانتاجية لمحصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط بحسب الوحدات الادارية للموسم الزراعي ( 2019 / 2020 م )

محافظه كربلاء							محافظه بابل						
الانتاجية (كغم /دونم)	%	الانتاج (طن)	%	المساحة (دونم)	الناحية	القضاء	الانتاجية (كغم /دونم)	%	الانتاج (طن)	%	المساحة (دونم)	الناحية	القضاء
1407	48.1	2321.5	36.1	1650	مركز القضاء	كربلاء	997	1.4	1794.6	1.6	1800	مركز القضاء	الحلة
720	14.9	720	21.9	1000	الحسينية		1018	4.7	6108	5.2	6000	الكفل	
870	2.2	104.4	2.6	120	الحر		1050	2	2572.5	2.1	2450	ابو غرك	
999	65.1	3145.9	60.6	2770	المجموع / المعدل للإنتاجية		1022	8	10475.1	8.8	10250	المجموع / المعدل للإنتاجية	
1000	10.4	500	10.9	500	مركز القضاء	عين التمر	1409	4.9	6340.5	3.9	4500	مركز القضاء	المحاويل
835	1.7	83.5	2.2	100	مركز القضاء	الهندية	1512	23.2	30240	17.2	20000	المشروع	
750	3.1	150	4.4	200	الجدول الغربي		1207	5.1	6638.5	4.7	5500	الامام	
950	19.7	950	21.9	1000	الخبرات		1143	7.9	10287	7.8	9000	النيل	
845	24.5	1183.5	28.5	1300	المجموع / المعدل للإنتاجية		1318	41.1	53506	33.6	39000	المجموع / المعدل للإنتاجية	
948	100	4829.4	100	4570	المجموع الكلي / المعدل للإنتاجية		913	2.2	2921.6	2.8	3200	مركز القضاء	المهائمية
محافظه النجف							918	2.5	3213	3	3500	القاسم	
400	20.3	160	23.7	400	مركز القضاء	النجف	943	17.4	22632	20.7	24000	المدحتية	
----	----	----	----	----	الحيدرية		940	13.4	17390	15.9	18500	الشوملي	
----	----	----	----	----	الشبكة		924	2.1	2772	2.6	3000	الطليعة	
400	20.3	160	23.7	400	المجموع / المعدل للإنتاجية		928	37.6	48928.6	45	52200	المجموع / المعدل للإنتاجية	
400	7.6	60	8.9	150	مركز القضاء	الكوفة	990	2.3	2970	2.6	3000	مركز القضاء	المسيب
----	----	----	----	----	العباسية		1150	2.8	3622.5	2.7	3150	سدة الهندية	
----	----	----	----	----	الحرية		-----	----	----	----	----	جرف الصخر	
400	7.6	60	8.9	150	المجموع / المعدل للإنتاجية		1255	8.2	10667.5	7.3	8500	الاسكندرية	
----	----	----	----	----	مركز القضاء	المناذرة	1132	13.3	17260	12.6	14650	المجموع / المعدل للإنتاجية	
500	72.1	568.5	67.4	1137	الحيرة		1100	100	130169.7	100	116100	المجموع الكلي / المعدل للإنتاجية	
500	72.1	568.5	67.4	1137	المجموع / المعدل للإنتاجية								
----	----	----	----	----	مركز القضاء	المشخاب							
----	----	----	----	----	القادسية								
----	----	----	----	----	المجموع / المعدل للإنتاجية								
433.3	100	788.5	100	1687	المجموع الكلي / المعدل للإنتاجية								

تقييم الملاءمة المكانية بين خصائص المناخ وزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط باستخدام (GIS)

محافظة المثنى							محافظة القادسية						
الانتاجية (كغم /دونم)	%	الانتاج (طن)	%	المساحة (دونم)	الناحية	القضاء	الانتاجية (كغم /دونم)	%	الانتاج (طن)	%	المساحة (دونم)	الناحية	القضاء
----	----	----	----	----	مركز القضاء	السماوة	700	15.4	560	14.7	800	ركز القضاء	الديوانية
----	----	----	----	السوير	500		0.7	25	0.9	50	السنية		
----	----	----	----	المجموع / المعدل للإنتاجية	----		----	----	----	----	الشافعية		
----	----	----	----	مركز القضاء	700	57.6	2100	55.0	3000	الدغارة			
----	----	----	----	المجد	الرميثة	633	73.7	2685	70.6	3850	المجموع / المعدل للإنتاجية	عفك	
----	----	----	----	النجمي		----	----	----	----	----	مركز القضاء		
----	----	----	----	الهلال		----	----	----	----	----	نفر		
----	----	----	----	المجموع / المعدل للإنتاجية	600	26.3	960	29.4	1600	البدير			
1267.5	100	8676.3	100	6845	مركز القضاء	السلمان	----	----	----	----	----	سومر	المجموع / المعدل للإنتاجية
----	----	----	----	----	البصية		600	26.3	960	29.4	1600		
----	----	----	----	----	المجموع / المعدل للإنتاجية	----	----	----	----	----	----	مركز القضاء	الشامية
----	----	----	----	----	----	الخضر	----	----	----	----	----	غماس	
----	----	----	----	----	----		----	----	----	----	----	----	
----	----	----	----	----	المجموع / المعدل للإنتاجية	----	----	----	----	----	----	الصلاحية	
----	----	----	----	----	مركز القضاء	----	----	----	----	----	----	----	المجموع / المعدل للإنتاجية
1267.5	100	8676.3	100	6845	المجموع الكلي / المعدل للإنتاجية	----	----	----	----	----	----	مركز القضاء	الحمزة
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	السدير	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	الشافعية	
----	----	----	----	----	المجموع / المعدل للإنتاجية	----	----	----	----	----	----	المجموع / المعدل للإنتاجية	
----	----	----	----	----	المجموع الكلي / المعدل للإنتاجية	616.5	100	3645	100	5450	المجموع الكلي / المعدل للإنتاجية	----	----

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديريات الزراعة في محافظات (بابل – كربلاء – النجف – القادسية – المثنى ) ، بيانات غير منشورة ، 2021 م .

- اما من حيث الانتاج :- فقد بلغ المجموع الكلي للانتاج في المحافظة مقدار (130169.7 طناً) ، يتوزع هذا الانتاج ما بين الوحدات الادارية بصورة متباينة ، اذ سجل اعلى مقدار للانتاج في قضاء المحاويل بلغ (53506 طناً) وبنسبة (41.1%) ، وادنى مقدار سجل في قضاء الحلة اذ بلغ (10475.1 طناً) وبنسبة (8%) ، اما على مستوى النواحي فقد سجلت ناحية المشروع اعلى مقدار للانتاج بلغ (30240 طناً) وبنسبة (23.2%) ، وادنى مقدار سجل في مركز قضاء الحلة اذ بلغ (1794.6 طناً) وبنسبة (1.4%) من اجمالي الانتاج في المحافظة ، اما بقية الوحدات الادارية فقد تراوحت مقاديرها ما بين (1794.6 – 30240 طناً) .

- اما من حيث الانتاجية :- فقد بلغ المعدل العام للإنتاجية في المحافظة (1100 كغم /دونم) ، اذ تباينت معدلات الانتاجية ما بين الوحدات الادارية ، فقد سجل اعلى معدل للإنتاجية في قضاء المحاويل اذ بلغ (1318 كغم /دونم) ، وادنى معدل للإنتاجية سجل في قضاء الهاشمية اذ بلغ (928 كغم /دونم) ، اما على مستوى النواحي فقد سجلت ناحية المشروع اعلى مقدار للإنتاجية اذ بلغ (1512 كغم /دونم) ، وادنى مقدار سجل في مركز قضاء الهاشمية اذ بلغ (913 كغم /دونم) ، اما بقية الوحدات الادارية فقد تراوحت مقاديرها ما بين (913 – 1512 كغم /دونم) .

#### ب- التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة كربلاء :-

تنتشر زراعة محصول الذرة الصفراء في جميع الوحدات الادارية في المحافظة ، اذ تباينت مقاديره من حيث ( المساحة والانتاج والانتاجية ) ، والتي سيتم توضيحها على النحو الآتي :-

- فمن حيث المساحة :- فقد بلغ المجموع الكلي للمساحة المزروعة مقدار (4570 دونماً) موزعة على الوحدات الادارية بصورة متباينة ، اذ سجل قضاء كربلاء اعلى مقدار بلغ (2770 دونماً) وبنسبة (60.6%) ، وادنى مقدار سجل في قضاء عين التمر اذ بلغ (500 دونماً) وبنسبة (10.9%) ، اما على مستوى النواحي فقد سجل مركز قضاء كربلاء اعلى مقدار اذ بلغ (1650 دونماً) وبنسبة (36.1%) ، وادنى مقدار سجل في مركز قضاء الهندية اذ بلغ (100 دونماً) وبنسبة (2.2%) من اجمال المساحة الكلية في المحافظة ، وتراوحت مقادير الوحدات الادارية المتبقية ما بين (100 – 1650 دونماً) .

- اما من حيث الانتاج :- فقد بلغ المجموع الكلي للانتاج مقدار (4829.4 طناً) ، توزع ما بين الوحدات الادارية بصورة متباينة ، اذ سجل قضاء كربلاء اعلى مقدار للانتاج بلغ (3145.9 طناً) وبنسبة (65.1%) ، وادنى مقدار للانتاج سجل في مركز قضاء عين التمر اذ بلغ (500 طناً) وبنسبة (10.4%) ، اما على مستوى النواحي فقد جاء مركز قضاء كربلاء بالمرتبة الاولى بأعلى انتاج اذ بلغ (2321.5 طناً) وبنسبة (48.1%) ، اما ادنى انتاج فقد سجل في مركز قضاء الهندية اذ بلغ (83.5 طناً) وبنسبة (1.7%) من اجمالي الانتاج في المحافظة ، اما بقية الوحدات الادارية فقد تراوحت مقادير الانتاج فيها ما بين (83.5 – 2321.5 طناً) .

- اما من حيث الانتاجية :- فقد بلغ المعدل العام للإنتاجية مقدار (948 كغم /دونم) ، اذ يتباين هذا المقدار ما بين الوحدات الادارية في المحافظة ، اذ سجل اعلى مقدار للإنتاجية في قضاءي ( كربلاء وعين التمر ) اذ بلغ (999 و 1000 كغم /دونم) على التوالي ، اما قضاء الهندية فقد سجل مقدار بلغ (845 كغم /دونم) ، اما على مستوى النواحي فقد سجل مركز قضاء كربلاء اعلى مقدار للإنتاجية اذ بلغ (1407 كغم /دونم) ، وادنى مقدار للإنتاجية سجل في ناحية الحسينية اذ بلغ (720 كغم /دونم) ، اما بقية الوحدات الادارية فقد تراوحت مقاديرها ما بين (720 – 1407 كغم /دونم) .

#### ج - التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة النجف :-

تعد محافظة النجف الادنى من حيث مساحة المحصول اذ يزرع في ثلاث وحدات ادارية هي (مركز قضاء النجف ومركز قضاء الكوفة وناحية الحيرة) ، اذ تشهد هذه الوحدات الادارية تبايناً من حيث (المساحة والانتاج والانتاجية) وعلى النحو الآتي :-



- **فمن حيث المساحة :-** فقد بلغ المجموع الكلي للمساحة المزروعة مقدار (1687 دونماً) موزعة على ثلاث وحدات ادارية ، اذ سجلت اعلى مقدار في ناحية الحيرة اذ بلغ (1137 دونماً) وبنسبة (67.4%) ، وادنى مقدار في مركز قضاء الكوفة اذ بلغ (150 دونماً) وبنسبة (8.9%) ، اما مركز قضاء النجف فقد سجل مقدار بلغ (400 دونماً) وبنسبة (23.7%) ، يعود السبب في قلة المساحة المزروعة بالمحصول الى التوجه نحو زراعة محصول الرز الذي يوجد في المحافظة والذي يعطي مردود مادي اعلى من محصول الذرة الصفراء فضلاً عن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الفلاح في تلك المناطق والتي يوظفها لزراعة الرز .

- **من حيث الانتاج :-** فقد بلغ المجموع الكلي للانتاج مقدار (788.5 طناً) موزعة على ثلاث وحدات ادارية ، اذ سجل اعلى مقدار للانتاج في ناحية الحيرة اذ بلغ (568.5 طناً) وبنسبة (72.1%) ، وادنى مقدار للانتاج سجل في مركز قضاء الكوفة اذ بلغ (60 طناً) وبنسبة (7.6%) من اجمالي الانتاج في المحافظة ، اما مركز قضاء النجف فقد سجل مقدار بلغ (160 طناً) وبنسبة (20.3%) .

- **اما من حيث الانتاجية :-** فقد بلغ المعدل العام للإنتاجية ادنى مستوى له في منطقة الدراسة اذ بلغ (433.3 كغم /دونم) ، اذ تباينت ما بين الوحدات الادارية الثلاث ، اذ سجل اعلى مقدار للإنتاجية في ناحية الحيرة اذ بلغ (500 كغم /دونم) ، وادنى مقدار سجل في مركز قضاءي (النجف والكوفة) اذ بلغ (400 كغم /دونم) .

#### د - التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة القادسية :-

تتركز زراعة المحصول في اربع وحدات ادارية ، ثلاث منها في قضاء الديوانية وواحدة في قضاء عفك ، وعلى الرغم من تركيز المحصول في هذه الوحدات الادارية الا انه يتباين من حيث ( المساحة والانتاج والانتاجية ) وعلى النحو الآتي :-

- **فمن حيث المساحة :-** فقد بلغ المجموع الكلي للمساحة المزروعة بالمحصول مقدار (5420 دونماً) ، موزعة على الوحدات الادارية المزروع فيها ، اذ سجلت ناحية الدغارة اعلى مقدار للمساحة بلغ (3000 دونماً) وبنسبة (55%) ، وادنى مقدار سجل في ناحية السنية اذ بلغ (50 دونماً) وبنسبة (0.9%) ، اما مركز قضاء الديوانية وناحية البدير فقد سجلت مقدار بلغ (800 و 1600 دونماً) وبنسبة (14.7% و 29.4%) على التوالي .

- **اما من حيث الانتاج :-** فقد بلغ المجموع الكلي للانتاج مقدار بلغ (3645 طناً) ، موزع على الوحدات الادارية المزروع فيها المحصول ، اذ سجلت ناحية الدغارة اعلى مقدار للانتاج اذ بلغ (2100 طناً) وبنسبة (57.6%) ، وادنى مقدار سجل في ناحية السنية اذ بلغ (25 طناً) وبنسبة (0.7%) من اجمالي الانتاج في المحافظة ، اما ( مركز قضاء الديوانية وناحية البدير ) فقد سجلا مقدار (560 و 960 طناً) على التوالي .

- **اما من حيث الانتاجية :-** فقد بلغ المعدل العام للإنتاجية مقدار بلغ (616.5 كغم /دونم) ، اذ تباين هذا المعدل ليسجل اعلى مقدار في (مركز قضاء الديوانية وناحية الدغارة) اذ بلغ (700 كغم /دونم) لكل منهما ، وادنى مقدار سجل في ناحية السنية اذ بلغ (500 كغم /دونم) ، اما ناحية البدير فقد بلغ مقدار الانتاجية فيها (600 كغم /دونم) .

#### ه - التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء في محافظة المثنى :-

يزرع محصول الذرة الصفراء في مركز قضاء السلطان والذي يضم المنطقة الغربية من محافظة المثنى ، اذ بلغت المساحة المزروعة بالمحصول مقدار (6845 دونماً) وبواقع انتاج بلغ (8676.3 دونماً) ، اما انتاجيته فقد بلغت (1267.5 كغم /دونم) .

ولغرض ان تتضح صورة التوزيع الجغرافي فقد تم دراسة محصول الذرة الصفراء بحسب الفئات ومن حيث (المساحة والانتاج والانتاجية) ، اذ صنفت الى خمسة فئات وعلى النحو الآتي :-

- **فمن حيث المساحة :-** فقد بلغ المعدل العام للمساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء مقدار (4488.4 دونماً) مقسمة على الوحدات المزروع فيها المحصول وبحسب الفئات الآتية :- خريطة (7) .

- الفئة الاولى (صفر) لا توجد فيها مساحة مزروعة :- ضمت هذه الفئة (29) وحدة ادارية بلغت نسبتها (49.1%) من مجموع الوحدات الادارية ، وهي نسبة مرتفعة اذ استحوذت على نصف عدد الوحدات الادارية وهذا ما انعكس سلباً على انتاج المحصول في منطقة الدراسة ، يعود السبب في عدم زراعة المحصول في هذه الوحدات الادارية الى العديد من العوامل منها ان هذه الوحدات الادارية اغلبها تزرع بمحصول الرز الذي يكون اكثر منفعة مادية منه فضلاً عن الظروف الطبيعية التي تتلاءم وزراعة محصول الرز .

- الفئة الثانية (50 – 6038 دونماً) :- ضمت هذه الفئة (24) وحدة ادارية بلغت نسبتها (40.7%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل مساحتها (1992 دونماً) وهو معدل منخفض بالمقارنة مع المعدل العام للمساحة والبالغ (4488.4 دونماً) .


- الفئة الثالثة (6039 – 12025 دونماً) :- ضمت هذه الفئة (3) وحدات ادارية بلغت نسبتها (5.1%) من مجموع الوحدات الادارية وبمعدل مساحة بلغت (8115 دونماً) ، وهي مساحة اعلى من المعدل العام للمساحة والبالغ (4488.4 دونماً) .

- الفئة الرابعة (12026 – 18013 دونماً) :- لا توجد وحدات ادارية ضمن هذه الفئة .


- الفئة الخامسة (18014 – 24000 دونماً) :- ضمت هذه الفئة (3) وحدات ادارية بلغت نسبتها (5.1%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل مساحتها (20833.3 دونماً) وهي اعلى من المعدل العام للمساحة والبالغ (4488.4 دونماً) ، وتعد اعلى مساحة سجلت في منطقة الدراسة .

يتضح من خلال ما تقدم ان هناك انخفاض في المساحة المزروعة بالمحصول ، اذ سجلت الفئتين الاولى والثانية نسبة (89.8%) ، وهي نسبة مرتفعة جداً عكست صورة واقع المساحة المنخفضة لزراعة المحصول في منطقة الدراسة .

- **اما من حيث الانتاج :-** فقد بلغ المعدل العام للإنتاج في منطقة الدراسة (4867.3 طناً) موزعة على الوحدات الادارية التي يزرع فيها المحصول وبحسب الفئات الآتية :- خريطة (8) .



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول (7)




المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول (7)

- **الفئة الاولى (صفر) لا توجد مساحة مزروعة :-** ضمت هذه الفئة (29) وحدة ادارية بلغت نسبتها (49.1%) من مجموع الوحدات الادارية وهي خالية من انتاج المحصول بسبب عدم زراعته فيها .
- **الفئة الثانية (25 – 7579 طنناً) :-** ضمت هذه الفئة (24) وحدة ادارية بلغت نسبتها (40.7%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل انتاجها (1921.9 طنناً) وهو معدل منخفض بالمقارنة مع المعدل العام والبالغ (4867.3 طنناً) .
- **الفئة الثالثة (7580 – 15133 طنناً) :-** ضمت هذه الفئة (3) وحدات ادارية بلغت نسبتها (5.1%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل انتاجها (9876.9 طنناً) وهو معدل مرتفع سجل اعلى من المعدل العام والبالغ (4867.3 طنناً) .
- **الفئة الرابعة (15134 – 22686 طنناً) :-** ضمت هذه الفئة (2) وحدة ادارية بلغت نسبتها (3.4%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل انتاجها (20011 طنناً) ، وهو اعلى من المعدل العام في منطقة الدراسة والبالغ (4867.3 طنناً) .
- **الفئة الخامسة (22687 – 30240 طنناً) :-** ضمت هذه الفئة وحدة ادارية واحدة متمثلة بناحية المشروع والتي بلغت نسبتها (1.7%) من مجموع الوحدات الادارية ، وهي نسبة قليلة جداً ، اذ سجلت مقدار للانتاج بلغ (30240 طنناً) وهو الانتاج الاعلى في عموم منطقة الدراسة .
- **اما من حيث الانتاجية :-** بلغ المعدل العام للإنتاجية في منطقة الدراسة ، مقدار (932.3 كغم /دونم) ، وهو ادنى من المعدل العام للإنتاجية في العراق والبالغ (1175.7 كغم /دونم)<sup>(22)</sup> ، واما بالمقارنة مع دول الجوار والدول العربية الاخرى ، فضلاً عن الدول ذات التجارب العلمية المتقدمة في الجانب الزراعي ، فقد سجلت منطقة الدراسة ادنى معدل انتاجية من جميع هذه الدول ما عدا تونس فقد سجلت اعلى منها اذ بلغت انتاجيتها (508.1 كغم /دونم) ، اذ جاءت الاردن بأعلى انتاجية لدول الجوار بلغت (2947 كغم /دونم) ، وجاءت (الامارات وعمان وقطر) بأعلى انتاجية في الدول العربية اذ بلغت (3080 و 2953.3 و 3095 كغم /دونم) على التوالي ، يعكس هذا الارتفاع في الانتاجية الى مدى التطور الحاصل لدى هذه الدول في الجانب الزراعي ، وكذلك الحال مع الدول المتقدمة علمياً وتقنياً فقد كان هنالك فارق كبير في الانتاجية ، اذ سجلت ( الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا والبرازيل) اعلى انتاجية بلغت (2633.1 و 2309.1 و 2132.2 و 2202.4 و 2496.5 و 2309.5 كغم /دونم)<sup>(23)</sup> ، يعكس ذلك الفارق في الانتاجية مدى التطور في جانب الصناعات الزراعية اي صناعة المستلزمات الزراعية ، فضلاً عن معالجة التربة بإضافة المخصبات لها ، وفي جانب البذور المحسنة فقد عملت هذه الدول على ايجاد سلالات جديدة من البذور المحسنة التي تتلاءم والظروف الطبيعية فيها ، اما في جانب الصرف الداخلي فقد عملت هذه الدول على انشاء شبكات من المبالز المغطاة التي تعمل على ابقاء التربة في تهوية دائمة من خلال سحب المياه الزائدة في طبقات التربة الاولى ، وهذه العوامل مجتمعة انعكست ايجابياً على رفع مستوى الانتاجية فيها .
- ولتحديد فئات الانتاجية في منطقة الدراسة سيتم دراستها على النحو الآتي :- خريطة (9) .
- **الفئة الاولى (صفر) لا توجد انتاجية :-** ضمت هذه الفئة (29) وحدة ادارية بلغت نسبتها (49.1%) من مجموع الوحدات الادارية ، وهي خالية من الانتاجية بسبب عدم زراعة المحصول فيها .
- **الفئة الثانية (679 – 956 كغم /دونم) :-** ضمت هذه الفئة (12) وحدة ادارية بلغت نسبتها (20.3%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل انتاجيتها مقدار (846.9 كغم /دونم) ، وهي انتاجية ادنى من المعدل العام للإنتاجية والبالغ (932.3 كغم /دونم) .
- **الفئة الثالثة (400 – 678 كغم /دونم) :-** ضمت هذه الفئة (5) وحدات ادارية بلغت نسبتها (8.5%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل انتاجيتها (480 كغم /دونم) ، وهي انتاجية ادنى من المعدل العام للإنتاجية والبالغ (932.3 كغم /دونم) .

- الفئة الرابعة (957 – 1234 كغم /دونم) :- ضمت هذه الفئة (8) وحدات ادارية بلغت نسبتها (13.6%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل انتاجيتها (1069.4 كغم /دونم) وهي اعلى من المعدل العام للإنتاجية والبالغ (932.3 كغم /دونم) .

- الفئة الخامسة (1235 – 1512 كغم /دونم) :- ضمت هذه الفئة (5) وحدات ادارية بلغت نسبتها (8.5%) من مجموع الوحدات الادارية ، اذ بلغ معدل انتاجيتها (1370.1 كغم /دونم) وهي الانتاجية الاعلى في منطقة الدراسة ، وهي اعلى من المعدل العام للإنتاجية والبالغ (932.3 كغم /دونم) .



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول ( 7 )

## 2 - المتطلبات البيئية لمحصول الذرة الصفراء :-

لمحصول الذرة الصفراء متطلبات مناخية يحتاجها لكي ينمو بصورة جيدة اذا كانت هذه المتطلبات متوفرة بصورة ملائمة لزراعته في منطقة ما وهذه المتطلبات يمكن التطرق لها على النحو الآتي:- جدول (8) .  
يعد محصول الذرة الصفراء من المحاصيل التي تحتاج الى مقادير من عناصر المناخ المتمثلة بـ (درجة الحرارة والاشعاع الشمسي والرطوبة النسبية) ، اذ يحتاج المحصول الى متوسط درجة حرارة خلال مرحلة النمو تتراوح ما بين (24 - 40 م<sup>0</sup>) وهي متفاوتة من حيث الملاءمة فالأكثر ملائمة تقع ضمن الفئة الاولى (S1) والتي تتراوح ما بين (24 - 32 م<sup>0</sup>) ، والاقبل ملائمة منها تقع ضمن الفئتين (S2 ، S3) والتي تتراوح مقاديرها ما بين (32 - 40 م<sup>0</sup>) ، اما اذا سجلت درجة الحرارة ارتفاعاً يزيد على (40 م<sup>0</sup>) فإن المحصول سيصاب بلفحة الشمس وبالتالي سيتعرض الى الضرر وقد تؤدي الى موته اذا ما استمرت لوقت

طويل ، كما يحتاج المحصول الى متوسط درجة حرارة عظمى لأحر الشهور يتراوح ما بين (17 - 30 م<sup>0</sup>) وهي ضمن الحدود المناخية لزراعة المحصول اذ تباينت من حيث الملاءمة ، فالمقدار الذي يتراوح ما بين (17 - 24 م<sup>0</sup>) هو الاعلى ملاءمة والاقرب للمثالية والذي يقع ضمن الفئة الاولى (S1) ، والمقدار الذي يتراوح ما بين (24 - 30 م<sup>0</sup>) فإنه اقل ملاءمة من الفئة الاولى والذي يقع ضمن الفئتين (S3,S2) ، اما اذا ازدادت درجة الحرارة العظمى عن (30 >) فإنها ستؤثر سلبا على المحصول ، كما يحتاج المحصول الى درجات حرارة متجمعة تتراوح ما بين (2400 - 2800 م<sup>0</sup>) .

- اما بالنسبة للرطوبة النسبية فالمحصول يحتاج الى نسبة من الرطوبة في مرحلتي (التطور والنضج) ، اذ يحتاج الى رطوبة نسبية في مرحلة التطور (الشهر الثاني) تتراوح ما بين (30 - 65 %) ، اذ تتفاوت من حيث الملاءمة ، فالنسبة التي تتراوح ما بين (42 - 65%) هي الاعلى ملاءمة والتي تقع ضمن الفئة الاولى (S1) ، اما النسبة التي تتراوح ما بين (30 - 42%) فإنها اقل ملاءمة للمحصول ، اما اذا قلت النسبة عن (30%) فإن المحصول لا يمكن ان يستفاد منها بشكل جيد وبالتالي يحتاج الى كميات اضافية من مياه الري ، اما في مرحلة النضج فيحتاج المحصول الى نسبة من الرطوبة تتراوح ما بين (40 - ادنى من 20 %) ، اذ تجود حبوب الذرة الصفراء اذا كانت النسبة تقع ضمن الفئة الاولى (S1) والتي تتراوح ما بين (40 - 24%) اذ تعد مثالية للمحصول لأنها تساعده في الحصول على كفايته من الرطوبة وبالتالي يكون المحصول اكثر جودة واعلى انتاجية ، وتأتي بعدها النسبة التي تقع ضمن الفئتين (S3,S2) والتي تتراوح ما بين (24 - ادنى من 20 %) .

- اما بالنسبة للإشعاع الشمسي فإن المحصول يحتاج الى مقدار من الاشعاع الشمسي الفعلي في مرحلتي (التطور الشهر الثاني و النضج ) اذ يحتاج الى مقدار من الاشعاع الشمسي في مرحلة التطور يتراوح ما بين (0.55 - اصغر من 0.35 %) وهي كمية كافية تساعد المحصول على النمو بصورة سليمة ، اما في مرحلة النضج فيحتاج الى مقدار من الاشعاع الشمسي يتراوح ما بين (اكبر من 0.7 > - اصغر من 0.5 < %) .

#### جدول ( 8 )

#### المتطلبات المناخية الملاءمة لمحصول الذرة الصفراء

الفئات - ودرجات المحددات - ووزن التصنيف						خصائص المناخ
N2	N1	S3	S2	S1		
4	3	2	1	0		
0	25	40	60	85	95	100
> 40	---	35-40	32-35	26-32	24-26	متوسط درجة الحرارة خلال مرحلة النمو (م <sup>0</sup> )
> 30	---	28-30	24-28	18-24	17-18	متوسط درجة الحرارة الصغرى خلال مرحلة النمو (م <sup>0</sup> )
< 30	---	36-30	42-36	50-42	65-50	الرطوبة النسبية في مرحلة التطور ( الشهر الثاني ) (%)
---	---	< 20	24-20	30-24	40-30	الرطوبة النسبية في مرحلة النضج (%)
---	---	---	< 0.35	0.5-0.35	0.55-0.5	السطوع الفعلي / السطوع النظري خلال مرحلة التطور (الشهر الثاني)
---	---	---	< 0.5	0.7- 0.5	> 0.7	السطوع الفعلي / السطوع النظري في مرحلة النضج

Source : Ir. C. Sys et al, Part III(Land appraisal) Crop Requirements, Op – cit , 1993, p<sup>84-85</sup> .

### المحور الثالث

#### تقييم وتصنيف ملاءمة خصائص المناخ لزراعة محصول الذرة الصفراء

بعد دراسة خصائص المناخ والمتطلبات المناخية لمحصول الذرة الصفراء ، فضلاً عن تحديد تلك المتطلبات بمعايير ركزت على ( درجة الحرارة والرطوبة النسبية والأشعاع الشمسي ) ، اذ تم ادخالها واعادة تصنيفها بعد اجراء عملية النمذجة الخرائطية باستخدام نموذج الملاءمة المكانية (Model Builder) في برنامج (GIS) لاستخراج افضل المناطق الملاءمة لزراعة المحصول والتي سيتم دراستها على النحو الآتي :-

أ- متوسط درجة الحرارة خلال مرحلة النمو :- اتضح من خلال جدول (9) وخريطة (10) ان هنالك ثلاثة فئات للملاءمة هي (S1 – S2 – S3) ، اذ تمثلت بالفئة الاولى فئة (الملاءمة العالية S1) والتي بلغت مساحتها (27286000 دونماً) ونسبة (69%) ، اما الفئة الثانية فئة (الملاءمة المتوسطة S2) فقد بلغت مساحتها (7747200 دونماً) ونسبة (19.6%) اما الفئة الثالثة فئة (الملاءمة الحدية S3) والتي بلغت مساحتها (4514800 دونماً) ونسبة (11.4%) من مساحة منطقة الدراسة .


#### جدول ( 9 )

فئات ملاءمة متوسط درجة الحرارة خلال مرحلة النمو لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الأوسط

النسبة المئوية	المساحة (دونم)	المساحة (كم <sup>2</sup> )	فئات الملاءمة
69	27286000	68215	ملاءمة عالية S1
19.6	7747200	19368	ملاءمة متوسطة S2
11.4	4514800	11287	ملاءمة حدية S3
100	39548000	98870	المجموع


المصدر : الباحث بالاعتماد على خريطة ( 10 ) وبرنامج ( Arc Map Gis 10.7.1 )

خريطة ( 11 )  
تقييم وتصنيف ملاءمة درجة الحرارة الصغرى خلال مرحلة النمو لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الأوسط



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول ( 4 - 8 ) وبرنامج ( Arc Mip Gis10.7.1 ) وتطبيق (Model Builder)

خريطة ( 10 )  
تقييم وتصنيف ملاءمة متوسط درجة الحرارة خلال مرحلة النمو لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الأوسط



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول ( 5 - 8 ) وبرنامج ( Arc Mip Gis10.7.1 ) وتطبيق (Model Builder)

ب - درجة الحرارة الصغرى خلال مرحلة النمو :- اتضح من خلال جدول (10) وخريطة (11) ان هنالك ثلاثة فئات للملاءمة هي (S3 - S2 - S1) ، اذ تمثلت بالفئة الاولى فئة (الملاءمة العالية S1) والتي بلغت مساحتها (20989200 دونماً) وبنسبة (78.4%) وهي نسبة مرتفعة جداً تعطي امكانية كبيرة على زراعة المحصول والتوسع فيه ، اما الفئة الثانية فئة (الملاءمة المتوسطة S2) والتي بلغت مساحتها (5134000 دونماً) وبنسبة (13%) ، اما الفئة الثالثة فئة (الملاءمة الحدية S3) والتي بلغت مساحتها (3424800 دونماً) وبنسبة (8.6%) من مساحة منطقة الدراسة .

جدول ( 10 )

فئات ملاءمة درجة الحرارة الصغرى خلال مرحلة النمو لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط

النسبة المئوية	المساحة (دونم)	المساحة (كم <sup>2</sup> )	فئات الملاءمة
78.4	30989200	77473	ملاءمة عالية S1
13	5134000	12835	ملاءمة متوسطة S2
8.6	3424800	8562	ملاءمة حدية S3
100	39548000	98870	المجموع

المصدر : الباحث بالاعتماد على خريطة ( 11 ) وبرنامج ( Arc Map Gis 10.7.1 )

ج - الرطوبة النسبية خلال مرحلة التطور :- اتضح من خلال جدول (11) وخريطة (12) ان هنالك ثلاثة فئات للملاءمة هي (N2- S3 - S2 - S1) ، اذ تمثلت بالفئة الاولى فئة (الملاءمة العالية S1) والتي بلغت مساحتها (18393200 دونماً) وبنسبة (46.5%) ، اما الفئة الثانية فئة (الملاءمة المتوسطة S2) فقد بلغت مساحتها (11790000 دونماً) وبنسبة (29.8%) ، اما الفئة الثالثة فئة (الملاءمة الحدية S3) والتي بلغت مساحتها (6223200 دونماً) وبنسبة (15.7%) ، اما الفئة الاخيرة فئة (غير الملاءمة نهائياً N2) والتي بلغت مساحتها (3141600 دونماً) وبنسبة (8%) من مساحة منطقة الدراسة .

جدول ( 11 )

فئات ملاءمة الرطوبة النسبية خلال مرحلة التطور لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط

النسبة المئوية	المساحة (دونم)	المساحة (كم <sup>2</sup> )	فئات الملاءمة
46.5	18393200	45983	ملاءمة عالية S1
29.8	11790000	29475	ملاءمة متوسطة S2
15.7	6223200	15558	ملاءمة حدية S3
8	3141600	7854	غير ملاءمة نهائياً N2
100	39548000	98870	المجموع

المصدر : الباحث بالاعتماد على خريطة ( 12 ) وبرنامج ( Arc Map Gis 10.7.1 )

د - الرطوبة النسبية خلال مرحلة النضج :- اتضح من خلال جدول (12) وخريطة (13) ان هنالك ثلاثة فئات للملاءمة هي (S3 - S2 - S1) ، اذ تمثلت بالفئة الاولى فئة (الملاءمة العالية S1) والتي بلغت مساحتها (15936800 دونماً) وبنسبة (40.3%) ، اما الفئة الثانية فئة (الملاءمة المتوسطة S2) والتي


جدول ( 12 )

فئات ملاءمة الرطوبة النسبية خلال مرحلة النضج لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط


النسبة المئوية	المساحة (دونم)	المساحة (كم <sup>2</sup> )	فئات الملاءمة
40.3	15936800	39842	ملاءمة عالية S1
30.7	12145200	30363	ملاءمة متوسطة S2
29	11466000	28665	ملاءمة حدية S3
100	39548000	98870	المجموع

المصدر : الباحث بالاعتماد على خريطة ( 13 ) وبرنامج ( Arc Map Gis 10.7.1 )

بلغت مساحتها (12145200 دونماً) ونسبة (30.7%) ، اما الفئة الثالثة فئة (الملاءمة الحدية S3) والتي بلغت مساحتها (11466000 دونماً) ونسبة (29%) من مساحة منطقة الدراسة ، لا تعد الرطوبة النسبية عائقاً امام زراعة المحصول اذ انه لا يحتاج الى نسبة كبيرة من الرطوبة في هذه المرحلة من النمو .



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدولي ( 6 - 8 ) وبرنامج (Arc Mip Gis10.7.1) وتطبيق (Model Builder)



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدولي ( 6 - 8 ) وبرنامج (Arc Mip Gis10.7.1) وتطبيق (Model Builder)

ه - **الاشعاع الشمسي خلال مرحلة التطور :-** اتضح من خلال جدول (13) وخريطة (14) ان هنالك فئتان للملاءمة هي (S1 - S2) ، اذ تمثلت بالفئة الاولى فئة (الملاءمة العالية S1) والتي بلغت مساحتها (29460800 دونماً) ونسبة (74.5%) ، اما الفئة الثانية فئة (الملاءمة المتوسطة S2) والتي بلغت مساحتها (10087200 دونماً) ونسبة (25.5%) من مساحة منطقة الدراسة ، يتضح من ما سبق ان الاشعاع الشمسي جيد جداً يساعد المحصول في عملية النمو وتكوين الثمار .

#### جدول ( 13 )

فئات ملاءمة السطوع الشمسي خلال مرحلة التطور لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط

النسبة المئوية	المساحة (دونم)	المساحة (كم <sup>2</sup> )	فئات الملاءمة	
74.5	29460800	73652	ملاءمة عالية	S1
25.5	10087200	25218	ملاءمة متوسطة	S2
100	39548000	98870	المجموع	

المصدر : الباحث بالاعتماد على خريطة ( 14 ) وبرنامج (Arc Map Gis 10.7.1)

و- **الاشعاع الشمسي خلال مرحلة النضج :-** يحتاج المحصول الى مقادير من الاشعاع الشمسي خلال هذه المرحلة والتي تتوافر بشكل جيد في منطقة الدراسة خلال فصل الصيف ، اذ اتضح من خلال جدول (14) وخريطة (15) ان هنالك فئتان للملاءمة هي (S1 - S2) ، اذ تمثلت بالفئة الاولى فئة (الملاءمة العالية S1) والتي بلغت مساحتها (29329600 دونماً) ونسبة (74.2%) ، اما الفئة الثانية فئة (الملاءمة المتوسطة S2) والتي بلغت مساحتها (10218400 دونماً) ونسبة (25.8%) من مساحة منطقة الدراسة .





جدول ( 14 )

فئات ملاءمة السطوح الشمسي خلال مرحلة النضج لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الأوسط

النسبة المئوية	المساحة (دونم)	المساحة (كم <sup>2</sup> )	فئات الملاءمة	
74.2	29329600	73324	ملاءمة عالية	S1
25.8	10218400	25546	ملاءمة متوسطة	S2
100	39548000	98870	المجموع	

المصدر : الباحث بالاعتماد على خريطة ( 15 ) وبرنامج ( Arc Map Gis 10.7.1 )




### ز - الملاءمة المكانية للخصائص المناخية لزراعة محصول الذرة الصفراء :-

من خلال دراسة خصائص المناخ وبحسب فئات الملاءمة وبعد اعادة تصنيفها تم عمل نموذج للملاءمة المكانية لجميع هذه الخصائص لاستخراج خريطة نهائية لملاءمة المناخ لزراعة المحصول وتم ذلك بعملية النمذجة الخرائطية باستخدام اداة التركيب الموزون (Weighted Overlay) واعطاء وزن لكل خاصية بحسب اهميتها وتأثيرها ، وبعد اتمام عملية النمذجة الخرائطية لها اتضح ومن خلال شكل (1) وخريطة (16) و جدول (15) ان هنالك اربع فئات للملاءمة المكانية هي (S1 - S2 - S3 - N1) ، والتي تمثلت بالفئة الاولى فئة (الملاءمة العالية S1) والتي بلغت مساحتها (20096800 دونماً) وبنسبة (50.8%) ، اما الفئة الثانية فئة (الملاءمة المتوسطة S2) فقد بلغت مساحتها (11390800 دونماً) وبنسبة (28.8%) ، اما الفئة الثالثة فئة (الملاءمة الحدية S3) والتي بلغت مساحتها (4917200 دونماً) وبنسبة (12.4%) ، شكلت الفئات الملاءمة نسبة عالية جداً بلغت (92%) من مساحة منطقة الدراسة اي ان عامل المناخ لا يعد عائقاً امام زراعة المحصول وبالتالي بالإمكان استثمار مساحات واسعة بزراعته اذا ما توافرت المتطلبات البيئية الاخرى ، اما الفئة الاخيرة فتمثلت بفئة (غير الملاءمة حالياً N1) والتي بلغت مساحتها (3143200 دونماً) وبنسبة (8%) وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع الفئات الاخرى .

شكل (1)


نموذج الملاءمة المكانية المناخ لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط



المصدر : الباحث بالاعتماد على برنامج (Arc Map GIS) وتطبيق (Model Builder)

خريطة ( 16 )

تقييم وتصنيف الملاءمة المكانية لخصائص المناخ لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط



المصدر : الباحث بالاعتماد على جدول ( 8 ) وبرنامج (Arc Mip Gis10.7.1) وتطبيق (Model Builder)

جدول ( 15 )

فئات الملاءمة المكانية للخصائص المناخية لزراعة محصول الذرة الصفراء في محافظات الفرات الاوسط

النسبة المئوية	المساحة (دونم)	المساحة (كم <sup>2</sup> )	فئات الملاءمة	
50.8	20096800	50242	ملاءمة عالية	S1
28.8	11390800	28477	ملاءمة متوسطة	S2
12.4	4917200	12293	ملاءمة حدية	S3
8	3143200	7858	غير ملاءمة حالياً	N1
100	39548000	98870	المجموع	

المصدر : الباحث بالاعتماد على خريطة ( 16 ) وبرنامج ( Arc Map Gis 10.7.1 )

الاستنتاجات والمقترحات

الاستنتاجات

- 1- تبين من خلال البحث ان القسم الاعظم من منطقة الدراسة تتمتع بمناخ ملائم بدرجة كبيرة لزراعة محصول الذرة الصفراء اذ سجلت الفئتين (S2-S1) العالية الملاءمة والمتوسطة الملاءمة النسب الاعلى اذ بلغت (79.6%) من نسبة مساحة منطقة الدراسة خاصة في الاراضي التي تقع ضمن السهل الرسوبي .
- 2- اتضح ان التوزيع الجغرافي لمحصول الذرة الصفراء غير منتظم ، اذ لم تستثمر مساحات كبيرة بزراعة المحصول على الرغم من تمتع منطقة الدراسة بمناخ جيدة لزراعته .
- 3- ان لنظم المعلومات الجغرافية دور مهم في تقييم وتصنيف الاراضي بحسب ملاءمتها للمحصول والتي اظهرت ثلاث فئات للملاءمة هي (N2 – S3-S2-S1) .

المقترحات

- 1- ضرورة العمل من قبل الجهات الرسمية في محافظات الفرات الاوسط على توجيه الفلاح بضرورة زراعة المحصول في الاراضي ذات المناخ المثالي .
- 2- انشاء مراكز متخصصة بنظم المعلومات الجغرافية تعمل على تحديد افضل الاراضي من حيث ملاءمة مناخها لزراعة محصول الذرة الصفراء .

الهوامش

- 1 ( جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، المجموعة الاحصائية السنوية ، 2019م ، ص<sup>10</sup> .
  - 2) David G.Rossiter , Atheoretical Framework for Land Evaluation , Elsevier Scientific , Geoderma , (72) , 1990 , p<sup>2</sup> .
  - 3) محمد الخزامي عزيز ، نظم المعلومات الجغرافية ((اساسيات وتطبيقات للجغرافيين)) منشأة المعارف بالإسكندرية ، الاسكندرية ، 1998م ، ص<sup>18</sup> .
  - 4) FAO , land Evaluation for rainfed Agriculture , Food and Agriculture , Organization of The United Nations , Soils Bulletin 52 . Italy : Rome , 1983 , p<sup>22</sup>
  - 5) علي احمد غانم ، الجغرافية المناخية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط1 ، عمان ، 2003م ، ص<sup>271</sup> .
  - 6) نعمان شحادة ، علم المناخ ، مطبعة النور النموذجية ، ط2 ، الجامعة الاردنية ، 1983م ، ص<sup>61</sup> .
  - 7) حسن ابو سمور ، الجغرافية الحيوية والتربة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط2 ، عمان ، 2009م ، ص<sup>75</sup>
  - 8) Mohammad Passarakli , Hand book and crop physiology , Second Edition Revised and Expanded , Tucson ,Arizona , New York , 2001 , p821 .
- (\* تمثل ساعات السطوح الفعلية ساعات السطوح النظرية مطروحاً منها ساعات الجو الغائم وساعات العواصف الترابية والتي تقاس بالأجهزة المستغلة لقياس الاشعاع الشمسي مثل كرة كامبل ستوكس .  
للاستزادة ينظر : عبد الاله رزوقي كربل وماجد السيد ولي ، علم الطقس والمناخ ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، 1986م ، ص<sup>43</sup> .
- 9) ابراهيم بن سليمان الأحيدب ، المناخ والحياة ( دراسة في المناخ التطبيقي ) ، مطبعة نور البرازي ، الرياض ، 2003م ، ص<sup>54</sup>

- 10) علي احمد غانم ، المناخ التطبيقي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 2010م ، ص 157 .
- 11) يوسف عبد المجيد فايد ، جغرافية المناخ والنبات ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 2011م ، ص 138 .
- 12) صادق جعفر الصراف ، علم البيئة والمناخ ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1980م ، ص 69 .
- 13) Amrita Bajaj and other , fundamentals of physical geography , Uttaraan prakashan , Haldwani , First , 2017 , p<sup>149-150</sup>
- 14) سلمى عبد الرزاق عبد لايد ووفاء حسين علي ، الخصائص المناخية ودورها في اقامة المشاريع الزراعية الحكومية في محافظة كربلاء ، مجلة الباحث ، العدد (31) ، السنة (2019) ، ص 62 .
- 15) نجم عبيد عيدان الشمري ، اثر عناصر المناخ في زراعة بعض المحاصيل الحقلية في محافظتي واسط والسليمانية ، ( دراسة في الجغرافية المناخية ) ، اطروحة دكتوراه ( غ . م ) ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 2010م ، ص 99 .
- 16) علي حسن موسى ، المناخ والزراعة ، دار دمشق للنشر والتوزيع ، 1994م ، ص 125 .
- 17) محسن محارب عواد ومحمد سالم ضو ، مدخل الى الجغرافية الزراعية ، ط1 ، دار شموخ الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع ، 2002م ص 66 .
- 18) Peter Ranum and other , Global maize production , Utilization and consumption , New York Academy of Sciences , 2014 , p<sup>106</sup> .
- 19) Sushra Huma and other , Human Benefits from maize , Scholar Journal of Applied Sciences and Research , vol (2:2) 2019 , p<sup>4-5</sup> .
- 20) محمد عبد السعيد ، اساسيات انتاج المحاصيل الحقلية ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، 1986 م ، ص 422 .
- 21) جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، الاحصاء الزراعي ، بيانات غير منشورة ، 2020م .
- 22) جمهورية العراق ، الجهاز المركزي للإحصاء ، مديرية الاحصاء الزراعي ، بيانات المحاصيل والخضراوات لسنة 2019 م ، ص 9 .
- 23) منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ، قسم الاحصاءات ، بيانات انتاج المحاصيل الزراعية ، 2020م .

### المصادر

### الكتب

- 1) حسن ابو سمور ، الجغرافية الحيوية والتربة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط2 ، عمان ، 2009م
- 2) صادق جعفر الصراف ، علم البيئة والمناخ ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1980م .
- 3) عبد الاله رزوقي كربل وماجد السيد ولي ، علم الطقس والمناخ ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، 1986م .
- 4) علي احمد غانم ، الجغرافية المناخية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ط1 ، عمان ، 2003م .
- 5) علي احمد غانم ، المناخ التطبيقي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 2010م .
- 6) علي حسن موسى ، المناخ والزراعة ، دار دمشق للنشر والتوزيع ، 1994م .
- 7) محسن محارب عواد ومحمد سالم ضو ، مدخل الى الجغرافية الزراعية ، ط1 ، دار شموخ الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع ، 2002م .
- 8) محمد الخزامي عزيز ، نظم المعلومات الجغرافية ((اساسيات وتطبيقات للجغرافيين)) منشأة المعارف بالإسكندرية ، الاسكندرية ، 1998م .
- 9) محمد عبد السعيد ، اساسيات انتاج المحاصيل الحقلية ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، 1986 م .
- 10) نعمان شحادة ، علم المناخ ، مطبعة النور النموذجية ، ط2 ، الجامعة الاردنية ، 1983م .
- 11) يوسف عبد المجيد فايد ، جغرافية المناخ والنبات ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 2011م .

### البحوث العلمية

- 1) سلمى عبد الرزاق عبد لايد ووفاء حسين علي ، الخصائص المناخية ودورها في اقامة المشاريع الزراعية الحكومية في محافظة كربلاء ، مجلة الباحث ، العدد (31) ، السنة (2019) .
- 2) نجم عبيد عيدان الشمري ، اثر عناصر المناخ في زراعة بعض المحاصيل الحقلية في محافظتي واسط والسليمانية ، ( دراسة في الجغرافية المناخية ) ، اطروحة دكتوراه ( غ . م ) ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 2010م .

المطبوعات الحكومية

- 1) جمهورية العراق ، الجهاز المركزي للإحصاء ، مديرية الإحصاء الزراعي ، بيانات المحاصيل والخضراوات لسنة 2019 م .
- 2) جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، المجموعة الإحصائية السنوية ، 2019 م .
- 3) جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، الإحصاء الزراعي، بيانات غير منشورة ، 2020م
- 4) منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ، قسم الإحصاءات ، بيانات انتاج المحاصيل الزراعية ، 2020 م .

المصادر الاجنبية

- 1) Amrita Bajaj and other , pundamentals of physical geography , Uttaraan prakashan , Haldwani , First , 2017
- 2) David G.Rossiter , Atheortical Framework for Land Evaluation , Elsevier Scientific , Geoderma ,(72) , 1990 .
- 3) FAO , land Evaluation for rainfed Agriculture , Food and Agriculture , Organization of The United Nations , Soils Bulletin 52 . Italy : Rome , 1983
- 4) Mohammad Passarakli , Hand book and crop physiology , Second Edition Revised and Expanded , Tucson ,Arizona , New York , 2001 .
- 5) Peter Ranum and other , Global maize production , Utilization and consumption , New York Academy of Sciences , 2014 .
- 6) Sushra Huma and other , Human Benefits from maize , Scholar Journal of Applied Sciences and Research , vol (2:2) 2019 .